

**Тестовые задания для проведения первого этапа первичной аккредитации  
специалистов со средним профессиональным образованием по специальности  
34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО**

1. [T000002] ОЦЕНКА  
НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ  
АПГАР ПРОВОДИТСЯ

- А) на 1-ой и 5-ой минутах жизни
  - Б) на 10 минуте жизни
  - В) перед переводом из родового блока
  - Г) перед выпиской из родильного дома
2. [T000003] ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДЛИНЫ ТЕЛА, МАССЫ ТЕЛА,  
ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ,  
ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА  
НАЗЫВАЮТСЯ

- А) антропометрическими
- Б) фактическими
- В) долженствующими
- Г) второстепенными

3. [T000004] ГИПОГАЛАКТИЕЙ  
НАЗЫВАЕТСЯ

- А) снижение выработки молока в молочных железах
- Б) воспаление молочной железы у женщины
- В) снижение потребности ребенка в грудном молоке
- Г) непереносимость грудного молока у ребенка

4. [T000005] РАННЕЕ  
ПРИКЛАДЫВАНИЕ  
НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ  
СПОСОБСТВУЕТ

- А) усилиению лактации
- Б) профилактике рахита
- В) быстрому росту ребенка
- Г) профилактике мастита

5. [T000020] ГОРМОН,  
СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОСТ И  
СОЗРЕВАНИЕ ФОЛЛИКУЛ В  
ЯИЧНИКАХ

- А) фолликулостимулирующий
- Б) адренокортикотропный
- В) тиреотропный
- Г) лутеинизирующий

6. [T000021] ЦИКЛИЧЕСКОЕ  
ОТТОРЖЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
СЛОЯ ЭНДОМЕТРИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) менструация
- Б) плацентация
- В) овуляция
- Г) имплантация

7. [T000022] ОПЛОДОТВОРЕНИЕ  
ЯЙЦЕКЛЕТКИ ПРОИСХОДИТ В

- А) полости маточной трубы
- Б) полости матки
- В) полости малого таза
- Г) канале шейки матки

8. [T000024] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА  
СОСТАВЛЯЕТ

- А) 6-8 недель
- Б) месяц
- В) 2 недели
- Г) 1-2 дня

9. [T000025] ПЕРВЫМ ПЕРИОДОМ  
РОДОВ СЧИТАЕТСЯ ПЕРИОД

- А) от начала родовой деятельности до раскрытия шейки матки
- Б) с момента рождения плода до рождения последа
- В) от раскрытия шейки матки до изгнания плода
- Г) с момента отхождения околоплодных вод

10. [T000026] ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ,  
НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ  
ГРУДНОГО МОЛОКА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) лактация
- Б) овуляция
- В) саливация
- Г) пролиферация

11. [T000027] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ  
МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ  
ОТНОСИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- А) календарного метода
- Б) презерватива
- В) спермицидов
- Г) внутриматочной спирали

12. [T000029] ОДНИМ ИЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эрозия шейки матки
- Б) наличие артериальной гипертензии I стадии
- В) возраст старше 30 лет
- Г) пиелонефрит в стадии ремиссии

13. [T000030] СРЕДСТВА ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

- А) подавления овуляции
- Б) сгущения цервикальной слизи
- В) уничтожения сперматозоидов
- Г) снижения двигательной активности сперматозоидов

14. [T000031] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- А) 280 дней
- Б) 220 дней
- В) 240 дней
- Г) 300 дней

15. [T000032] ВО ВЛАГАЛИЩЕ ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРЕОБЛАДАЕТ СРЕДА

- А) кислая
- Б) нейтральная
- В) слабощелочная
- Г) щелочная

16. [T000033] СРЕДСТВОМ КОНТРАЦЕПЦИИ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) презерватив
- Б) внутриматочная спираль
- В) гормональные препараты
- Г) диафрагма

17. [T000034] В ЯИЧКЕ МУЖЧИНЫ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ГОРМОН

- А) тестостерон
- Б) пролактин

В) эстроген

Г) прогестерон

18. [T000035] ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВЫЗЫВАЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПЕРЕНЕСЕННОЕ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) краснуха
- Б) ревматизм
- В) пневмония
- Г) панкреатит

19. [T000037] МЕНОПАУЗОЙ НАЗЫВАЮТ

- А) последнюю самостоятельную менструацию
- Б) период стабильной менструальной функции
- В) период наступления первой менструации
- Г) период времени после окончания репродуктивного возраста

20. [T000040] К ПСИХОНЕВРОТИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ

- А) плаксивость
- Б) жар
- В) приливы
- Г) нарушения сна

21. [T000041] К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ

- А) адекватную физическую активность
- Б) употребление продуктов, богатых углеводами
- В) соблюдение режима сна и питания
- Г) наблюдения у врача травматолога

22. [T000047] ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСКУСТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бесплодие
  - Б) многоплодная беременность
  - В) неправильное положение матки Г) нарушение менструального цикла
23. [T000049] ПРИЧИНОЙ АНДРОПАУЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) снижение выработки тестостерона
  - Б) снижение функции щитовидной железы
  - В) снижение выработки эстрогена
  - Г) избыток пролактина

24. [T000050] ГЕРОНТОЛОГИЯ – ЭТО

- А) наука о старении
- Б) наука о здоровой женщине
- В) наука о профилактике и лечении болезней старческого возраста
- Г) наука о смерти

25. [T000052] К ГРУППЕ ПОЖИЛЫХ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ

- А) 60-74 лет
- Б) 45-59 лет
- В) 65-85 лет
- Г) 75-89 лет

26. [T000053] К ДОЛГОЖИТЕЛЯМ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ

- А) старше 90 лет
- Б) 75-90 лет
- В) старше 80 лет
- Г) старше 100 лет

27. [T000054] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО СТАРЕНИЯ ИЗ РАЦИОНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ

- А) холестеринсодержащие продукты
- Б) растительный белок

В) кисломолочные продукты

Г) грубую клетчатку

28. [T000055] ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

А) сердечно-сосудистых заболеваний

Б) инфекционных заболеваний

В) ЛОР-заболеваний

Г) психических заболеваний

29. [T000059] ОДИН ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ, КОГДА ВЫДАЕТСЯ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

А) заболевшим лицам, работающим по трудовому договору

Б) работникам на время прохождения периодических медицинских осмотров

В) лицам с хроническими заболеваниями вне обострения

Г) обучающимся в образовательных организациях

30. [T000060] РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДICНОСТЬ ОСМОТРА ЖЕНЩИНЫ ВРАЧОМ-АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ СОСТАВЛЯЕТ А) 1 раз в год

Б) 1 раз в 2 года

В) 4 раза в год

Г) 2 раза в год

31. [T000061] ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЖЕЛЕЗА В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ

А) анемия

Б) флюороз

В) хрупкость костей

Г) эндемический зоб

32. [T000062] К ФАКТОРАМ, БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮЩИМ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ

А) здоровый образ жизни

Б) высококалорийное питание

В) избыточная масса тела

Г) гиподинамия

33. [T000063] ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЕТСЯ

А) реабилитацией

Б) лечением

В) диагностикой

Г) профилактикой

34. [T000065] ВРЕМЯ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ А)

пубертатным периодом

Б) фертильным периодом

В) пренатальным периодом

Г) юношеским периодом

35. [T000066] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРОБЛЕМОЙ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ У ПОДРОСТКА ЯВЛЯЕТСЯ

А) эмоциональная неустойчивость

Б) физическая активность

В) появление вторичных половых признаков

Г) социализация

36. [T000067] ОДНИМ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИВОДЯЩЕГО К ТРУБНОМУ БЕСПЛОДИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

А) воспаление маточных труб

Б) кровотечение

В) остатки плацентарной ткани

Г) перфорация матки

37. [T000068] У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА Д РАЗВИВАЕТСЯ А) рахит

Б) цинга

В) анемия

Г) остеохондроз

38. [T000069] ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

А) центильных таблиц

Б) индивидуальных стандартов

В) возрастных стандартов

Г) визуально

39. [T000070] ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИВОДИТ К

А) повышению риска заболеваний щитовидной железы

Б) повышению риска заболеваний надпочечников

В) повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями

Г) заболеваниям поджелудочной железы

40. [T000071] ФОРМИРОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У ДЕВОЧЕК СПОСОБСТВУЕТ ГОРМОН

А) эстрадиол

Б) тироксин

В) адреналин

Г) инсулин

41. [T000073] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ А) контрацепция

Б) лактация В) прерванный половой акт

Г) аменорея

42. [T000075] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

А) устранение психогенного компонента родовой боли

Б) ознакомление беременных со строением и функциями половых органов

В) ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных

Г) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности

43. [T000076] К ИЗМЕНЕНИЯМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ОТНОСИТСЯ

А) снижение жизненной ёмкости легких

Б) увеличение жизненной ёмкости легких

В) увеличение количества альвеол

Г) увеличение дыхательного объема легких

44. [T000077] К ИЗМЕНЕНИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ОТНОСИТСЯ

А) снижение памяти

Б) улучшение памяти

В) улучшение сна

Г) увеличение способности к обучению

45. [T000081] СТЕПЕНЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА – ЭТО

А) биологический возраст

Б) календарный возраст

В) паспортный возраст

Г) хронологический возраст

46. [T000085] ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ А) снижением эластичности

Б) увеличением тургора

В) повышением влажности

Г) снижением пигментации

47. [T000086] АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ А) снижением перистальтики кишечника

Б) усилением перистальтики кишечника

В) уменьшением длины кишечника

Г) гипертрофией обкладочных клеток желудка

48. [T000088] ГЕРОНТОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА, КОТОРАЯ ИЗУЧАЕТ

А) биологические, социальные и психологические аспекты старения человека

Б) закономерности старения высших животных и человека

В) особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей

Г) пути увеличения продолжительности жизни человека

49. [T000094] ПИТАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗМА И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) рациональном

Б) недостаточным

В) несбалансированным

Г) избыточным

50. [T000096] РЕЗЕРВОМ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЮТСЯ

А) жиры

Б) белки

В) углеводы

Г) витамины

51. [T000097] ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УГЛЕВОДОВ А) энергетическая

Б) обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта

В) пластическая

Г) растворение витаминов А, К, Е

52. [T000098] ПРИ ДЕФИЦИТЕ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В РАЗВИВАЮТСЯ

- А) заболевания нервной системы
- Б) цинга, нарушения зрения
- В) анемия, повышенная кровоточивость
- Г) ра�ахит, цинга

53. [T000100] ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ ПРИВОДИТ К

- А) повышенной утомляемости
- Б) задержке физического развития
- В) развитию остеопороза
- Г) онкологическим заболеваниям

54. [T000101] ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ А) полиурии

- Б) анорексии
- В) обезвоживания
- Г) ожирению

55. [T000103] УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ НАЗЫВАЕТСЯ А) гиповитаминоз

- Б) гипервитаминоз
- В) авитаминоз
- Г) дисвитаминоз

56. [T000104] СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, УЖИН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ

- А) за 2-3 часа до сна
- Б) за 45 минут до сна
- В) за 1 час до сна
- Г) за 6 часов до сна

57. [T000105] СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ

- А) к истощению

Б) к избыточной массе тела

В) к потере аппетита

Г) к нарушению функций кишечника

58. [T000106] ПОВЫШЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ К

- А) избыточной массе тела
- Б) истощению
- В) потере аппетита
- Г) изменению настроения

59. [T000107] ЕСЛИ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ БОЛЬШЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПИЩИ, ТО МАССА ТЕЛА А) уменьшается

- Б) увеличивается
- В) остается постоянной
- Г) колеблется

60. [T000108] ДЕФИЦИТ БЕЛКА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) отекам
- Б) авитаминозу
- В) повышению работоспособности
- Г) снижению общего холестерина в крови

61. [T000109] ИЗБЫТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ПРИВОДИТ

- А) к ожирению
- Б) к повышению работоспособности
- В) к повышенной утомляемости
- Г) к анорексии

62. [T000110] ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ

- А) 400 г в сутки
- Б) 300 г в сутки
- В) 250 г в сутки

Г) 150 г в сутки

63. [T000111] УЛУЧШАЕТ ПЕРИСТАЛЬТИКУ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ

- А) овощей и фруктов
- Б) пюреобразной пищи
- В) острой пищи
- Г) хлебобулочных изделий

64. [T000114] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ УМСТВЕННАЯ РАБОТА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К

- А) снижению устойчивости внимания
- Б) улучшению восприятия информации
- В) улучшению запоминания информации
- Г) повышению сосредоточения внимания

65. [T000115] ПРИ ГИПОДИНАМИИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) снижение работоспособности
- Б) повышение эмоциональности
- В) изменение социальной роли
- Г) снижение частоты сердечных сокращений

66. [T000116] ПОСЛЕДСТВИЕМ ГИПОДИНАМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение силы и выносливости мышц
- Б) повышение тонуса и эластичности мышц
- В) снижение частоты сердечных сокращений
- Г) повышение работоспособности организма

67. [T000117] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОДИНАМИИ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ

- А) 30 минут
- Б) 15 минут

В) 20 минут

Г) 60 минут

68. [T000118] ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С УПРАЖНЕНИЙ

- А) низкой интенсивности
- Б) средней интенсивности
- В) высокой интенсивности
- Г) умеренной интенсивности

69. [T000119] САМЫМ ЗДОРОВЫМ СНОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОН В ПЕРИОД

- А) 22.00 – 06.00.
- Б) 00.00 – 04.00.
- В) 01.00. – 03.00.
- Г) 03.00 – 06.00.

70. [T000120] РЕКОМЕНДУЕМЫМ СПОСОБОМ СНЯТИЯ СТРЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) занятие физической культурой
- Б) употребление пищи
- В) употребление алкоголя
- Г) табакокурение

71. [T000121] ЗАКАЛИВАНИЕ – ЭТО

- А) метод физиотерапии различными природными факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами (относительно температуры тела) и пониженным атмосферным давлением, с целью повышения функциональных резервов организма
- Б) кратковременное воздействие на человека тепловых и холодовых стрессов
- В) способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды
- Г) устойчивость к воздействию низких температур

**72. [T000122] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕССОНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) прием пищи не менее, чем за 2-3 часа до сна
- Б) занятие танцами в вечернее время
- В) посещение фитнес-тренировок вечером
- Г) отказ от снотворных средств

**73. [T000123] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ НАПРАВЛЕНА НА**

- А) некурящих людей и людей с факторами риска
- Б) людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива
- В) курящих людей для оказания помощи в отказе от курения Г) людей, которые недавно начали курить

**74. [T000124] ТАБАКОКУРЕНИЕ – ЭТО ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ**

- А) онкологических заболеваний
- Б) авитаминоза
- В) аллергических реакций
- Г) развития ожирения

**75. [T000129] ФАКТОРОМ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИМ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) употребление алкоголя членами семьи
- Б) позитивные коммуникации в семье
- В) положительное поведение окружающих сверстников
- Г) эмоциональная близость к матери

**76. [T000130] ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) высокий уровень взаимопонимания между всеми членами семьи

**Б) слабый мониторинг со стороны родителей В) низкий уровень ожидания от будущего**

**Г) предпочтение мнения сверстников мнению семьи**

**77. [T000132] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОТНОСИТСЯ К**

**А) первичной профилактике**

**Б) вторичной профилактике**

**В) медицинской профилактике**

**Г) третичной профилактике**

**78. [T000133] ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) отказ от употребления алкоголя
- Б) предупреждение рецидивов
- В) предупреждение употребления алкоголя
- Г) лечение заболеваний

**79. [T000134] СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИВОДЯЩИЙ К**

- А) снижению функций организма
- Б) усилению функций организма
- В) атрофии органов
- Г) повышению трудоспособности

**80. [T000136] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

- А) первичной
- Б) социальной
- В) третичной
- Г) адаптивной

**81. [T000138] ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПРОВОДИТСЯ ПО**

**А) шкале SCORE**

Б) шкале Нортон

В) шкале Ватерлоу

Г) госпитальной шкале тревоги и депрессии

82. [T000139] К АБСОЛЮТНОМУ СУММАРНОМУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТOMУ РИСКУ ОТНОСИТСЯ ВОЗРАСТ

А) 40-65 лет

Б) 30-40 лет

В) 35-45 лет

Г) 60-75 лет

83. [T000140] ПРИ ОЦЕНКЕ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОГО РИСКА УЧИТЫВАЕТСЯ

А) возраст

Б) частота дыхания

В) уровень глюкозы

Г) частота пульса

84. [T000141] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ

А) измерение артериального давления

Б) эхокардиографию

В) определение холестерин липопротеидов

Г) электрокардиографию

85. [T000142] ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

А) масса тела в кг разделить на рост в м<sup>2</sup> (в квадрате)

Б) рост в см минус 100

В) масса тела в кг разделить на рост в см

Г) рост в м минус 100

86. [T000143] В НОРМЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ А) 18,5 кг/м<sup>2</sup> -24,9 кг/м<sup>2</sup>

Б) 25,0 кг/м<sup>2</sup> -29,9 кг/м<sup>2</sup> В) 30,0 кг/м<sup>2</sup> -34,9 кг/м<sup>2</sup>

Г) 35,0 кг/м<sup>2</sup> -39,9 кг/м<sup>2</sup>

87. [T000146] ОЖИРЕНИЮ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА

А) 36 кг/м<sup>2</sup>

Б) 18 кг/м<sup>2</sup>

В) 25 кг/м<sup>2</sup>

Г) 41 кг/м<sup>2</sup>

88. [T000147] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ПРОВОДЯТ

А) антропометрию

Б) рентгенологическое исследование

В) ультразвуковое исследование

Г) эндоскопическое исследование

89. [T000148] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМЫ

А) весы

Б) тонометр

В) спирометр

Г) термометр

90. [T000149] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМ

А) тонометр

Б) сантиметровая лента

В) ростомер

Г) весы

91. [T000150] ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТСЯ

А) индивидуальная программа здорового образа жизни

Б) программа борьбы с вредными привычками

В) стандартная программа здорового образа жизни

Г) план лечения пациента

92. [T000156] ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ САМЫМИ УСТОЙЧИВЫМИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗБУДИТЕЛИ

А) вирусного гепатита В

Б) дизентерии

В) холеры

Г) сальмонеллеза

93. [T000158] КУРЕНЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ

А) рака легкого

Б) миомы матки

В) фибромы пищевода

Г) аденомы надпочечника

94. [T000159] ВИРУС ГЕПАТАТА В ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

А) рака печени

Б) рака желудка

В) рака пищевода

Г) рака яичников

95. [T000161] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

А) нарушение холестеринового обмена

Б) недостаточное поступление холестерина через продукты питания

В) избыток холестерина

Г) недостаток белка в крови

96. [T000162] ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА А) сахарного

Б) несахарного В) почечного

Г) фосфатного

97. [T000163] ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ АНЕМИИ

А) железодефицитной

Б) гемолитической

В) гипопластической

Г) серповидно-клеточной

98. [T000166] ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО:

А) состояние полного физического, духовного и социального благополучия

Б) состояние, при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность

В) состояние активной деятельности при наличии минимальных функциональных нарушений

Г) состояние его активной трудоспособности

99. [T000167] ЗАБОТА О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) обязанностью граждан

Б) добровольным выбором гражданина

В) личным делом каждого гражданина

Г) ответственностью человека перед обществом

100. [T000168] ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

А) путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья

Б) путем проведения обязательной иммунопрофилактики

В) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний

Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

101. [T000169] ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

А) созданием условий для занятий физической культурой и спортом

Б) путем проведения обязательной иммунопрофилактики

В) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний

Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

102. [T000170] ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

А) созданием условий для ведения здорового образа жизни

Б) путем проведения обязательной иммунопрофилактики

В) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний

Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

103. [T000180] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В:

А) два этапа

Б) один этап

В) три этапа

Г) четыре этапа

104. [T000181] ЦЕЛЬ ОСМОТРА И ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВРАЧАМИСПЕЦИАЛИСТАМИ, ВРАЧЕМ-ГИНЕКОЛОГОМ, ВРАЧЕМ-УРОЛОГОМ:

А) раннее выявление и профилактика развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной сферы

Б) разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний

В) динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска

Г) раннее выявление групп риска по развитию хронических заболеваний

105. [T000182] ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

А) 1 раз в год

Б) 1 раз в 3 месяца

В) 1 раз в полгода

Г) 1 раз в 2 года

106. [T000183] МАРШРУТНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА) РАЗРАБОТАНА ДЛЯ

А) пациента

Б) врача, проводящего диспансеризацию

В) медицинской сестры

Г) контролирующего органа

107. [T000184] ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний

Б) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании

В) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска

Г) поддержание качества жизни пациентов

**108. [T000185] ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- Б) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- В) проведение реабилитационных мероприятий
- Г) восстановление трудоспособности пациента

**109. [T000186] ЦЕЛЬЮ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) максимальная компенсация утраченных жизненных функций
- Б) устранение факторов риска возникновения заболевания
- В) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- Г) система мер, направленных на профилактику перехода заболеваний в хронические формы

**110. [T000187] ЗАДАЧАМИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья, предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье
  - Б) раннее выявление отклонений в работе организма, их коррекция, укрепление адаптационных возможностей организма
  - В) предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений, развития декомпенсации, инвалидности, смертности
  - Г) организация и проведение курсов профилактического лечения
- 111. [T000188] ЗАДАЧАМИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**
- А) предупреждение

прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений

- Б) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
- В) предупреждение неблагоприятного влияния погодных условий на здоровье

Г) формирование потребности изменения приоритетов в жизни

**112. [T000189] ЗАДАЧАМИ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) максимальное восстановление качества жизни пациента
- Б) предупреждение прогрессирования заболевания
- В) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
- Г) предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

**113. [T000190] ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) люди из групп риска
- Б) пациенты с острыми заболеваниями
- В) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- Г) пациенты с хроническими формами заболеваний

**114. [T000191] ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) пациенты с хроническими формами заболеваний
- Б) здоровые лица с факторами риска развития заболеваний
- В) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- Г) люди из групп риска

115. [T000192] ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) пациенты с хроническими формами заболеваний
- Б) пациенты с факторами риска заболеваний
- В) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- Г) люди из групп риска

116. [T000193] ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ ДЛИНА ТЕЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В СРЕДНЕМ НА (\_\_\_ CM)

- А) 20-25
- Б) 25-30
- В) 15-20 Г) 12-15

117. [T000194] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ МАССЫ ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (\_\_\_ %)

- А) 6-10
- Б) 5-6
- В) 10-12
- Г) 3-5

118. [T000195] ОРИЕНТИРАМИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ГРУДНОГО РЕБЕНКА СЗАДИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) затылочные бугры
- Б) область ниже затылочных бугров
- В) область над затылочными буграми
- Г) теменные бугры

119. [T000196] ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ

- А) закрытый большой родничок

Б) рост 65 см

В) масса тела 8,0 кг Г) окружность головы 40 см

120. [T000197] ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 7 ДНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ А) длительный сон

Б) длительное бодрствование

В) мышечная гипотония

Г) обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления

121. [T000200] РЕБЕНОК 4-Х МЕСЯЦЕВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ

А) в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища

Б) переворачиваться с живота на спину

В) самостоятельно садиться

Г) ползать

122. [T000201] РЕБЕНОК ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ГОВОРИТ ОКОЛО 10 СЛОВ, НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ ЗАПРЕТ, ПРИУЧАЕТСЯ К НАВЫКАМ ОПРЯТНОСТИ В ВОЗРАСТЕ

А) 12 месяцев

Б) 9 месяцев

В) 1 год 6 месяцев

Г) 1 год 9 месяцев

123. [T000231] ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

А) кормлении грудным молоком

Б) как можно более раннем использовании соков для коррекции питания

В) кормлении кисломолочными смесями

Г) тщательной термической обработке пищевых продуктов

124. [T000233] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- А) большим содержанием воды
- Б) большим содержанием минеральных веществ
- В) большей плотностью
- Г) большей ломкостью

125. [T000234] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- А) меньшим содержанием минеральных веществ
- Б) большим содержанием минеральных веществ
- В) большей плотностью
- Г) большей ломкостью

126. [T000235] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- А) большей эластичностью
- Б) большим содержанием минеральных веществ
- В) большей плотностью
- Г) большей ломкостью

127. [T000236] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- А) большей упругостью
- Б) большим содержанием минеральных веществ
- В) большей плотностью
- Г) большей ломкостью

128. [T000237] К ОСОБЕННОСТИМ ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ

ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ОТНОСИТСЯ А) уменьшение частоты дыхательных движений

- Б) переход на диафрагмальный тип дыхания

В) зависимость частоты дыхательных движений от физической нагрузки

Г) произвольное изменение частоты дыхательных движений

129. [T000238] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ

А) все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали известны при исполнении профессиональных обязанностей

Б) только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и свидетельство об аккредитации специалиста

В) только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее медицинское образование

Г) только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

130. [T000239] С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ДОПУСКАЕТСЯ

А) в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях

Б) только в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю

В) только в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля

за качеством и безопасностью медицинской деятельности

Г) только в целях информирования представителей страховых медицинских организаций

**131. [T000240] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ**

А) обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания медицинской помощи

Б) письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти

В) письменного обращения представителей средств массовой информации при наличии аккредитации

Г) письменного обращения адвоката при наличии нотариально оформленной доверенности на ведение судебного дела

**132. [T000241] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ**

А) угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений

Б) наличии письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти

В) наличии обращения представителей средств массовой информации, с разрешения руководителя медицинской организации

Г) наличии письменного обращения адвоката, представившего нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела

**133. [T000242] ПО ЗАПРОСУ АДВОКАТА ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗГЛАШЕНА С**

А) письменного согласия пациента на сообщение сведений, составляющих врачебную тайну

Б) разрешения руководителя медицинской организации и врачебной комиссии

В) разрешения органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности

Г) письменного разрешения лечащего врача и руководителя медицинской организации

**134. [T000243] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЮТ**

А) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении

Б) только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении

В) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья близких родственников пациента

Г) только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья законных представителей пациента

**135. [T000247] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

А) носить обувь на низком каблуке

Б) носить обувь с высоким голенищем

В) носить обувь на высоком каблуке

Г) носить обувь без каблука

**136. [T000248] В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ**

А) холестерин

Б) аскорбиновую кислоту

В) каротин

Г) соли кальция

137. [T000249] ПРИ ВОЗРАСТНОЙ ЭМФИЗЕМЕ У ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С

А) дыханием

Б) питанием

В) питьём

Г) выделениями

138. [T000250] БОЛЕВАЯ, ТАКТИЛЬНАЯ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

А) снижается

Б) повышается

В) не изменяется

Г) отсутствует

139. [T000251] ОСТРОТА ЗРЕНИЯ, ОСТРОТА СЛУХА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

А) снижается

Б) не изменяется

В) повышается

Г) незначительно повышается

140. [T000253] ИЗУЧЕНИЕМ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЗАНИМАЕТСЯ

А) геронтология

Б) гериатрия

В) танатология

Г) геронтофармакология

141. [T000256] НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН И

ЖЕНЩИН НАБЛЮДАЮТСЯ В А)

строении таза

Б) строении трубчатых костей

В) соотношении минеральных и органических веществ костной ткани Г) строении мышц

142. [T000257] К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

А) наследственная предрасположенность

Б) курение табака

В) нерациональное питание

Г) гиподинамия

143. [T000258] ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ПОНИМАЮТ

А) активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья

Б) борьбу за чистоту среды обитания

В) творчество, как источник положительных эмоций

Г) регулярные профилактические осмотры

144. [T000260] ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВЕРШЕННЫМ В СЛУЧАЕ

А) осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.

Б) осмотра работника всеми врачами-специалистами

В) выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований

Г) при выполнении 50% от запланированных исследований и консультаций специалистов

**145. [T000261] К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ**

- A) здоровые и имеющие небольшие отклонения, не требующие коррекции
- Б) с хронической патологией в стадии компенсации
- В) здоровые, а также с отягощенным биологическим анамнезом
- Г) из группы риска без признаков заболевания

**146. [T000262] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ**

- A) обязательно
- Б) не имеет значения
- В) не обязательно
- Г) оформляется по требованию пациента

**147. [T000266] ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- А) снижением тонуса мочеточников
- Б) увеличением вместимости мочевого пузыря
- В) повышением тонуса мочеточников
- Г) более редким мочеиспусканием

**148. [T000267] ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- А) снижением почечного кровотока
- Б) увеличением вместимости мочевого пузыря
- В) повышением тонуса мочеточников
- Г) более редким мочеиспусканием

**149. [T000268] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) остеопороз

Б) укорочение

В) размягчение

Г) обызвествление

**150. [T000269] ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ**

- А) 16-20
- Б) 25-30
- В) 35-40 Г) 45-50

**151. [T000271] НОЧЬЮ НЕОБХОДИМОСТЬ В МОЧЕИСПУСКАНИИ У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ НЕ БОЛЕЕ**

- А) 1 раза
- Б) 2 раз
- В) 3 раз
- Г) 4 раз

**152. [T000272] ПЕРИОД ДЕТСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ А) от рождения до 18 лет**

- Б) от рождения до 17 лет
- В) от рождения до 15 лет
- Г) от рождения до 14 лет

**153. [T000273] ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ**

- А) в первые 30 минут
- Б) через 2-3 часа
- В) через 6 часов
- Г) через 10-12 часов

**154. [T000279] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО МОНИТОРИНГУ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 3Х ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) патронаж к ребенку до 1 года жизни

Б) анкетирование родителей

В) чтение лекций

Г) беседы с родителями

155. [T000289] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ ТАКИЕ ВИДЫ КАК

А) первичная, вторичная, третичная

Б) начальная, конечная

В) текущая, заключительная

Г) противоэпидемическая, предварительная

156. [T000295] СТРОГИЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ ПРИВОДИТ К ДЕФИЦИТУ

А) животного белка

Б) углеводов

В) клетчатки

Г) витаминов

157. [T000299] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСЯТСЯ А) сахарный диабет, ожирение

Б) гипохолестеринемия, гепатоз

В) пониженная масса тела, гипотония

Г) высокий уровень билирубина и ферментов в крови

158. [T000300] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА В ДИЕТУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ ВКЛЮЧАТЬ ПРОДУКТЫ

А) морскую капусту, мясо кальмаров

Б) баранину, индейку

В) свинину, конину

Г) колбасу, бекон

159. [T000304] В ПОКОЕ ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ

А) 16-20

Б) 12-15

В) 10-14

Г) 8-10

160. [T000312] В НОРМЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ)

А) 40

Б) 32

В) 24

Г) 18

161. [T000321] ОРТООСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТОНИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

А) быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное

Б) быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное

В) длительной ходьбе

Г) быстрой ходьбе

162. [T000322] ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ( ККАЛ)

А) 1700-1900

Б) 2000-2300

В) 2800-3000

Г) 3000-3200

163. [T000323] К АЛИМЕНТАРНЫМ ГЕРОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

А) овощи и фрукты

Б) макаронные изделия

В) мясо и рыба

Г) хлебобулочные изделия

164. [T000325] ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕОБХОДИМО С ЦЕЛЬЮ

- А) профилактики травматизма
- Б) создания комфортных условий
- В) улучшения передвижения
- Г) создания уюта

165. [T000326] К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛКА, ОТНОСЯТСЯ

- А) сыр, творог
- Б) овощи и фрукты
- В) крупы, макароны
- Г) маргарин, майонез

166. [T000327] К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УГЛЕВОДОВ, ОТНОСЯТСЯ А) крупы

- Б) растительные масла
- В) орехи
- Г) морепродукты

167. [T000329] ТРЕНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ

- А) 30 и более минут 5 раз в неделю
- Б) 20 минут 1-2 раза в неделю
- В) 10 минут 3 раза в неделю
- Г) 10 минут 4 раза в день

168. [T000331] УВЕЛИЧЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) никтурией
- Б) полиурией
- В) пиурией

Г) дизурией

169. [T000333] К АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ ИЗМЕРЕНИЯ А) веса, роста

- Б) ЧСС, АД
- В) спирометрии, ЭКГ
- Г) динамометрии, спирометрии

170. [T000334] ДИНАМОМЕТРИЯ ОЦЕНИВАЕТ СИЛУ МЫШЦ

- А) кисти
- Б) спины
- В) ног
- Г) туловища

171. [T000335] КАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ И ПРОСТЕЙШИЕ НАПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) клиническую
- Б) бактериологическую
- В) иммунологическую
- Г) радиоизотопной диагностики

172. [T000336] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) клиническую
- Б) бактериологическую
- В) иммунологическую
- Г) цитостатическую

173. [T000338] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ

- А) в кардиологическое отделение
- Б) в нейрососудистое отделение
- В) в терапевтическое отделение
- Г) в реабилитационное отделение

174. [T000339] МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, В КОТОРОЙ ОКАЗЫВАЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ

- A) кардиологический центр
- Б) врачебная амбулатория
- В) поликлиника
- Г) участковая больница

175. [T000341] ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И АНУРИЕЙ ПРОВОДИТСЯ

- A) гемодиализ
- Б) переливание крови
- В) цистостомия
- Г) паранефральная блокада

176. [T000342] ПРИ ДИФФУЗНО – ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- A) биохимическую
- Б) клиническую
- В) бактериологическую
- Г) цитологическую

177. [T000344] ПАЦИЕНТАМ С ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-

- A) ангиохирурга
- Б) невропатолога
- В) терапевта
- Г) офтальмолога

178. [T000345] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЖАЛОБ НА РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-

- A) офтальмолога
- Б) онколога

В) невропатолога

Г) терапевта

179. [T000346] ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ А) медико-социальную экспертизу

Б) обследование

В) лечение

Г) реабилитацию

180. [T000347] ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-

А) ортопеда

Б) терапевта

В) невропатолога

Г) хирурга

181. [T000348] ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ РЕТИНОПАТИЕЙ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА- А) офтальмолога

Б) невропатолога

В) терапевта

Г) хирурга

182. [T000349] ПРИ ГАНГРЕНЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ

А) хирургическое

Б) эндокринологическое

В) терапевтическое

Г) нейро-сосудистое

183. [T000351] КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЮТ В

А) клинико-диагностическую лабораторию

Б) биохимическую лабораторию

В) бактериологическую лабораторию

Г) цитологическую лабораторию

184. [T000352] МАЗОК ИЗ ГНОЙНОЙ РАНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) бактериологическую
- Б) клиническую
- В) вирусологическую
- Г) биохимическую

185. [T000354] ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ПАЦИЕНТА С ТРАВМАМИ ПОСЛЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ В

- А) отделение полиции
  - Б) травмпункт
  - В) управление МЧС
  - Г) управление Роспотребнадзора
186. [T000355] УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРОВОДИТСЯ В
- А) кабинете функциональной диагностики
  - Б) физиотерапевтическом кабинете
  - В) кабинете электрокардиографии
  - Г) рентгенологическом кабинете

187. [T000356] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ КАЛ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) клиническую
- Б) бактериологическую
- В) иммунологическую
- Г) цитологическую

188. [T000358] ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ ПО ПОВОДУ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КИСТИ ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ В

- А) травмпункте по месту жительства
- Б) травматологическом отделении

В) хирургическом отделении

Г) ортопедическом отделении

189. [T000359] ПАЦИЕНТУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ ДАЮТ НАПРАВЛЕНИЕ В

- А) хирургическое отделение
- Б) дневной стационар
- В) профилакторий
- Г) палату интенсивной терапии

190. [T000360] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДКЕ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ У

- А) врача-хирурга в поликлинике
- Б) врача-онколога в диспансере
- В) врача-невролога
- Г) врача-терапевта

191. [T000361] ДИЕТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЕТ

- А) врач-хирург
- Б) диетическая сестра
- В) врач-терапевт
- Г) врач-кардиолог

192. [T000362] ПОСТРАДАВШИЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ

- А) травматологическое или нейрохирургическое

- Б) интенсивной терапии и реанимации
- В) хирургическое
- Г) реанимационное

193. [T000363] К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ ОТНОСИТСЯ

- А) компьютерная томография
- Б) ультразвуковое исследование

В) спирография

Г) электрокардиография

194. [Т000364] ПАЦИЕНТУ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ НАЗНАЧАЕТСЯ

А) физиотерапия

Б) лечебная ходьба

В) иглорефлексотерапия

Г) электростимуляция

195. [Т000366] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПАЦИЕНТУ ДАЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

А) диете

Б) профессии

В) режиму отдыха

Г) виду увлечений

196. [Т000367] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НАПРАВЛЯЮТ В А) Роспотребнадзор

Б) отделение полиции В) родственникам пациента

Г) миграционную службу

197. [Т000368] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

А) врача-эндокринолога

Б) врача-терапевта

В) врача-невролога

Г) врача-офтальмолога

198. [Т000369] ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

А) бактериологическую

Б) вирусологическую

В) клиническую

Г) биохимическую

199. [Т000370] ПАЦИЕНТУ С ВЫРАЖЕННЫМ КАШЛЕМ ПРОВОДИТСЯ А) рентгенография

Б) ультразвуковое исследование

В) эхокардиография Г) реоэнцефалография

200. [Т000371] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ШИГЕЛЛЕЗ АНАЛИЗ КАЛА НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

А) бактериологическую

Б) биохимическую

В) клиническую

Г) вирусологическую

201. [Т000373] ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ГРИППА БОЛЬНОГО НАПРАВЛЯЮТ

А) в инфекционный стационар

Б) в больницу общего профиля

В) в центр санэпиднадзора

Г) в профилакторий

202. [Т000374] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ МАЗОК ИЗ ЗЕВА И НОСА НА ВЛ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

А) бактериологическую

Б) клиническую

В) биохимическую

Г) вирусологическую

203. [Т000375] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПИЩЕВУЮ ТОКСИКОИНФЕКЦИЮ, МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

А) бактериологическую

Б) клиническую

В) вирусологическую

Г) иммунологическую

204. [T000376] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ ОФОРМЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В ОТДЕЛЕНИЕ

- А) инфекционное
- Б) хирургическое
- В) травмотологическое
- Г) неврологическое

205. [T000377] ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ МОЧУ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДОСТАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) клиническую
- Б) вирусологическую
- В) бактериологическую
- Г) иммунологическую

206. [T000379] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЧЕСОТКИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К А) врачу-дерматологу

- Б) врачу-инфекционисту
- В) врачу-педиатру
- Г) врачу-аллергологу

207. [T000380] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПАЦИЕНТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В

- А) противотуберкулезный диспансер
- Б) инфекционный стационар
- В) пульмонологическое отделение стационара

Г) кожно-венерологический диспансер

208. [T000381] БОЛЬНОГО ХОЛЕРОЙ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В

- А) бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы
- Б) полубокс отделение детской инфекционной больницы
- В) общую палату стационара специализированной медицинской помощи

Г) отделение интенсивной терапии соматического стационара

209. [T000382] БОЛЬНОМУ С РОЖИСТЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ КОЖИ В ФАЗЕ РЕМИССИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ А) бициллинотерапии

- Б) биохимического исследования крови
- В) занятий лечебной физкультурой
- Г) консультации гомеопата

210. [T000383] ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ПАЦИЕНТА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) рентгенографию
- Б) электрокардиографию
- В) велоэргометрию
- Г) реоэнцефалографию

211. [T000385] ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ПЕРВУЮ ПОРЦИЮ ПРОМЫВНЫХ ВОД ОТПРАВЛЯЮТ В

- А) лабораторию
- Б) приемное отделение
- В) патологоанатомическое отделение
- Г) отделение функциональной диагностики

212. [T000386] ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- А) врача-уролога
- Б) врача-нефролога
- В) врача-проктолога
- Г) гастроэнтеролога

213. [T000388] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕЙКОЗ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- А) врача-гематолога
- Б) врача-кардиолога

В) врача-онколога

Г) врача-терапевта

214. [T000389] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОФОРМЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИЮ

А) биохимическую

Б) клиническую

В) цитологическую

Г) бактериологическую

215. [T000390] ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

А) машиной скорой медицинской помощи

Б) городским такси

В) личным транспортом родственников

Г) грузовым такси

216. [T000393] ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

А) онкологическом диспансере

Б) профилактории

В) здравпункте

Г) пансионате

217. [T000395] ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ РАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ В

А) отделение полиции

Б) службу МЧС

В) станцию переливания крови

Г) Министерство здравоохранения

218. [T000397] ПАЦИЕНТА С ОЖОГОМ ЛИЦА НЕОБХОДИМО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ В

А) ожоговое отделение

Б) глазное отделение

В) травматологическое отделение

Г) микрохирургическое отделение

219. [T000400] ПАЦИЕНТА С ВОСПАЛЕНИЕМ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА НАПРАВЛЯЮТ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

А) врача-невролога

Б) врача-офтальмолога

В) врача-оториноларинголога

Г) врача-терапевта

220. [T000402] ПАЦИЕНТУ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

А) врача-офтальмолога

Б) врача-оториноларинголога

В) врача-терапевта

Г) врача-хирурга

221. [T000403] МОЧА НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

А) клиническую

Б) бактериологическую

В) иммунологическую

Г) вирусологическую

222. [T000404] БОЛЬНЫЕ, ПЕРЕНЕСШИЕ ИНСУЛЬТ, ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ У

А) врача-невролога в поликлинике по месту жительства

Б) врача-нейрохирурга

В) врача-участкового терапевта

Г) врача-физиотерапевта

223. [T000406] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕGOЯСЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ, ВЫРАЖЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НЕОБХОДИМ ПЕРЕВОД В

А) специализированное психосоматическое отделение

Б) психо-неврологический санаторий

В) дневной стационар

Г) многопрофильный стационар

224. [T000407] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

А) врача-онколога

Б) врача-гинеколога

В) врача-мамолога

Г) врача-рентгенолога

225. [T000409] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОСЛЕРОДОВЫЙ МАСТИТ РОДИЛЬНИЦУ НАПРАВЛЯЮТ К

А) врачу-хирургу

Б) врачу-гинекологу

В) врачу-онкологу

Г) врачу-венерологу

226. [T000410] ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТА ПЕРЕВОДЯТ В

А) кардиологический центр

Б) реанимационное отделение

В) больнице скорой медицинской помощи  
Г) санаторий

227. [T000411] ПАЦИЕНТУ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ, ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ЗАНЯТИЯ С А) логопедом

Б) психологом

В) врачом-невропатологом

Г) врачом-неврологом

228. [T000414] ПРОКАИН (НОВОКАИН) ОТНОСИТСЯ К

А) местным анестетикам

Б) нейролептикам

В) анальгетикам

Г) гемостатикам

229. [T000416] ЛИДОКАИН

А) местный анестетик

Б) нейролептик

В) анальгетик

Г) анксиолитик

230. [T000418] РАСТВОР АТРОПИНА СУЛЬФАТА 0,1% ОТНОСИТСЯ К

А) м-холиноблокаторам

Б) ганглиоблокаторам

В) ингибиторам ацетилхолинэстеразы

Г) альфа-адреномиметикам

231. [T000424] ЭФЕДРИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ А) симпатомиметиков

Б) ганглиоблокаторов

В) ингибиторов ацетилхолинэстеразы

Г) миорелаксантов (куареподобных средств)

232. [T000430] ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТУ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ИЛИ ДРУГИЕ ВРАЧИСПЕЦИАЛИСТЫ

А) принимающие участие в медицинском обследовании и лечении

Б) по выбору пациента

В) по решению руководителя медицинской организации

Г) по решению врачебной комиссии медицинской организации

233. [T000431] ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА

А) пациенту, с его согласия

Б) любому заинтересованному лицу

В) близкому родственнику пациента

Г) попечителю пациента

234. [T000442] ВАЛОКОРДИН

А) седативное средство

Б) местный анестетик

В) антибиотик

Г) антисептик

235. [T000444] ПИРАЦЕТАМ

А) ноотроп

Б) местный анестетик

В) антибиотик Г) антисептик

236. [T000445] КОФЕИН А)

психостимулятор

Б) местный анестетик

В) антибиотик

Г) антисептик

237. [T000446] КОФЕИН А) аналептик

Б) местный анестетик

В) антибиотик

Г) антисептик

238. [T000454] ПОРЦИЯ "В" ПРИ  
ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ  
ЭТО

А) содержимое желчного пузыря

Б) содержимое 12 перстной кишки

В) содержимое желудка

Г) желчь из печёночных протоков

239. [T000455] ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ  
ПУНКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

А) игла Дюфо

Б) троакар

В) аспиратор

Г) электроотсос

240. [T000456] В ЗАДАЧИ ПРИЁМНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА НЕ  
ВХОДИТ А) проведение полного  
обследования

Б) приём поступающих пациентов

В) санитарно-гигиеническая обработка  
поступивших пациентов

Г) транспортировка в лечебное отделение

241. [T000457] ДОКУМЕНТ ПРИЁМНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО  
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН ПАЦИЕНТ ИЛИ  
НЕТ

А) журнал учёта приёма больных и отказов  
в госпитализации

Б) медицинская карта стационарного  
больного

В) статистическая карта выбывшего из  
стационара

Г) журнал учёта инфекционных больных

242. [T000458] РАСТВОРЫ ДЛЯ  
РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

А) 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор  
натрия хлорида, вода для инъекций

Б) 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор  
натрия хлорида, вода для инъекций

В) 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор  
натрия хлорида, вода для инъекций Г) 2%  
раствор новокаина, 0,9% раствор натрия  
хлорида, вода для инъекций

243. [T000460] ПРЕИМУЩЕСТВА  
ЭНТЕРАЛЬНОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

А) простота в применении и возможность  
применения в любых условиях

Б) быстрота действия и частичная  
инактивация лекарства в печени

В) быстрота действия и исключение  
влияния на желудочно-кишечный тракт

Г) большая точность дозировки

244. [T000461] ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИДАЁТСЯ ПАЦИЕНТУ С ЦЕЛЬЮ

- А) облегчения оттока мокроты
- Б) расширения бронхов
- В) уменьшения одышки
- Г) улучшения мозгового кровообращения

245. [T000462] В КАЧЕСТВЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО РАСТВОРА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) 0,02% раствор фурацилина
- Б) 1% салициловый спирт
- В) 3% раствор перекиси водорода
- Г) Раствор бриллиантового зеленого

246. [T000463] ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ А)

определение функционального состояния почек

- Б) определение количества форменных элементов осадка мочи
- В) определение микрофлоры мочи
- Г) определение суточной глюкозурии

247. [T000464] ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ (НАЛИЧИЕ КРОВИ) ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ

- А) сине-фиолетовое
- Б) сине-зеленое
- В) розовое Г) бурое

248. [T000465] ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СТАЦИОНАРА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) проведение парентеральных вмешательств
- Б) непосредственный уход за больными
- В) контроль выполнения врачебных назначений

Г) организация выписки, учета, хранения медикаментов и материалов

249. [T000466] ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТОШНОТА, РВОТА, ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕЛТУХИ НА 5-7 ДЕНЬ, ЭТО ПРИЗНАКИ

- А) гепатита А
- Б) краснухи
- В) СПИД
- Г) бешенства

250. [T000467] ДИСБАКТЕРИОЗ ЭТО –

- А) нарушение количественного и качественного состава микрофлоры
- Б) внутрибольничная инфекция
- В) полное отсутствие микрофлоры
- Г) инфекционное заболевание

251. [T000468] ОСНОВНОЕ ПОКАЗАНИЕ К ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА

- А) длительная дисфункция кишечника
- Б) поступление в организованные коллективы (детский сад, школа, вуз)
- В) работа в системе общественного питания
- Г) сдача крови в качестве донора

252. [T000469] ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА НА

- А) информационном стенде медицинской организации
- Б) сайте Государственной Думы РФ
- В) сайте Роспотребнадзора
- Г) информационном стенде Министерства здравоохранения РФ

253. [T000472] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) перед медицинским вмешательством
- Б) после первичного осмотра врачом
- В) после медицинского вмешательства
- Г) перед постановкой диагноза

254. [T000473] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОДПИСЫВАЕТСЯ

- А) гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и медицинским работником
- Б) гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и главным врачом
- В) гражданином, законным представителем и руководителем медицинской организации
- Г) гражданином, медицинским работником и представителем страховой медицинской Организации

255. [T000475] СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БОЛЬНЫХ, СОСТОЯЩИХ НА ПИТАНИИ НА 9 ЧАСОВ УТРА, ПОДАЮТСЯ ДИЕТИЧЕСКОЙ СЕСТРЕ ПИЩЕБЛОКА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- А) старшими медицинскими сестрами отделений
- Б) палатными сестрами отделений
- В) заведующим отделением
- Г) главной медсестрой

256. [T000477] ПОКАЗАНИЯМИ К НЕОТЛОЖНОМУ ПЕРЕВОДУ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР БОЛЬНОГО С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) его непосредственная опасность для себя и окружающих

Б) галлюцинации, бред и нарушение сознания

В) снижение интеллекта, нарушение памяти

Г) астения, навязчивые состояния

257. [T000478] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕЛАНОМУ НЕОБХОДИМА

- А) консультация врача-онколога
- Б) криодеструкция
- В) диатермокоагуляция
- Г) обработка кожи 10% настойкой йода

258. [T000483] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БАЗАЛИОМУ КОЖИ НЕОБХОДИМА

- А) консультация врача-онколога
- Б) асептическая повязка
- В) диатермокоагуляция
- Г) смазывание ляписным карандашом

259. [T000484] ПОСТРАДАВШИХ С ВЫВИХОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАПРАВИТЬ В

- А) травматологический пункт
- Б) поликлинику
- В) хирургический стационар
- Г) стоматологический стационар

260. [T000485] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СБОРОМ МОЧИ И ДОСТАВКОЙ В ЛАБОРАТОРИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ

- А) 4 часов
- Б) 8 часов
- В) 2 часов
- Г) 1 часа

261. [T000486] ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ИЗ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЛЕЧЕБНОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

А) пешком

Б) на кресле-каталке

В) на каталке

Г) на носилках

262. [T000487] В БЛАНКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ

А) домашний адрес

Б) отделение

В) диагноз

Г) возраст

263. [T000489] НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ОФОРМЛЯЕТ

А) постовая медицинская сестра

Б) врач

В) процедурная медицинская сестра

Г) лаборант

264. [T000490] КАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАВЛЕН В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕПЛЫМ, В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИНУТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НА

А) простейшие

Б) бактериологическое исследование

В) яйца гельминтов

Г) копрологическое исследование

265. [T000491] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАДИОИЗОТОПНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ НЕОБХОДИМО

А) исключить применение препаратов йода и брома

Б) проводить профилактику метеоризма

В) очистить кишечник

Г) исключить применение препаратов железа и висмута

266. [T000494] ДЛЯ УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ БЫЛ А) наполнен

Б) опорожнен с помощью катетера

В) опорожнен

Г) не имеет значения для проведения исследования

267. [T000497] ПУСТЫЕ АМПУЛЫ ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

А) сдать в поликлинику старшей медицинской сестре

Б) выбросить

В) оставить дома у пациента

Г) сдать хирургу-онкологу поликлиники

268. [T000500] ПАЦИЕНТ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА ПО ПОВОДУ ГЕПАТИТА В НАБЛЮДАЕТСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

А) врача-инфекциониста

Б) врача-педиатра

В) врача-терапевта

Г) врача-гастроэнтеролога

269. [T000501] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ

А) в прививочном кабинете

Б) в физиотерапевтическом кабинете

В) в процедурном кабинете

Г) в перевязочном кабинете

270. [T000502] ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КЛЕЩА НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЮТ

А) в микробиологическую лабораторию

Б) в бактериологическую лабораторию

В) в клиническую лабораторию

Г) в биохимическую лабораторию

**271. [T000503] САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ НА КУРОРТАХ**

- А) местного значения
- Б) удаленных от дома
- В) зарубежных
- Г) в условиях горного климата

**272. [T000505] ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКАСТЯМИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА**

- А) поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения, заведующего отделением
- Б) обратиться к главному врачу
- В) провести текущую уборку процедурного кабинета
- Г) уволиться

**273. [T000506] ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ ПРОВОДЯТ**

- А) медицинские, педагогические работники и работники правоохранительных органов
- Б) медицинские работники и работники правоохранительных органов
- В) педагогические работники и работники правоохранительных органов
- Г) работники правоохранительных органов

**274. [T000508] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ**

- А) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
- Б) получение медицинской помощи минимального объема
- В) выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности.

**Г) бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи**

**275. [T000509] СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

- А) контролирует качество оказания медицинской помощи
- Б) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов
- В) участвует в лицензировании медицинских организаций
- Г) участвует в аттестации медицинских работников

**276. [T000510] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) составной частью государственной системы социального страхования
- Б) системой, направленной на повышение размеров оплаты труда
- В) страхованием от несчастных случаев
- Г) системой, направленной на защиту прав медицинских работников

**277. [T000516] МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ**

- А) 125 ударов в минуту
- Б) 155 ударов в минуту
- В) 175 ударов в минуту
- Г) 95 ударов в минуту

**278. [T000519] В КАБИНЕТЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ**

- А) не нуждающихся во врачебном приеме
- Б) имеющих талоны к врачу на день обращения
- В) по самозаписи
- Г) с легкими формами заболевания

**279. [T000532] ОДЫШКА - ЭТО**

А) нарушение ритма, глубины, частоты дыхания

Б) удлинение вдоха

В) укорочение вдоха

Г) удлинение выдоха

280. [T000535] ПЕРИОД, КОГДА СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ УГАСАЮТ, НО ВОЗБУДИТЕЛЬ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ В ОРГАНИЗМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) клиническим выздоровлением

Б) микробоносительством

В) микробиологическим выздоровлением

Г) иммунологическим

281. [T000536] ЕСЛИ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ ЭНЦЕФАЛИТОМ, КЛЕЩ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) переносчиком инфекции

Б) фактором передачи инфекции

В) входными воротами инфекции

Г) механизмом передачи инфекции

282. [T000538] СТЕРИЛИЗАЦИЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОВОДЯТ В

А) центральном стерилизационном отделении

Б) предоперационной комнате

В) специальном помещении операционного блока

Г) хирургическом отделении

283. [T000541] ЗАХОРОНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРОВОДЯТ

А) специализированные организации

Б) операционные медицинские сестры

В) младшие медицинские сестры

Г) старшие медицинские сестры

284. [T000542] ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРОИСХОДИТ А) за пределами территории учреждения здравоохранения

Б) на территории учреждения здравоохранения

В) на месте образования отходов

Г) в специальных помещениях лечебного отделения

285. [T000543] ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ КЛАССА Д ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

А) организациями по обращению с радиоактивными отходами

Б) организациями по обращению с бытовыми отходами

В) организациями по обращению с токсикологически опасными отходами

Г) организациями по обращению с промышленными отходами

286. [T000544] ТЕЛО УМЕРШЕГО ПАЦИЕНТА ТРАНСПОРТИРУЮТ В

А) патологоанатомическое отделение

Б) приемное отделение

В) реанимационное отделение

Г) терапевтическое отделение

287. [T000546] ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ

А) врач приемного отделения

Б) медицинская сестра смотрового кабинета

В) персонал санпропускника

Г) медицинская сестра приемного отделения

288. [T000547] ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР НАЗЫВАЕТСЯ

А) стерилизацией

Б) дезинфекцией

В) дезинсекцией

Г) демеркуризацией

289. [T000551] ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ

А) заключительная

Б) очаговая

В) профилактическая

Г) текущая

290. [T000552] ИНФЕКЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ПРОЦЕСС ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ОРГАНЕ ИЛИ ТКАНИ, НАЗЫВАЮТСЯ

А) очаговой

Б) экзогенной

В) генерализованной

Г) эндогенной

291. [T000553] ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ОДНИМ ВИДОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ, ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

А) моноинфекций

Б) смешанных инфекций

В) вторичных инфекций

Г) хронических инфекций

292. [T000554] К МЕХАНИЧЕСКОМУ СПОСОБУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

А) влажная уборка помещений

Б) кипячение

В) ультрафиолетовое облучение

Г) использование формалина

293. [T000555] К ХИМИЧЕСКОМУ СПОСОБУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

А) использование формалина

Б) влажная уборка помещений

В) фильтрация воздуха

Г) ультрафиолетовое облучение

294. [T000556] К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА МИКРООРГАНИЗМЫ, ОТНОСИТСЯ А) температура

Б) фенол

В) хлорная известь

Г) спирт

295. [T000561] ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

А) высокая надежность стерилизации

Б) высокий уровень ручного труда

В) большой объем инвестиций

Г) хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах

296. [T000564] ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА КОЖУ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ ЕЁ

А) 70% спиртом

Б) 3% перекисью водорода

В) 1% р-ром хлорамина

Г) 1-2 % р-ром протаргола

297. [T000565] КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ

А) 10-12 литров

Б) 3-4 литра

В) 5-6 литров

Г) 7-8 литров

298. [T000567] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ЭТО

А) комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность

Б) просветительная деятельность

В) обучающая деятельность

Г) воспитательная деятельность

299. [T000568] КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) положительные изменения в состоянии здоровья

Б) расширение кругозора по медико-генетическим вопросам

В) обучение распознаванию признаков заболеваний

Г) выработка динамического стереотипа поведения в жизни

300. [T000572] ВЫРАБОТКА СПОСОБНОСТИ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ МЕДИЦИНСКИЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) умения

Б) знания

В) навыки

Г) убеждения

301. [T000582] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) вторичной профилактикой

Б) первичной профилактикой

В) популяционной профилактикой

Г) социальной профилактикой

302. [T000583] ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

А) общением между специалистом и пациентом

Б) общение специалиста с группой пациентов

В) общением между специалистом и большим количеством пациентов

Г) общением между группами специалистов

303. [T000584] МАССОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ А) общением между специалистом и большим количеством пациентов

Б) общением между специалистом и пациентом

В) общение специалиста с группой пациентов

Г) общением между группами специалистов

304. [T000585] ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

А) общением специалиста с группой пациентов

Б) общением между группами специалистов

В) общением между специалистом и большим количеством пациентов

Г) общением между специалистом и пациентом

305. [T000617] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

А) факторах риска

Б) лечении

В) симптомах

Г) диагностики

306. [T000618] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

А) биологических особенностях возбудителя

Б) лечении

В) симптомах

Г) диагностики

307. [T000620] РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- А) всех медицинских работников
- Б) только средних медицинских работников
- В) только врачей
- Г) только врача общей практики

308. [T000621] РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАЦИОНАРЕ НАПРАВЛЕНА НА

- А) пациентов, находящихся в стационаре
- Б) взрослое население, проживающее на территории обслуживания стационара
- В) все население, проживающее на территории обслуживания стационара
- Г) работающую часть населения, проживающую на территории обслуживания стационара

309. [T000632] ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЧАЩЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО

- А) профилю заболевания
- Б) составу обратившихся
- В) возрасту
- Г) половому составу

310. [T000634] ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- А) врач, медицинская сестра, фельдшер
- Б) только медицинская сестра
- В) только фельдшер
- Г) только врач

311. [T000638] ОТДАЛЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний

Б) повышение информированности населения о мерах профилактики В) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни

- Г) сохранение здоровья

312. [T000641] К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) беседа
- Б) викторина
- В) дискуссия
- Г) доклад

313. [T000643] К СРЕДСТВАМ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) беседа
- Б) муляж
- В) видеофильм
- Г) листовка

314. [T000644] К СРЕДСТВАМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) видеофильм
- Б) лекция
- В) дискуссия
- Г) беседа

315. [T000645] К СРЕДСТВАМ ПЕЧАТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) памятка
- Б) лекция
- В) беседа
- Г) фотография

316. [T000646] К СРЕДСТВАМ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

А) лекция

Б) буклет

В) рисунок

Г) фантом

317. [T000648] К СРЕДСТВАМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ, ОТНОСИТСЯ А) телепрограмма

Б) санитарный бюллетень

В) брошюра

Г) памятка

318. [T000655] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

А) до рождения ребёнка

Б) с первого года жизни ребёнка

В) в детском саду

Г) в школе

319. [T000656] ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К РОСТУ АБОРТОВ И РОДОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции

Б) экологическая ситуация

В) широкая доступность информации о половом воспитании

Г) избыточное использование контрацептивов

320. [T000657] ПРИВИВАТЬ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ

А) родители

Б) воспитатели

В) учителя Г) медицинские работники

321. [T000658] СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕР ПО ВОСПИТАНИЮ У ПОДРОСТКОВ ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОПРОСАМ ПОЛА НАЗЫВАЕТСЯ А) половым воспитанием

Б) санитарным воспитанием

В) гигиеническим воспитанием

Г) социальным воспитанием

322. [T000663] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ

А) формирования общественного мнения

Б) удовлетворения потребности в здоровом образе жизни

В) формирования умений

Г) формирования навыков

323. [T000665] ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

А) врач, медицинская сестра

Б) только врач

В) только медицинская сестра

Г) младший медицинский персонал

324. [T000668] РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДГОТОВКА ИХ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ ОТНОСИТСЯ К ФУНКЦИИ СЕМЬИ

А) репродуктивной

Б) рекреативной

В) воспитательной

Г) хозяйственно-экономической

325. [T000669] ОДНОСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) доклад

Б) дискуссия

В) викторина

Г) игра

326. [T000670] ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) дискуссия

Б) доклад

В) сообщение

Г) выступление

327. [T000684] СПЕЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) школа пациентов

Б) углубленное консультирование

В) краткое консультирование

Г) массовое консультирование

328. [T000694] ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ТРЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  
В А) информировании, мотивировании, обучении пациента

Б) информировании, воспитании, обучении пациента

В) мотивировании, воспитании, обучении пациента

Г) информировании, мотивировании, воспитании пациента

329. [T000704] ИСТОЧНИКОМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ  $\Omega$ -6 И  $\Omega$ -3 УЧАСТВУЮЩИХ В ЖИРОВОМ ОБМЕНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) растительное масло

Б) колбаса

В) свиное сало

Г) сметана

330. [T000705] ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В

МИКРОНУТРИЕНТАХ (ВИТАМИНАХ И МИНЕРАЛАХ) ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ А) натуральные продукты, сбалансированные по составу

Б) рацион с повышенным содержанием белка животного происхождения

В) рафинированные углеводы

Г) рацион с повышенным содержанием жиров

331. [T000706] НУТРИЦЕВТИКИ (БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ) ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ

А) направленного изменения состава пищи

Б) покрытия потребности в энергии

В) лечения заболеваний

Г) для профилактики рецидива заболевания

332. [T000707] ОСОБЕННОСТИ СОЛЕВОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИИ РАССМАТРИВАЮТ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ

А) мочекаменной болезни

Б) анемии

В) диабета

Г) анорексии

333. [T000712] ПОКРАСНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОВЫШЕНИИ КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ, РАЗВИТИИ

А) артериальной гиперемии

Б) венозной гиперемии

В) лимфостазе

Г) ишемии

334. [T000713] ЦИАНОЗ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

А) венозной гиперемии

Б) артериальной гиперемии

В) лимфостазе

Г) ишемии

335. [T000714] ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ А) ишемии

Б) лимфостазе

В) венозной гиперемии

Г) артериальной гиперемии

336. [T000715] ПОБЛЕДНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ

А) ишемии

Б) лимфостазе

В) венозной гиперемии

Г) артериальной гиперемии

337. [T000716] ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ

А) лихорадка

Б) воспаление

В) дистрофия

Г) тромбоз

338. [T000717] ПОКРАСНЕНИЕ, БОЛЬ, ОТЕК ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ А) воспаления

Б) дистрофии

В) тромбоза

Г) склероза

339. [T000718] ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ ЖЕЛТУХЕ

А) желтый

Б) синий

В) красный

Г) бледный

340. [T000720] СКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ А) асцит

Б) анасарка В) гидронефроз

Г) гидроцеле

341. [T000721] ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ А) Федеральный закон Б) постановление Правительства РФ

В) приказ Министерства здравоохранения РФ

Г) постановление Верховного Суда РФ

342. [T000726] ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

А) руководителя медицинской организации, в которой он работает

Б) федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения

В) прокуратуру

Г) Роспотребнадзор региона

343. [T000728] ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА НЕ РЕГУЛИРУЕТ А) сокращение мышечных волокон скелетных мышц

Б) тонус гладких мышц сосудов

В) тонус гладких мышц внутренних органов

Г) сокращения сердечной мышцы

344. [T000759] ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ

А) воспитанием и обучением детей

Б) контролем за транспортировкой питьевой воды

В) утилизацией бытовых отходов

Г) уборкой помещений

**345. [T000760] НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОКАЗЫВАЕТ**

- А) мотивация к сохранению здоровья
- Б) наследственность
- В) трудовое воспитание
- Г) художественный образ (герой фильма, литературный герой)

**346. [T000766] К ЧИСЛУ ВАЖНЕЙШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТНОСИТСЯ**

- А) гигиеническое обучение и воспитание населения для формирования здорового образа жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья
- Б) создание и функционирование сети центров медицинской профилактики
- В) участие в хосписном движении, волонтерстве
- Г) запрет полового воспитания для детей школьного возраста

**347. [T000767] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- А) артериальная гипертензия
- Б) дизурия
- В) анемия
- Г) дорсопатия

**348. [T000768] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- А) гиперхолестеринемия
- Б) дизурия
- В) анемия
- Г) дорсопатия

**349. [T000769] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ А)**

**дислипидемия**

- Б) дизурия

**В) анемия**

**Г) дорсопатия**

**350. [T000770] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- А) гипергликемия
- Б) дизурия
- В) истерия
- Г) дорсопатия

**351. [T000772] ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ БЕЛКИ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ**

- А) 10-15% от суточного рациона
- Б) не менее 25% от суточного рациона
- В) 30-40% от суточного рациона
- Г) 40-50 % от суточного рациона

**352. [T000774] МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ В ВОЗРАСТЕ 75 ЛЕТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ**

- А) 145 ударов в минуту
- Б) 125 ударов в минуту
- В) 175 ударов в минуту
- Г) 110 ударов в минуту

**353. [T000782] СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 5 лет
- Б) 3 года
- В) 1 год
- Г) 10 лет

**354. [T000791] НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ**

- А) состоянию покоя (человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи)

Б) 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

В) 10 тысячам шагов в сутки

Г) 20 тысячам шагов в сутки вне помещения

### 355. [T000792] УМЕРЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

А) несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки

Б) соответствует состоянию покоя в положении лежа или сидя

В) составляет менее 10 тысяч шагов в сутки вне помещения

Г) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает сильную одышку

### 356. [T000793] ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

А) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки

Б) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

В) соответствует состоянию покоя в положении сидя или лежа

Г) оставляет ощущение тепла и легкой одышки

### 357. [T000794] НАИБОЛЬШЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ

А) углеводы

Б) минеральные вещества

В) белки

Г) витамины

### 358. [T000795] ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО УМСТВЕННОМ ТРУДЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) адекватная физическая нагрузка

Б) пассивный отдых

В) потребление дополнительного количества пищи

Г) чтение, компьютерные игры

### 359. [T000796] ПАССИВНЫЙ ОТДЫХ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДОПУСТИМ

А) после выполнения работы, связанной со значительными затратами физической энергии

Б) преимущественно при умственном труде

В) после длительного сна

Г) в выходные и праздничные дни

### 360. [T000797] ОБЩИЙ УРОВЕНЬ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЕГО ГАРМОНИЧНОСТЬ У ГРУДНОГО РЕБЕНКА МОЖНО ОЦЕНİТЬ, ОПИРАЯСЬ НА

А) степень развития ведущей для данного возраста линии развития

Б) степень и быстроту прибавки массы тела

В) умение стоять и ходить

Г) данные антропометрических измерений

### 361. [T000803] ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

А) поддержку и поощрение к самостоятельности и самоутверждению

Б) опеку со стороны окружения

В) подавление стремления к самоутверждению и самостоятельности

Г) отказ от вмешательства в его воспитание

### 362. [T000805] НОРМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ – ЭТО

А) артериальное давление менее 140/90

Б) артериальное давление менее 130/85 В) артериальное давление менее 120/80

Г) артериальное давление менее 150/75

363. [T000806] В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ

А) не менее 400 гр.

Б) до 100 гр.

В) 300 гр.

Г) до 400 гр.

364. [T000808] ДОПУСТИМАЯ ДОЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В СУТКИ ДЛЯ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ

А) 80 мл – крепкие спиртные напитки или 300 мл – столовое вино или 660 мл – пива

Б) 40 мл – крепкие спиртные напитки или 150 мл – столовое вино или 330 мл – пива

В) 100 мл – крепкие спиртные напитки или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

Г) 300 мл – крепкого спиртного напитка или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

365. [T000809] ДОПУСТИМАЯ ДОЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В СУТКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ

А) 40 мл – крепкие спиртные напитки или 150 мл – столовое вино или 330 мл – пива

Б) 80 мл – крепкие спиртные напитки или 300 мл – столовое вино или 660 мл – пива

В) 100 мл – крепкие спиртные напитки или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

Г) 150 мл – крепкого спиртного напитка или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

366. [T000811] В ЭРЕКТИЛЬНОЙ СТАДИИ ШОКА РАЗВИВАЕТСЯ

А) тахикардия

Б) брадипноэ

В) брадикардия

Г) уремия

367. [T000812] ПРИЗНАКОМ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ А) потеря сознания

Б) сохранность сознания

В) сохранность сухожильных рефлексов

Г) сохранность реакции на болевое воздействие

368. [T000813] ОТЕК, НЕПОСРЕДСТВЕННО УГРОЖАЮЩИЙ ЖИЗНИ

А) отек Квинке

Б) гидроцеле

В) гидронефроз

Г) асцит

369. [T000814] ПРИ РАНЕНИИ КРУПНЫХ ВЕН РАЗВИВАЕТСЯ ЭМБОЛИЯ

А) воздушная

Б) газовая

В) жировая

Г) тканевая

370. [T000815] ОБЩИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК ОТКРЫВАЕТСЯ В КИШКУ

А) двенадцатиперстную

Б) сигмовидную

В) тощую

Г) подвздошную

371. [T000816] К ОДНОМУ ИЗ ОТДЕЛОВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОТНОСИТСЯ КИШКА А) сигмовидная

Б) двенадцатиперстная

В) подвздошная

Г) тощая

372. [T000817] К ОДНОМУ ИЗ ОТДЕЛОВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОТНОСИТСЯ КИШКА

А) прямая

Б) двенадцатиперстная

В) тощая

Г) подвздошная

373. [T000818] ТОПОГРАФИЧЕСКИ В ЖЕЛУДКЕ ВЫДЕЛЯЮТ

А) кардиальный отдел

Б) основание

В) верхнюю часть

Г) нисходящую часть

374. [T000819] К ЖЕЛУДКУ СЗАДИ ПРИЛЕЖИТ

А) поджелудочная железа

Б) тощая кишка

В) правая почка

Г) двенадцатиперстная кишка

375. [T000820] К МАССОВЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

А) радиопередача

Б) практическое занятие

В) беседа

Г) консультирование

376. [T000822] К СРЕДСТВАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА С НАСЕЛЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ

А) радиопередача

Б) дискуссия

В) беседа

Г) лозунг

377. [T000824] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

А) санитарно-просветительная работа

Б) оздоровлением населения

В) воспитательной работой

Г) профилактикой заболеваний

378. [T000826] ПРОГУЛКА ИЛИ БЕГ В СОЧЕТАНИИ С ОБЛИВАНИЕМ

ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ А) способы закаливания

Б) виды спорта В) нетрадиционные методы лечения

Г) традиционные методы лечения

379. [T000827] РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА С ВАНН

А) воздушных

Б) соляных

В) водных

Г) солнечных

380. [T000829] СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ – СООТНОШЕНИЕ

А) белков, жиров, углеводов

Б) белков животного и растительного происхождения

В) жиров животного и растительного происхождения

Г) моносахаридов и полисахаридов

381. [T000830] К ВОДОРАСТВОРИМЫМ ВИТАМИНАМ ОТНОСИТСЯ ВИТАМИН

А) С

Б) А

В) Д

Г) Е

382. [T000832] ГРУППЫ УПРАЖНЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ И ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМЫ

А) плавание

Б) гантельная гимнастика

В) прыжки в воду

Г) прыжки на батуте

383. [T000834] «ПОГЛАЖИВАНИЕ», «РАСТИРАНИЕ», «ВИБРАЦИЯ», «ПИЛЕНИЕ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

А) массажа

Б) аутогенной тренировки

В) самовнушения

Г) идеомоторной тренировки

384. [T000835] ВРЕДНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ  
МОНИТОРА

А) электромагнитные волны Б)  
инфракрасные волны

В) ультрафиолетовые волны

Г) альфа-излучение

385. [T000836] ПРИЧИНОЙ  
КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН,  
КРОВОИЗЛИЯНИЙ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ  
НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА

А) С

Б) Д

В) А

Г) В

386. [T000837] УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ  
МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С  
НЕДОСТАТКОМ В ПИЩЕ

А) витамина А

Б) белков

В) углеводов

Г) калия

387. [T000845] ГРУДНОЙ ВОЗРАСТ  
РЕБЕНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ С

А) 29-го дня после рождения до конца  
первого года жизни

Б) 7-го дня после рождения до конца  
первого года жизни

В) рождения до конца первого года жизни  
Г) 10-го дня после рождения до конца  
первого года жизни

388. [T000847] ПРИЧИНОЙ  
КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА

А) дрожжеподобные грибы

Б) стафилококк В) кишечная палочка

Г) аллергическая реакция

389. [T000849] ОСНОВНЫМ  
ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА  
ГИПЕРВОЗБУДИМОСТИ  
НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

А) судорожная готовность

Б) снижение рефлексов

В) мышечная гипотония

Г) анорексия

390. [T000850] ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ  
ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА  
ОРГАНИЗМ ОКАЗЫВАЕТ

А) непрямой билирубин

Б) холестерин

В) глюкоза

Г) белок

391. [T000851] НОВОРОЖДЕННОГО  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОРМИТЬ

А) по требованию ребенка

Б) 7 раз в сутки

В) 6 раз в сутки

Г) 8 раз в сутки

392. [T000852] АСФИКСИЯ  
НОВОРОЖДЕННОГО ЛЕГКОЙ  
СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ОЦЕНКЕ  
ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ)

А) 6-7

Б) 1-3

В) 4-5

Г) 8-10

393. [T000853] СРОКИ ВАКЦИНАЦИИ  
ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА

А) 3-7 день жизни

Б) 4-6 день жизни

В) 7-8 день жизни

Г) 8-9 день жизни

394. [T000856] НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СЕПСИСА У НОВОРОЖДЕННЫХ

А) пузырчатка новорожденных

Б) потница

В) гемангиома

Г) аллергический дерматит

395. [T000857] ТЯЖЕЛАЯ АСФИКСИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ)

А) 1-3

Б) 4-5

В) 6-7

Г) 8-10

396. [T000858] ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ДОЛЖНА БЫТЬ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

А) 20-22

Б) 18-19

В) 25-26

Г) 27-29

397. [T000859] ВОСПАЛЕНИЕ ПУПОЧНОЙ РАНКИ НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЕТСЯ

А) омфалит

Б) дерматит

В) потница

Г) гемангиома

398. [T000860] ЧАСТОТА КУПАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

А) ежедневно

Б) 2 раза в неделю

В) 1 раз в неделю

Г) 1 раз в 10 дней

399. [T000861] СДАВЛЕННЫЙ "ПЕТУШИНЫЙ" КРИК НА ВДОХЕ У РЕБЕНКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ А) ларингоспазме

Б) бронхиальной астме В) бронхите

Г) фарингите

400. [T000862] СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА (В МИН)

А) 140

Б) 170 В) 110

Г) 90

401. [T000863] ПРИ РАХИТЕ В ОСНОВНОМ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ

А) фосфорно-кальциевого обмена

Б) обмена железа

В) жирового обмена

Г) углеводного обмена

402. [T000864] ПРОДУКТ, СОДЕРЖАЩИЙ ВИТАМИН Д

А) рыбий жир

Б) ячневая крупа

В) морковь

Г) шпинат

403. [T000865] К ПАРАТРОФИИ ОТНОСЯТСЯ СОСТОЯНИЯ

А) с избыtkом массы тела более 10%

Б) с избыtkом массы тела от 5 до 9%

В) с дефицитом массы тела более 10%

Г) с избыtkом массы тела и роста более 10%

404. [T000868] ГИПЕРЕМИЯ И ШЕЛУШЕНИЕ КОЖИ ЩЕК ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ НАЗЫВАЕТСЯ

А) молочным струпом

Б) строфулюсом

В) экземай

Г) гнейсом

405. [T000869] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ОСТРИЦАМИ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) энтеробиоз

Б) аскаридоз

В) трихоцефалез

Г) лямблиоз

406. [T000871] У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ В ПОКОЕ НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ (В МИН)

А) 100

Б) 80

В) 60

Г) 120

407. [T000872] ГИПОТРОФИЯ – ЭТО РАССТРОЙСТВО ПИТАНИЯ

А) с дефицитом массы тела

Б) с нормальной массой тела

В) без нарушений массы тела

Г) с превышением массы тела

408. [T000876] ОСНОВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА

А) творожистые высыпания на слизистой полости рта

Б) молочный струп на лице

В) язвочки на слизистой полости рта

Г) боль при глотании и увеличение лимфоидной ткани

409. [T000877] АУТОИНВАЗИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

А) энтеробиоза

Б) аскаридоза В) трихоцефалеза

Г) для всех гельминтозов

410. [T000878] ГЕМОФИЛИЯ – ЭТО А) наследственные нарушения свертывания крови Б) заболевание, возникающее вследствие уменьшения количества тромбоцитов

В) инфекционно-аллергическое заболевание

Г) авитаминоз

411. [T000879] ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ

А) грубый, “лающий”

Б) продуктивный, влажный

В) сухой, навязчивый

Г) приступообразный

412. [T000880] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А) курение

Б) ОРВИ

В) переохлаждение

Г) гиповитаминос

413. [T000881] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) пневмококк

Б) вирус

В) микоплазма

Г) стафилококк

414. [T000882] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ РАЗВИТИЕМ ВОСПАЛЕНИЯ В РАСПЫРЕННЫХ БРОНХАХ ЯВЛЯЕТСЯ

А) бронхэкстatische болезнь

Б) абсцесс легкого

В) крупозная пневмония

Г) экссудативный плеврит

415. [T000883] ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ А) бета-гемолитический стрептококк

Б) хеликобактерпилори

В) кишечная палочка Г) золотистый стафилококк

416. [T000884] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ

- А) высокий уровень холестерина
- Б) занятия физической культурой
- В) неотягощенная наследственность
- Г) рациональное питание

417. [T000885] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРЖАЮТСЯ

- А) аорта и крупные артерии
- Б) венулы и крупные вены
- В) соединительная ткань и суставы
- Г) капилляры

418. [T000886] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиподинамия
- Б) гиповитаминос
- В) гипотония
- Г) переохлаждение

419. [T000887] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) атеросклероз коронарных артерий
- Б) порок сердца
- В) ревматический эндокардит
- Г) ревматический миокардит

420. [T000890] ПОЛИФАГИЯ – ЭТО

- А) чрезмерное потребление пищи

Б) чрезмерное потребление жидкости В)

повышенное выделение мочи

Г) уменьшение количества мочи

421. [T000895] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ А) небольшое количество вязкой стекловидной мокроты

Б) большое количество гнойной мокроты  
В) мокрота в виде «малинового желе»

Г) «ржавая» мокрота

422. [T000896] ПАЦИЕНТ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ

А) бронхэкститической болезни

Б) экссудативном плевrite

В) крупозной пневмонии

Г) бронхиальной астме

423. [T000897] ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

А) крупозной пневмонии

Б) остром бронхите

В) бронхиальной астме

Г) сухом плевrite

424. [T000898] ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

А) вечером на ногах

Б) утром на лице

В) вечером на лице

Г) утром на ногах

425. [T000899] ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

А) гипертоническом кризе

Б) коллапсе

В) кардиогенном шоке

Г) обмороке

426. [T000900] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ РЕВМОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боль в области сердца
- Б) головная боль
- В) снижение аппетита
- Г) слабость

427. [T000901] ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ

- А) острыя боль в сердце
- Б) выбухание вен шеи
- В) удушье
- Г) головная боль

428. [T000902] ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боль за грудиной продолжительностью более 20 минут
- Б) низкое артериальное давление
- В) брадикардия или тахикардия
- Г) холодный пот и резкая слабость

429. [T000903] ВЕДУЩИМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) стресс, хеликобактерная инфекция
- Б) переохлаждение, переутомление
- В) ОРВИ, переохлаждение
- Г) гиповитаминоз, переутомление

430. [T000904] ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ КАЛ БЫВАЕТ

- А) дегтеобразный
- Б) жирный
- В) обесцвеченный
- Г) кровянистый

431. [T000907] ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА

МОЖЕТ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНО А) приемом жирной пищи

- Б) острой респираторной вирусной инфекцией
- В) приемом углеводов
- Г) переохлаждение

432. [T000908] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) боль в правом подреберье, горечь во рту
- Б) отрыжка тухлым, рвота
- В) рвота «кофейной гущей», мелена
- Г) асцит, сосудистые звездочки

433. [T000910] ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пищеводное кровотечение
- Б) желтуха
- В) снижение аппетита
- Г) кожный зуд

434. [T000911] ПЕЧЕНОЧНАЯ КОЛИКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) желчнокаменной болезни
- Б) гастрите
- В) панкреатите
- Г) язвенной болезни

435. [T000913] ПРИЗНАК ИНФИЦИРОВАНИЯ КРОВИ ВО ФЛАКОНЕ

- А) плазма мутная, с хлопьями
- Б) плазма окрашена в розовый цвет
- В) плазма прозрачная
- Г) кровь 3-х слойная, плазма прозрачная

436. [T000915] ОГРАНИЧЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ ГНОЯ В ТКАНЯХ-

- А) абсцесс
- Б) гематома

В) флегмона

Г) атерома

437. [T000917] ВОСПАЛЕНИЕ  
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ-ЭТО

А) лимфаденит

Б) гидраденит

В) лимфангит

Г) лимфаденопатия

438. [T000918] ОСТРЫЙ  
ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ –  
ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ А) костного мозга и  
кости

Б) фаланг пальцев

В) коленного сустава

Г) венозных сосудов

439. [T000921] АБСОЛЮТНЫМ  
ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ

А) патологическая подвижность костных  
отломков

Б) отек

В) деформация сустава

Г) деформация мягких тканей

440. [T000922] СИМПТОМ,  
ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫВИХА  
А) пружинящая фиксация

Б) нарушение функции

В) боль

Г) гиперемия

441. [T000923] РАНА ЯВЛЯЕТСЯ  
ПРОНИКАЮЩЕЙ, ЕСЛИ

А) повреждены мягкие ткани и  
пограничная серозная оболочка

Б) в ней находится инородное тело

В) повреждены только кожа и подкожная  
клетчатка

Г) повреждены мышцы и кости

442. [T000924] МЕСТНЫЙ СИМПТОМ  
РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ А)  
гиперемия кожи с четкими границами

Б) разлитое покраснение кожи

В) подергивание мышц

Г) инфильтрация с цианотичным оттенком  
кожи

443. [T000928] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИЩЕВОЙ  
ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) проникновение в организм токсигенных  
микроорганизмов

Б) проникновение в организм  
непатогенной микрофлоры

В) нарушение личной гигиены

Г) употребление ядохимикатов с  
продуктами

444. [T000929] ПРИЧИНОЙ ПЛАНОВОЙ  
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) возможные осложнения с развитием  
неотложных состояний

Б) наличие свободных мест в стационаре  
В) неадекватное поведение пациента

Г) бессознательное состояние пациента

445. [T000931] СЫПНОЙ ТИФ  
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

А) наличием гепатолиенального синдрома

Б) постепенным началом болезни

В) высокой лихорадкой длительностью до  
7-10 дней

Г) полиаденопатией

446. [T000932] ПРИЧИНОЙ  
ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТИТОМ С  
МОЖЕТ БЫТЬ

А) прямое переливание крови без  
обследования донора

Б) употребление недоброкачественной  
воды

В) употребление просроченных продуктов  
питания

- Г) пользование общей посудой
447. [T000934] ПРИЧИНОЙ НАЛОЖЕНИЯ КАРАНТИНА НА ГРУППУ ДЕТСКОГО САДА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) наличие контактных детей в группе
- Б) перевод детей в другую группу
- В) проведение дезинфекции
- Г) бактериологическое обследование персонала
448. [T000935] ОСНОВНЫМ ПЕРЕНОСЧИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) платяная вошь
- Б) постельный клещ
- В) травяной клещ
- Г) комар
449. [T000937] ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ
- А) собаки, лисы, кошки, волки
- Б) утки, гуси
- В) иксодовые клещи Г) полевые мыши
450. [T000938] КОЛИЧЕСТВО МОЧИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ УМЕНЬШАЕТСЯ В
- А) олигурическом периоде
- Б) лихорадочном периоде
- В) полиурическом периоде
- Г) период реконвалесценции
451. [T000941] НАЗОВИТЕ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ШИГЕЛЛЕЗА
- А) контактно-бытовой
- Б) воздушно- капельный
- В) парентеральный
- Г) воздушно - пылевой

452. [T000942] НАЗОВИТЕ ВЕДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ГРИППА
- А) лихорадка, катаральные явления Б) диспептические расстройства, цианоз
- В) головная боль, головокружение
- Г) тахикардия, одышка
453. [T000944] ЧАЩЕ ВСЕГО ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ БОЛЕЮТ ДЕТИ
- А) посещающие детские учреждения
- Б) живущие в домашних условиях
- В) с достаточным иммунитетом
- Г) с нарушением слуха
454. [T000945] УКАЖИТЕ ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА А
- А) фекально-оральный
- Б) аэрогенный
- В) половой
- Г) вертикальный
455. [T000946] К АНТРОПОЗООНОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
- А) сибирская язва, бешенство
- Б) грипп, корь, рожа свиней
- В) куриная холера, грипп
- Г) сальмонеллез, холера
456. [T000947] ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) больной человек
- Б) реконвалесцент
- В) животные - резервуар вируса
- Г) птицы-резервуар вируса
457. [T000948] ДЛЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНО
- А) невралгические боли
- Б) разлитая гиперемия кожных покровов
- В) зуд в ночное время
- Г) отрубевидное шелушение

**458. [T000950] ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОРОДАВОК ЯВЛЯЕТСЯ**

- A) фильтрующийся вирус
- B) стрептококк
- C) аллергизация организма
- D) заболевание пищеварительного тракта

**459. [T000952] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ГОНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- A) гнойные выделения из уретры
- B) лихорадка
- C) зуд гениталий
- D) нарушения сна

**460. [T000953] ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОЙ АНГИНЫ**

- A) боль при глотании
- B) нарушение носового дыхания
- C) снижение слуха
- D) потеря голоса

**461. [T000956] ВОСПАЛЕНИЕ ГОРТАНИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- A) ларингит
- B) фарингит
- C) тонзиллит
- D) эзофагит

**462. [T000958] ТИПИЧНАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА**

- A) одиночество
  - B) склонность к суициду
  - C) отказ от участия в общественной жизни
  - D) злоупотребление алкоголем
- 463. [T000960] ОСНОВНЫЕ РАННИЕ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ:**
- A) длительный субфебрилитет, покашливание

**Б) одышка, "ржавая" мокрота В) приступ удушья, стекловидная мокрота**

**Г) лихорадка, кашель с гнойной мокротой**

**464. [T000965] ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕМОРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- A) атеросклероз сосудов головного мозга
- B) психо - эмоциональное перенапряжение
- C) нерациональное питание
- D) избыточный вес

**465. [T000968] ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ**

- A) потеря зрения
- B) остеопороз
- C) легочное кровотечение
- D) печеночная кома

**466. [T000969] ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА**

- A) слизистой оболочке щек
- B) туловище
- C) конечностях
- D) лице

**467. [T000971] ПРИЗНАКИ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ**

- A) гиперемия, отек, усиление боли
- B) побледнение краев
- C) промокание повязки кровью
- D) выхождение кишечных петель под кожу

**468. [T000972] ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗАНОЙ РАНЫ**

- A) края ровные, зияет
- B) большая глубина, точечное входное отверстие
- C) края неровные, вокруг кровоизлияние
- D) края неровные, зияет

469. [T000973] ХАРАКТЕР БЕЛЕЙ ПРИ ТРИХОМОНИАЗЕ

- А) пенистые, с неприятным запахом
- Б) гнойные
- В) творожистые
- Г) кровянистые

470. [T000974] ДЛЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ХАРАКТЕРНО

- А) трепет кистей
- Б) нарушение координации
- В) умственная деградация
- Г) параличи конечностей

471. [T000975] ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

- А) приступообразные боли в одной половине лица
- Б) ригидность затылочных мышц
- В) рвота
- Г) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей

472. [T000976] ОЩУЩЕНИЕ "ТРЕСКА" В ШЕЕ ПРИ ПОВОРОТАХ ГОЛОВЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) остеохондроза
- Б) энцефалита
- В) опухоли головного мозга
- Г) менингита

473. [T000977] НАИБОЛЕЕ ОБЩИЙ СИМПТОМ ШИЗОФРЕНИИ

- А) отгороженность, отрыв от реальности, погружение в мир собственных переживаний
- Б) амбулаторный автоматизм
- В) маниакальное возбуждение
- Г) отвлекаемость

474. [T000978] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ ЧЕСОТКЕ А) межпальцевые складки кистей

- Б) слизистые оболочки
  - В) ладони и подошвы Г) лицо
475. [T000979] ДЛЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ
- А) пузырьки, эрозии, корки
  - Б) узелки, чешуйки, гиперпигментация
  - В) лихорадка, лимфаденит
  - Г) опоясывающие боли, зуд

476. [T000980] РАНЫ НАЗЫВАЮТСЯ СКВОЗНЫМИ, ЕСЛИ

- А) имеются входное и выходное отверстия
- Б) имеется только входное отверстие
- В) имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба
- Г) повреждена кожа

477. [T000981] ВОСПАЛЕНИЕ КРАЕВ ВЕК НАЗЫВАЕТСЯ

- А) блефарит
- Б) халазион
- В) конъюнктивит
- Г) ячмень

478. [T000982] ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛЛИНОЗНОГО (СЕННОГО) КОНЬЮНКТИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) аллергия
- Б) травма
- В) гиповитаминоз
- Г) инфекция

479. [T000983] ДЛЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ ХАРАКТЕРНЫ

- А) постепенное безболезненное падение зрения  
Б) радужные круги вокруг источника света  
В) выраженные распирающие боли в глазу  
Г) острые приступы повышения внутриглазного давления

480. [T000985] ПЕРВИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ А)  
пустула

- Б) лихенизация  
В) трещина  
Г) рубец

481. [T000986] СИМПТОМ,  
ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВОЙ  
ГАНГРЕНЫ

А) симптом "тугой повязки"

- Б) опистотонус  
В) судорожное сокращение  
поперечнополосатых мышц  
Г) стихание болей в ране

482. [T000991] ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ –  
ЭТО

- А) увеличение слюнообразования  
Б) нарушение всасывания в кишечнике  
В) расстройство переваривания в желудке  
Г) нарушение желчевыделения

483. [T000993] АХОЛИЯ – ЭТО

- А) нарушение поступления желчи в  
кишечник  
Б) нарушение всасывания в кишечнике  
В) расстройство переваривания в желудке  
Г) уменьшение слюнообразования

484. [T000994] ОБСТРУКТИВНЫЙ  
СИНДРОМ – ЭТО

- А) нарушение проходимости  
воздухоносных путей

- Б) нарушение растяжимости легочной ткани

- В) утолщение альвеоло-капиллярной мембранны

- Г) нарушение вентиляционно-перфузионных отношений

485. [T001000] ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ  
АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ А) сальбутамол

- Б) пропранолол (анаприлин)  
В) метопролол  
Г) бисопролол

486. [T001003] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  
ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ РЕФЛЕКТОРНО  
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИЮ  
ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

- А) раствор аммиака  
Б) морфин  
В) налоксон  
Г) фенобарбитал

487. [T001008] ПРИ ОТРАВЛЕНИИ  
НАРКОТИЧЕСКИМИ  
АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) налоксон  
Б) феназепам  
В) афобазол  
Г) диазепам

488. [T001010] ПРЕПАРАТОМ  
БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА  
ЯВЛЯЕТСЯ

- А) парацетамол  
Б) галоперидол  
В) хлорпромазин (аминацин)  
Г) флюоксетин

489. [T001011] СРЕДСТВО ДЛЯ  
НАРКОЗА

- А) ксенон  
Б) парацетамол

В) кофеин

Г) эфедрин

490. [T001015] СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО

А) нитразепам

Б) пирацетам

В) налоксон

Г) ибuproфен

491. [T001017] К БЛОКАТОРАМ СА-КАНАЛОВ ОТНОСИТСЯ А) верапамил

Б) метопролол

В) эналаприл

Г) лозартан

492. [T001018] К ГРУППЕ НИТРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИБС, ОТНОСИТСЯ

А) нитроглицерин

Б) ивабрадин

В) триметазидин

Г) верапамил

493. [T001019] К ГИПОТЕНЗИВНЫМ СРЕДСТВАМ ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ АПФ ОТНОСИТСЯ

А) эналаприл

Б) метопролол

В) лозартан

Г)нитроглицерин

494. [T001021] К АНТИКОАГУЛЯНТАМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

А) гепарин

Б) алтеплаза

В) протамина сульфат

Г) клопидогрел

495. [T001048] ГОНДОТРОПНЫЙ ГОРМОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

А) гипофизе

Б) надпочечниках

В) гипоталамусе

Г) яичниках

496. [T001065] ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА ИМЕЕТ А) брыжейку

Б) сальниковые отростки

В) кишечные ленты

Г) гаустры

497. [T001068] К ДОБАВОЧНОМУ СКЕЛЕТУ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ

А) кости верхних конечностей

Б) кости черепа

В) позвонки Г) ребра и грудина

498. [T001069] К ТРУБЧАТЫМ КОСТЯМ ОТНОСИТСЯ

А) лучевая кость

Б) лопатка

В) грудина

Г) ребро

499. [T001071] К ОТДЕЛУ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОТНОСИТСЯ

А) ободочная кишка

Б) подвздошная кишка

В) тощая кишка

Г) двенадцатиперстная кишка

500. [T001089] К МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА

А) устранение причин и условий возникновения заболеваний

Б) организацию производства

В) охрану труда работодателем

Г) систему средств массовой информации

**501. [T001096] В СЛУЧАЕ  
ВОЗНИКОВЕНИЯ КОНФЛИКТА  
ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИЙ  
РАБОТНИК ОБЯЗАН  
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ В  
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ**

- А) руководителя медицинской организации, в которой он работает
- Б) федеральный орган исполнительной власти в сфере управления здравоохранением
- В) органы прокуратуры
- Г) федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**502. [T001105] ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ**  
А) введение лекарственных препаратов ингаляционным способом

- Б) назначение диеты
- В) создание возвышенного положения
- Г) организация досуга ребенка

**503. [T001107] ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО У РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬ**

- А) 10мл
- Б) 100мл
- В) 50мл
- Г) суточное количество

**504. [T001108] ПРИ ГЕМОФИЛИИ ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕБЕНКУ ВВОДЯТСЯ ТОЛЬКО**

- А) внутривенно
- Б) внутримышечно
- В) подкожно
- Г) внутрикожно

**505. [T001109] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У РЕБЕНКА ОТНОСЯТСЯ А)**

бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса  
Б) гиперемия лица, ускоренный рост волос  
В) бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь

Г) бледность, носовые кровотечения, извращение вкуса, поражение суставов

**506. [T001110] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) наследственность
- Б) инфекция
- В) перегревание
- Г) переохлаждение

**507. [T001111] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- А) проведении отвлекающих процедур
- Б) введении эуфиллина внутривенно
- В) введении антибиотиков внутримышечно
- Г) проведении оксигенотерапии

**508. [T001112] ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- А) энтеробиоза
- Б) описторхоза
- В) аскаридоза
- Г) трихоцефалеза

**509. [T001113] ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ У ДЕТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 38,5°C РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) физическое охлаждение
- Б) введение жаропонижающих
- В) проведение промывания желудка
- Г) постановка очистительной клизмы

510. [T001114] ГЕМАТУРИЯ,  
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ И ОТЕЧНЫЙ  
СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ  
ДЛЯ

- А) гломерулонефрита
- Б) цистита
- В) пиелонефрита
- Г) нефроптоза

511. [T001115] ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА ДЕТЯМ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЕГО

- А) через 30 минут после приема препарата, направленного на разжижение и выведение мокроты из верхних дыхательных путей
- Б) в первый день заболевания
- В) перед сном, через 30 минут после ужина
- Г) через 30 минут после физиотерапевтического лечения

512. [T001116] КОМПЛЕКС  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОЧИЩЕНИЕ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТ СЛИЗИ И  
МОКРОТЫ ВКЛЮЧАЕТ

- А) постуральный дренаж
- Б) лечебную физкультуру
- В) проведение ингаляций
- Г) постановку горчичников на грудную клетку

513. [T001119] ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ  
БРОНХИТЕ ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- А) одышка
- Б) повышение температуры
- В) недомогание
- Г) головная боль

514. [T001120] ОСНОВНЫМ  
КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ  
А) приступ удушья с затрудненным  
выдохом

- Б) кашель с выделением пенистой мокроты
- В) одышка смешанного характера
- Г) инспираторная одышка

515. [T001123] ПРИ НАЛИЧИИ У  
ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ  
СЕРДЦА ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ

- А) ограничить прием жидкости и соли
- Б) увеличить прием жидкости и соли
- В) ограничить прием белков и жиров
- Г) увеличить прием белков и жиров

516. [T001124] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ  
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ

- А) перемежающаяся хромота
- Б) одышка
- В) отеки
- Г) слабость

517. [T001125] ПРОВЕДЕНИЕ  
КОНТРОЛЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ  
ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ  
ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ

- А) почек
- Б) печени
- В) селезенки
- Г) желудочно-кишечного тракта

518. [T001126] ПРИ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- А) каптоприла
- Б) адреналина
- В) преднизолона
- Г) гепарина

519. [T001127] ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ  
СЖИМАЮЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ  
ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ

**СТЕНОКАРДИИ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНİТЬ**

- A) нитроглицерин под язык
- Б) кордиамин внутрь
- В) папаверин внутримышечно
- Г) мезатон внутривенно

**520. [T001128] ПРИЗНАКОМ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- A) головная боль
- Б) загрудинная боль
- В) снижение аппетита
- Г) лихорадка

**521. [T001129] ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ**

- A) горизонтальное, с приподнятым ножным концом
- Б) горизонтальное, без подушки
- В) сидя с опущенными ногами
- Г) горизонтальное, с приподнятым головным концом

**522. [T001131] БОЛЬНОМУ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ**

- A) в первый час
- Б) на 2-е сутки
- В) через 3-е суток
- Г) для профилактического лечения

**523. [T001133] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЕ**

- A) наложить венозные жгуты на конечности
- Б) придать положение с приподнятым ножным концом

**В) поставить горчичники на грудную клетку Г) обложить грелками**

**524. [T001134] ПОЯВЛЕНИЕ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОБИЛЬНОЙ ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ**

- A) отека легких
- Б) бронхиальной астмы В) крупозной пневмонии
- Г) легочного кровотечения

**525. [T001135] ПРИ РАЗВИТИИ ПРИСТУПА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ**

- A) полусидя с опущенными вниз ногами
- Б) горизонтальное
- В) горизонтальное с приподнятым ножным концом
- Г) горизонтальное с приподнятым головным концом

**526. [T001136] ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У ПАЦИЕНТА ОТМЕЧАЕТСЯ**

- A) рвота в виде кофейной гущи
- Б) изжога
- В) дегтеобразный стул
- Г) рвота пищей, съеденной накануне

**527. [T001137] ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМО**

- A) промыть желудок
- Б) положить грелку на живот
- В) поставить масляную клизму
- Г) провести дуоденальное зондирование

**528. [T001138] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛЕЙКОЗЕ**

- A) стернальная пункция
- Б) УЗИ печени
- В) биохимический анализ крови

Г) пункция лимфоузла

529. [T001139] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО

А) проводить дыхательную гимнастику, массаж

Б) предложить средство, купирующие кашу

В) следить за соблюдением строгого постельного режима

Г) запретить курение

530. [T001140] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА РВОТЫ «КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ» ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖНО

А) срочно госпитализировать

Б) наблюдать амбулаторно

В) ввести анальгетики

Г) направить в поликлинику

531. [T001141] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

А) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования

Б) сифонная клизма вечером

В) масляная клизма утром

Г) сифонная клизма за 2 часа до исследования

532. [T001142] ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО ПАЦИЕНТУ А) положить пузырь со льдом на живот

Б) положить грелку на живот

В) промыть желудок

Г) поставить масляную клизму

533. [T001144] ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ИЛИ

КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ К ВВЕДЕНИЮ А) инсулин короткого действия

Б) клофелин

В) папаверина гидрохлорид

Г) гепарин

534. [T001145] ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ А) утренняя скованность мелких суставов

Б) слабость

В) одышка

Г) боль в животе

535. [T001148] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

А) получить согласие пациента на проведение манипуляции

Б) получить согласие лечащего врача

В) не предупреждать пациента о манипуляции

Г) вызвать дежурного врача

536. [T001149] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЬЕКЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

А) информировать пациента о ходе проведения манипуляции

Б) получить согласие старшей медицинской сестры на проведение манипуляции

В) не предупреждать пациента о манипуляции

Г) вызвать врача

537. [T001151] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОВОДЯТ

А) бронхографию

Б) флюорографию

В) рентгенографию органов грудной клетки

Г) спирометрию

538. [T001152] ПАЦИЕНТАМ С БРЮШНЫМ ТИФОМ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА РЕКОМЕНДУЮТ А) продукты, богатые клетчаткой

Б) массаж живота

В) слабительные

Г) щадящую очистительную клизму

539. [T001153] ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ

А) диагностике IV стадии болезни

Б) на ранних стадиях

В) при отсутствии метастазов

Г) при наличии кровотечения

540. [T001155] ПАЦИЕНТУ С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

А) строгий постельный режим в течение 3-4 недель

Б) строгий постельный режим в течение 2 месяцев

В) палатный режим

Г) постельный режим

541. [T001156] "РЖАВЫЙ" ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

А) крупозной пневмонии

Б) бронхиальной астме

В) острым бронхите

Г) сухом плеврите

542. [T001157] ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ

А) жидкости, соли, белков

Б) жидкости, углеводов, белков

В) соли, белков, жиров

Г) жидкости, жиров, белков

543. [T001158] ПРИ ГРИППЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ А) обильное витаминизированное питье

Б) принимать антибиотики

В) обеззараживать испражнения

Г) снижать температуру ниже 38 С

544. [T001159] ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА

А) сосудистые звездочки

Б) лакированный язык

В) узловая эритема

Г) ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек»

545. [T001161] ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЕЗИКУЛЫ НА КОЖЕ ОБРАБАТЫВАЮТ

А) 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого

Б) 2% раствором перекиси водорода

В) 5% спиртовым раствором йода

Г) камфорным спиртом

546. [T001162] УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЫЛОЧНЫХ И ЗАДНЕШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ - ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ

А) краснухи

Б) хронического тонзиллита

В) ветряной оспы

Г) ангины

547. [T001163] ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНАЯ СЫПЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

А) кори

Б) ветряной оспы

В) менингококковой инфекции

Г) стафилококковой инфекции

**548. [T001165] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЫПНОМ ТИФЕ**

- А) обеспечение дробного питания
- Б) проведение инфузионной терапии
- В) наблюдение за контактными в течении 30 дней
- Г) назначение постельного режима до 5-6 дня нормальной температуры

**549. [T001167] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СИБИРСКУЮ ЯЗВУ ПЕРСОНАЛ НАДЕВАЕТ**

- А) противочумные костюмы
- Б) маски
- В) халаты, застегивающиеся сзади
- Г) второй халат

**550. [T001168] НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ**

- А) обильное питье
- Б) внутривенное введение жидкости
- В) дача антибиотиков
- Г) оксигенотерапия

**551. [T001169] ПЛАН УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПРИ БЕШЕНСТВЕ**

- А) организация индивидуального медицинского поста
- Б) помещение пациента в общую палату
- В) иссечение краев раны
- Г) обеспечение физического метода охлаждения

**552. [T001170] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕГКОЙ ФОРМЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА**

- А) уход при рвоте
- Б) внутримышечное введение ампициллина

В) проведение витаминотерапии

Г) парентеральное введение солевых растворов

**553. [T001171] ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С ГИПОТРОФИЕЙ НЕОБХОДИМО А) обеспечить оптимальный двигательный режим**

Б) обеспечить полный физический покой

В) создать гипоаллергенный быт

Г) увеличить физическую нагрузку

**554. [T001173] ОБСЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ 3-Х МЕСЯЧНОМУ ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ В ПОЛИКЛИНИКЕ**

А) клинический анализ крови и общий анализ мочи

Б) анализ мочи и по Нечипоренко и общий анализ крови

В) клинический анализ крови и определение фракций холестерина в сыворотки крови

Г) тест толерантности к глюкозе и общий анализ мочи

**555. [T001174] ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У РЕБЕНКА В ЕГО ПИТАНИИ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ**

А) жидкость, поваренную соль

Б) белки, углеводы

В) жидкость, углеводы

Г) белки, жиры

**556. [T001175] ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ**

А) срочная госпитализация

Б) направление в поликлинику

В) проведение оксигенотерапии

Г) выполнение физиотерапевтических процедур

557. [T001179] ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» И НОГТИ В ВИДЕ «ЧАСОВЫХ СТЕКОЛ» ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

А) хронических заболеваниях дыхательной системы

Б) острых заболеваниях дыхательной системы

В) острых заболеваниях пищеварительной системы

Г) хронических заболеваниях пищеварительной системы

558. [T001180] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЁГКОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

А) рентгенография органов грудной клетки

Б) эхокардиография

В) электрокардиография

Г) спирография

559. [T001182] ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИ

А) крупозной пневмонии

Б) бронхиальной астме

В) бронхоэкстатической болезни

Г) бронхите

560. [T001183] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНОКИШНЕЧНОГО ТРАКТКА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

А) фиброгастроскопию

Б) рентгенографию органов грудной клетки  
В) ультразвуковое исследование органов малого таза

Г) эхокардиографию

561. [T001184] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДИЕТА

С А) ограничением жирных и соленых блюд

Б) повышенным количеством белка  
В) механическим и химическим щажением

Г) пониженным количеством белка

562. [T001185] ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

А) ограничение жидкости и соли

Б) увеличение жидкости и белков

В) ограничение жиров и углеводов

Г) увеличение жиров и белков

563. [T001186] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ

А) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином

Б) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином

В) колющая боль в области сердца

Г) ноющая боль в области сердца

564. [T001187] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ РЕКОМЕНДУЮТ ОГРАНИЧИТЬ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

А) жиры животного происхождения

Б) железо

В) калий

Г) витамин С

565. [T001188] В ПЕРВЫЕ ДНИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ

А) строгий постельный

Б) постельный

В) палатный

Г) общий

566. [T001189] В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ

А) растительные жиры

Б) мясо и сливочное масло В) кофе, крепкий чай

Г) продукты, богатые углеводами

567. [T001190] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В РАЦИОН ПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЛАКОВ, СОДЕРЖАЩИЕ

А) витамины группы В

Б) растительную клетчатку

В) углеводы

Г) микроэлементы

568. [T001191] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ИРРИГОСКОПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ

А) постановка очистительной клизмы вечером и утром

Б) прием активированного угля

В) исключение из рациона продуктов, содержащих железо

Г) постановка очистительной клизмы вечером

569. [T001192] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ВКЛЮЧАЕТ

А) полоскание рта кипяченой водой

Б) полоскание рта спиртом

В) полоскание рта раствором фурацилина

Г) полоскание рта раствором гидрокарбоната натрия

570. [T001193] ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ КИШЕЧНИКА НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН А) овощи, фрукты, кисломолочные продукты

Б) цельное молоко

В) газированные напитки, соки

Г) хлеб белый

571. [T001194] ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ А) плотность и диурез

Б) количество форменных элементов, бактерий В) наличие уробилина, желчных пигментов

Г) количество сахара, ацетона

572. [T001197] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ В КРОВИ

А) гормоны Т3, Т4, ТТГ

Б) гемоглобин, цветовой показатель

В) лейкоциты, СОЭ

Г) инсулин, глюкагон

573. [T001198] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ОТМЕЧАЕТСЯ

А) гипергликемия

Б) гипопротеинемия

В) гиперпротеинемия

Г) гипербилирубинемия

574. [T001199] ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА РЕКОМЕНДУЮТ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ А) с пониженной калорийностью

Б) с пониженным содержанием белка

В) с повышенным содержанием белка

Г) основной вариант стандартной диеты

575. [T001200] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

А) создание покоя

Б) назначение сокращающих средств

В) введение прогестерона, вызов врача

Г) проведение катетеризации

576. [T001201] ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА

МЕДИЦИНСКИЙ АБОРТ ВКЛЮЧАЕТ:

- A) анализ крови на RW, ВИЧ-инфекцию
- B) исследование крови на холестерин
- C) анализ мочи по Нечипоренко
- D) кольпоскопию

577. [T001202] СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЬЁМ A) сбор субъективной информации

- B) бимануальное исследование
- C) рентгенологическое исследование
- D) исследование мочи

578. [T001203] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ МИОМЕ МАТКИ

- A) подготовка пациентки к гинекологическому осмотру
  - B) введение гормонов
  - C) осмотр шейки матки в зеркалах
  - D) введение газоотводной трубки
579. [T001204] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ РИСКЕ РАЗВИТИЯ ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
- A) проведение дыхательной гимнастики
  - B) применение отхаркивающих средств
  - C) проведение оксигенотерапии
  - D) применение антибиотиков

580. [T001205] ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЛИЦАМ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ

- A) кровохарканья
- B) снижения аппетита
- C) общей слабости
- D) недомогания

581. [T001206] ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ А) безопасность пациента

- B) рациональное питание пациента
- C) проведение мероприятий личной гигиены
- D) сохранение социальных контактов

582. [T001207] У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАРУШЕНА ПОТРЕБНОСТЬ

- A) в выделениях

Б) в дыхании

В) в питании

Г) в питье

583. [T001208] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- A) обеспечение мочеприемником

Б) резкое ограничение жидкости

В) резкое ограничение соли

Г) катетеризация мочевого пузыря

584. [T001209] РЕКОМЕНДУЕМЫМ ВАРИАНТОМ ДИЕТЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИЕТА С

- A) повышенным количеством белка

Б) избыточным содержанием углеводов

В) механическим и химическим щажением

Г) ограничением соли и сахара

585. [T001210] МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

- A) флюорография

Б) спирография

В) томография

Г) бронхография

586. [T001211] ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НЕОБХОДИМО

- А) избегать изменений положения головы
- Б) приподнять ноги
- В) часто менять положение головы и туловища
- Г) убрать из-под головы подушку

587. [T001212] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ

- А) кал
- Б) мочу
- В) кровь
- Г) желчь

588. [T001215] ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКОЙ НЕОБХОДИМО

- А) следить за кровоснабжением поврежденной конечности
- Б) содержать пациента в тепле
- В) следить за соблюдением диеты
- Г) следить за активностью пациента

589. [T001217] АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патологическая подвижность костных отломков

- Б) деформация сустава
- В) отечность места повреждения
- Г) боль

590. [T001218] ПРИ УКУСЕ ЧЕЛОВЕКА БЕШЕНЫМ ЖИВОТНЫМ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ

- А) заражения бешенством
- Б) заражения туберкулезом

В) развития вирусной инфекции Г)  
перелома костей

591. [T001220] НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ А)

- оказание помощи пациентам в самообслуживании

Б) инъекции антибактериальных препаратов

В) смена дренажей

Г) назначение пациенту рациональной диеты

592. [T001224] ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ОТМОРОЖЕНИЕМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

А) горячее питье, термоизоляционная повязка

Б) горячее питье, полуспиртовый компресс

В) растирание пораженного участка подручными средствами

Г) горячее питье, растирание пораженного участка

593. [T001225] ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ НЕОБХОДИМЫ

А) холод на живот, госпитализация

Б) обезболивающее

В) антибактериальные средства

Г) грелка на живот

594. [T001226] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧИТЬ

А) овощи

Б) гречневую кашу

В) рыбу

Г) мясо

**595. [T001227] ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ**

- А) гиперемия кожи с четкими границами
- Б) подергивание мышц
- В) разлитое покраснение кожи
- Г) ограниченный инфильтрат кожи

**596. [T001228] ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ НА ДОКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ**

- А) наложение холода на грудную клетку
- Б) проведение инъекции сосудосуживающих препаратов
- В) подготовку набора для плевральной пункции
- Г) измерение температуры

**597. [T001229] СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ**

- А) отставание больной стороны при экскурсии грудной клетки и притупление перкуторного звука
- Б) алая пятнистая кровь из полости рта
- В) рвота «кофейной гущей»
- Г) кровохарканье

**598. [T001230] СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- А) наложение артериального жгута выше места повреждения
- Б) тампонаду раны
- В) применение гемостатической губки
- Г) наложение давящей повязки

**599. [T001231] К ВОЗМОЖНОМУ РАННЕМУ ОСЛОЖНЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) рвота
- Б) острая задержка мочи
- В) ограничение двигательной активности

Г) повышение артериального давления

**600. [T001232] СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ**

- А) гиперемия, отек, усиление боли
- Б) побледнение краев раны
- В) промокание повязки кровью
- Г) гематома

**601. [T001233] НЕЗАВИСИМЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ УСИЛЕНИИ БОЛИ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА**

- А) создание удобного положения пациента в постели, вызов врача
- Б) введение обезболивающего препарата
- В) применение ванночки с раствором перманганата калия
- Г) измерение температуры

**602. [T001235] ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ У ПАЦИЕНТА ФУРУНКУЛА НОСА**

- А) срочное направление к врачу
- Б) вскрытие и дренаж гнойника
- В) назначение антибиотиков
- Г) применение тепловых процедур

**603. [T001236] СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ**

- А) симптом «прилипшей пятки»
- Б) крепитация большеберцовой кости
- В) крепитация в области нижней трети бедра
- Г) крепитация в области малоберцовой кости

**604. [T001237] ЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ФУРУНКУЛЕЗЕ**

- А) введение антибиотиков

Б) обучение пациента принципам рационального питания

В) обеспечение приема жидкости

Г) обеспечение гигиены кожи

605. [T001239] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЯСНОЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ВКЛЮЧАЕТ

А) проведения очистительной клизмы и ограничение пищевого режима

Б) проведения промывания желудка

В) рекомендации пациенту к отказу от курения перед исследованием

Г) введение газоотводной трубки

606. [T001240] У ПАЦИЕНТА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ

А) резкое снижение артериального давления

Б) головная боль

В) возбуждение

Г) повышение артериального давления

607. [T001242] ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ОПЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

А) опорожнение мочевого пузыря

Б) приём стакана жидкости

В) чистку зубов

Г) приём пищи

608. [T001243] КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ

А) падение артериального давления и тахикардия

Б) хрипы в легких

В) тошнота и рвота

Г) задержка газов и стула

609. [T001244] ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ А) страх операции

Б) боль В) рвота

Г) учащенное мочеиспускание

610. [T001249] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ

А) температура - 180°C 60 мин

Б) температура - 100°C 60 мин

В) температура - 120°C 40 мин

Г) температура - 100°C 40 мин

611. [T001251] ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАНИМАЮТ

А) гнойно-септические инфекции

Б) инфекции кожных покровов

В) кишечные инфекции

Г) инфекция мочевыводящих путей

612. [T001252] ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК

А) при асептических процедурах, контактах с кровью и другими биологическими жидкостями

Б) при работе с воздушным стерилизатором

В) при работе с паровым стерилизатором

Г) при беседе с пациентом

613. [T001256] ЧИСЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

А) 16-20 в минуту

Б) 10-12 в минуту

В) 12-14 в минуту

Г) 22-24 в минуту

614. [T001259] ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ГОРЧИЧНИКОВ

А) трахеит, бронхит, пневмония, гипертонический криз, приступ стенокардии

Б) трахеит, бронхит, невралгии, заболевания кожи

В) трахеит, бронхит, пневмония, туберкулез лёгких

Г) трахеит, бронхит, пневмония, рак лёгких

615. [T001260] ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ ТЕЛА ВОДА В ГРЕЛКЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В ПРЕДЕЛАХ (\_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ)

А) 60-65

Б) 20-30 В) 40-45

Г) 30-35

616. [T001261] МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРАЗДНУЕТСЯ

А) 12 мая

Б) 17 июня

В) 7 января

Г) 25 октября

617. [T001262] КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ

А) наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной профессиональной деятельности

Б) сохранение сведений о пациенте

В) подчинение старшему по должности младшему

Г) организация образа жизни пациентов, способствующую его выздоровлению

618. [T001264] СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ А) уничтожение микроорганизмов и их спор

Б) уничтожение грызунов

В) уничтожение патогенной микрофлоры

Г) уничтожение вредных насекомых

619. [T001265] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАРОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ А) 132 градуса °C, 2 атм, 20 минут

Б) 120 градусов °C, 4 атм, 20 минут

В) 180 градусов °C, 3 атм, 20 минут

Г) 120 градусов °C, 1 атм, 20 минут

620. [T001268] ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ

А) полулёжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов

Б) на боку, руки согнуты в локтевых суставах

В) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов

Г) промежуточное положение между положением лёжа на боку и лёжа на животе

621. [T001271] САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА В ПРИЁМНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ

А) осмотр на педикулез и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, обтирание, переодевание в больничную одежду

Б) дезинсекцию, ванну или душ, антропометрию

В) осмотр на педикулез и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, транспортировка в лечебное отделение

Г) осмотр на педикулез и чесотку, дезинфекция вещей больного

622. [T001273] ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРЕЛКИ СОСТАВЛЯЕТ

А) 2/3 объема грелки

Б) 1/3 объема грелки

В) 1/4 объема грелки

Г) 1/2 объема грелки

623. [T001274] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В СОГРЕВАЮЩЕМ

КОМПРЕССЕ А) влажная салфетка, компрессная бумага, вата, бинт

Б) влажная салфетка, вата, компрессная бумага, бинт

В) компрессная бумага, влажная салфетка, вата, бинт

Г) вата, влажная салфетка, компрессная бумага, бинт

624. [T001275] ПУЛЬС ЧАЩЕ ВСЕГО ИССЛЕДУЮТ НА

А) лучевой и сонной артерии

Б) локтевой артерии и аорте

В) брюшной аорте и мозговой артерии

Г) подколенной артерии

625. [T001276] ПРИ КРИТИЧЕСКОМ ПАДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

А) снижается

Б) повышается незначительно

В) резко повышается Г) не изменяется

626. [T001277] ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ ИЗМЕРЯЮТ

А) утром натощак (7 до 9час) и вечером (с17 до 19час)

Б) раз в день с 12 до 13 часов

В) сразу после завтрака

Г) перед сном

627. [T001278] ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 37,0° - 37,9°C НАЗЫВАЕТСЯ

А) субфебрильной

Б) фебрильной

В) пиретической

Г) гиперпиретической

628. [T001280] ПРОЯВЛЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ А) выполнение указаний старшего по

должности и уважительное руководство деятельностью младшего по должности

Б) сохранение сведений о пациенте

В) организацию условий, способствующих выздоровлению пациента

Г) чёткое выполнение медицинской сестрой своих профессиональных обязанностей

629. [T001281] К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ПЕДИКУЛЁЗЕ ОТНОСЯТ А) шампуни медифокс, нитифор, лосьон анти-бит

Б) 3% раствор перекиси водорода, 5% раствор перманганата калия

В) хлорамин

Г) дегтярное мыло

630. [T001283] МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДМЕТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ

А) ундинка

Б) пробирка

В) грушевидный баллончик

Г) шприц Жане

631. [T001284] ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ А)

промежуточное положение, между положением лёжа на боку и лёжа на животе

Б) полулёжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов

В) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов

Г) на боку, руки согнуты в локтевых суставах

632. [T001286] СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ В МЯГКОЙ БЯЗЕВОЙ УПАКОВКЕ СОХРАНЯЕТСЯ

А) 3 суток

Б) 2 суток

В) 1 сутки

Г) 5 суток

633. [T001288] ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ГИРУДОТЕРАПИИ ВЫРАЖЕН В

- А) снижении свёртываемости крови
- Б) уменьшении боли
- В) повышении артериального давления
- Г) повышении свёртываемости крови

634. [T001289] СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО 2 ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ

- А) холодный компресс, тёплое питьё
- Б) холодный примочка, тёплые ножные ванны
- В) применение жаропонижающих препаратов разных форм
- Г) использование грелки к ногам, горячий чай

635. [T001290] ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

- А) 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт
- Б) 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, зажим
- В) 8 -слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, зажим
- Г) 4-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт

636. [T001291] ПРИЗНАКИ 3-Й СТАДИИ ПРОЛЕЖНЕЙ

- А) образование пузырей и язв
  - Б) мацерация кожи В) покраснение кожи с синюшным оттенком
  - Г) некроз кожи и подкожной клетчатки
637. [T001292] ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
- А) спирография Б) бронхоскопия

В) флюорография

Г) бронхография

638. [T001293] УКАЖИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ КЛИЗМЫ

А) очистительная клизма

Б) капельная клизма

В) промывание желудка

Г) гипертоническая клизма

639. [T001294] КИШЕЧНИК ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (\_\_\_\_ ЧАС.)

А) 6-8

Б) 2

В) 4

Г) 10-12

640. [T001295] СИФОННАЯ КЛИЗМА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОПУХОЛЕВОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ

А) терапии состояния обтурации (запора)

Б) перед постановкой лекарственной клизмы

В) введения питательных веществ

Г) для местного воздействия на слизистую прямой кишки

641. [T001298] МОКРОТА НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА СОБИРАЕТСЯ

А) трижды, в стерильные ёмкости, в специальном помещении

Б) после тщательного туалета ротовой полости

В) утром натощак, в тёплом виде в лабораторию

Г) дважды, до и после применения антибиотиков

642. [T001299] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ

**ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧЕК И  
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДЯТ**

- А) водную нагрузку перед исследованием
- Б) приём углеводных продуктов вечером и утром перед исследованием
- В) обязательный приём активированного угля и ферментных препаратов
- Г) психологическую подготовку

**643. [T001301] ПОКАЗАНИЕМ К  
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) острая задержка мочи более 6-ти часов
- Б) недержание мочи
- В) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
- Г) появление отеков

**644. [T001302] ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА НА  
ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО  
ПОВОДУ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА  
ПОЯВИЛОСЬ ВЗДУТИЕ ЖИВОТА,  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЯЗАНА**

- А) проконсультироваться с врачом
- Б) ввести газоотводную трубку
- В) провести массаж живота
- Г) ввести но-шпу внутримышечно

**645. [T001303] МЕРОПРИЯТИЯ, С  
КОТОРЫХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО  
НАЧИНАТЬ БОРЬБУ С ЗАПОРАМИ У  
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО  
ВОЗРАСТА**

- А) введение в рацион питания овощей и фруктов
- Б) прием солевых слабительных
- В) постановка очистительных клизм
- Г) прием растительных слабительных

**646. [T001305] МЕТЕОРИЗМОМ  
НАЗЫВАЮТ**

- А) патологическое газообразование в кишечнике

Б) частый жидкий стул

В) задержку стула более 48 часов Г)  
спастические боли в кишечнике

**647. [T001307] ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  
МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО**

А) определение количества форменных элементов осадка мочи

Б) определение функционального состояния почек

В) определение суточного диуреза

Г) определение микрофлоры мочи

**648. [T001308] ТЕРМИН  
"ПРОТЕИНУРИЯ" СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ  
О НАЛИЧИИ В МОЧЕ**

А) белка

Б) лейкоцитов

В) эритроцитов

Г) глюкозы

**649. [T001310]  
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ –ЭТО**

А) графическая запись электрических явлений, возникающих при работе сердца

Б) исследование сердца при помощи ультразвука

В) графическая запись звуков, возникающих при работе сердца

Г) выслушивание сердца при помощи фонендоскопа

**650. [T001312] ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ**

А) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 10% раствор хлорида натрия

Б) грушевидный баллон, шприц Жане, вазелин, 10% раствор хлорида натрия

В) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 0,9% раствор хлорида натрия

Г) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелиновое масло, 0,9% раствор хлорида натрия

651. [T001316] ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРОМЫВАНИЮ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

А) отравление ядами

Б) острое желудочное кровотечение

В) инфаркт миокарда

Г) нарушение мозгового кровообращения

652. [T001318] АНАЛИЗ МОЧИ НА САХАР СОБИРАЕТСЯ В

А) течение суток в одну ёмкость

Б) стерильную пробирку

В) течение 10 часов в одну ёмкость

Г) течение суток, 8 банок, каждые 3 часа

653. [T001328] В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТА ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО И КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ А) мексидол

Б) дипиридамол В) прокаинамид

Г) амиодарон

654. [T001337] К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ МОЖНО ОТНЕСТИ

А) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)

Б) мебеверин (дюспаталин)

В) панкреатин (фестал)

Г) дротаверин (но-шпа)

655. [T001338] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА СНЯТИЕ СПАЗМА ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА А)  
дротаверин (но-шпа)

Б) панкреатин (фестал)

В) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)

Г) адеметионин (гептран)

656. [T001339] ЛОПЕРАМИД ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕМ

А) противодиарейным

Б) гепатопротекторным

В) ферментативным

Г) противорвотным

657. [T001340] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

А) хилак форте

Б) аллохол

В) магния сульфат

Г) лоперамид

658. [T001341] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК ПРАВИЛО, НАЗНАЧАЕМЫЙ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

А) линекс

Б) аллохол

В) магния сульфат

Г) лоперамид

659. [T001343] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СНИЖАЮЩИЙ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ЗА СЧЕТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ HCL (АНТАЦИДНОЕ СРЕДСТВО)

А) алюминия гидроокись + магния гидроокись (альмагель)

Б) омепразол

В) фамотидин

Г) ранитидин

660. [T001358] СПЕРМАТОЗОИДЫ ПОСЛЕ ПРОНИКОВЕНИЯ В МАТКУ И ТРУБЫ СОХРАНЯЮТ СПОСОБНОСТЬ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ

А) 24-48 часов

Б) 6-12 часов

В) 3-5 суток

Г) 10 суток

661. [T001359] ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО 15 ЛЕТ, ИМЕЮТ ПРАВО

А) один из родителей ребенка или законный представитель

Б) любой близкий родственник

В) только мама ребенка

Г) педагоги, воспитатели

662. [T001361] ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) затруднение выдоха

Б) затруднение вдоха

В) затруднение вдоха и выдоха

Г) шумный вдох

663. [T001363] ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) острая задержка мочи в послеоперационный период более 6-ти часов

Б) появление отеков

В) недержание мочи

Г) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала

664. [T001364] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -ТАК НАЗЫВАЕТСЯ А) разница между систолическим и диастолическим давлением

Б) напряжение пульса

В) сумма систолического и диастолического давления

Г) аритмичный пульс

665. [T001373] ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСКУССТВЕННОГО КОРМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГАСТРОСТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ

А) непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода

Б) бессознательное состояние, переломы челюстей

В) нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса

Г) послеоперационный период

666. [T001375] ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РЕКОМЕНДУЮТ

А) ограничить употребление рафинированных углеводов

Б) усилить питание

В) ограничить употребление жидкости

Г) ограничить употребление солей

667. [T001377] ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПАЦИЕНТУ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

А) ограничить употребление соли и жидкости

Б) усилить питание

В) ограничить употребление животных жиров

Г) ограничить употребление рафинированных углеводов

668. [T001378] СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

А) колкосерил, алазоль, пантенол

Б) алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь

В) бензил-бензоата, бом-бенге, Вишневского мазь

Г) оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь

669. [T001379] САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ-ЭТО

А) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний

Б) уничтожение микроорганизмов в окружающей среде

В) режим, который устанавливается в отделении

Г) комплекс мероприятий, направленный на выполнение дезинфекции в медицинской организации

670. [T001381] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ОЖИРЕНИЕМ НЕЗАВИСИМЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ БУДЕТ

А) измерение массы тела

Б) составление индивидуальной диеты

В) определение степени ожирения

Г) назначение лечения

671. [T001382] ТЕМПЕРАТУРА МОЮЩЕГО РАСТВОРА К МОМЕНТУ ПОГРУЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СОСТАВЛЯЕТ (\_\_\_\_ ГРАДУСОВ)

А) 50

Б) 40

В) 30

Г) 100

672. [T001383] РИТМ ПУЛЬСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО

А) интервалу между пульсовыми волнами

Б) силе, с которой нужно прижать лучевую артерию чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания

В) наполнению артерии кровью

Г) числу пульсовых волн за 1 минуту

673. [T001385] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ

А) поджелудочной железы

Б) печени

В) гипофиза

Г) щитовидной железы

674. [T001386] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ

А) гангрена

Б) образование мозолей

В) подагра

Г) полиартрит

675. [T001387] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПАЦИЕНТУ ПРИ ЗАПОРЕ УПОТРЕБЛЯТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

А) продуктов с пищевыми волокнами и растительной клетчаткой

Б) белков

В) жиров

Г) соли

676. [T001389] ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ

А) удаления жидкости из плевральной полости, взятия ее на бактериологическое исследование, введения в полость лекарственных препаратов

Б) только удаления жидкости из плевральной полости и взятия ее на бактериологическое исследование

В) только введения в полость лекарственных препаратов

Г) для удаления воздуха из плевральной полости

677. [T001394] БРОНХОСКОПИЯ  
ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

- А) эндоскопическим
- Б) лабораторным
- В) рентгенологическим
- Г) радиоизотопным

678. [T001400] ТЮБАЖ НАЗНАЧАЕТСЯ  
С ЦЕЛЬЮ

- А) промывания желчного пузыря
- Б) промывания гайморовых пазух
- В) подготовки к холецистографии
- Г) промывания желудка

679. [T001406] РЕАНИМАЦИЯ – ЭТО

- А) комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма
- Б) разновидность несчастных случаев у детей
- В) угнетение жизненных функций

Г) совокупность неотложных состояний

680. [T001407] НЕОБРАТИМЫЙ ЭТАП  
УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА

- А) биологическая смерть
- Б) клиническая смерть
- В) агония
- Г) предагония

681. [T001409] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕРИОДА КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) 3–6 минут
- Б) 1-2 минуты
- В) 10-12 минут
- Г) более 20 минут

682. [T001410] ПРИЗНАК  
КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) потеря сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на сонной артерии
- Б) спутанность сознания
- В) заторможенность
- Г) помутнение роговицы

683. [T001411] ПОКАЗАНИЯ К  
ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ  
РЕАНИМАЦИИ

- А) отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности
- Б) отсутствие сознания
- В) резкое падение артериального давления
- Г) резкое повышение артериального давления

684. [T001413] К ПЕРВОМУ ЭТАПУ  
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ  
ОТНОСИТСЯ

- А) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей
- Б) проведение искусственной вентиляции легких
- В) контроль показателей кровообращения
- Г) подключение к аппарату искусственного дыхания

685. [T001414] ВТОРЫМ ЭТАПОМ  
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- А) проведение искусственной вентиляции лёгких
- Б) непрямой массаж сердца
- В) восстановление проходимости верхних дыхательных путей
- Г) прямой массаж сердца

686. [T001415] СООТНОШЕНИЕ  
КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ И  
ДЫХАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
РЕАНИМАЦИИ ОДНИМ СПАСАТЕЛЕМ

- А) на 30 компрессий - 2 вдоха

Б) на 2 вдоха-15 компрессий

В) на 1 вдох-5 компрессий

Г) на 3 вдоха-6 компрессий

687. [T001416] СПОСОБ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ А)  
наложение кровоостанавливающего жгута

Б) сосудистый шов

В) перевязка сосуда

Г) переливание крови

688. [T001417] ПРИЗНАК ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ

А) слабый частый пульс

Б) повышение температуры тела

В) повышения артериального давления

Г) гиперемия кожных покровов

689. [T001418] УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ ОБОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНОМ

А) тахипноэ

Б) брадипноэ

В) диспноэ

Г) апноэ

690. [T001420] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ПОВЕХНОСТЬ, НА КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ПАЦИЕНТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ

А) жесткой

Б) мягкой

В) наклонной

Г) неровной

691. [T001421] ПРИЗНАК ЭФФЕТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
А) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков

Б) отсутствие экскурсии грудной клетки

В) расширенные зрачки

Г) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии

692. [T001422] ОСНОВНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА А) перелом ребер

Б) перелом ключицы

В) повреждение трахеи

Г) перелом позвоночника

693. [T001423] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА ЛАДОНИ СЛЕДУЕТ РАСПОЛОЖИТЬ

А) на границе средней и нижней трети грудины

Б) на верхней трети грудины

В) на границе верхней и средней трети грудины

Г) в пятом межреберном промежутке слева

694. [T001424] ОТСУТСТВИЕ ДЫХАНИЯ - ЭТО А) апноэ

Б) тахипноэ

В) брадипноэ

Г) диспноэ

695. [T001426] ПОКАЗАНИЯ К ПРЕКРАЩЕНИЮ РЕАНИМАЦИИ

А) появление признаков биологической смерти

Б) отсутствие признаков эффективного кровообращения

В) отсутствие самостоятельного дыхания

Г) широкие зрачки

696. [T001427] ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ ХАРАКТЕРНО

А) патологическое дыхание

Б) отсутствие самостоятельного дыхания

В) отсутствие пульса на сонной артерии

Г) отсутствие сознания

697. [T001428] КРИТЕРИЙ ПРАВИЛЬНОСТИ ВДУВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ А) экскурсия грудной клетки

- Б) урежение пульса
- В) появление пульса
- Г) сужение зрачков

698. [T001429] ЕСЛИ СЕРДЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ЧЕРЕЗ

- А) 30 минут
- Б) 3-6 минут
- В) 2 часа
- Г) 15-20 минут

699. [T001430] ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ  
А) симптом «кошачьего глаза»

- Б) прекращение дыхания
- В) расширение зрачка
- Г) прекращение сердечной деятельности

700. [T001431] ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ УРЕЖЕНИЕ ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ  
А) брадипноэ

- Б) тахипноэ
- В) апноэ
- Г) диспноэ

701. [T001433] КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ ОКРАШЕНЫ В А) голубой цвет

- Б) серый цвет
- В) черный цвет
- Г) белый цвет

702. [T001434] НА ЭЛЕКТРОДЫ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА НАКЛАДЫВАЮТСЯ САЛФЕТКИ, СМОЧЕННЫЕ

- А) физиологическим раствором

Б) спиртом

В) нашатырным спиртом Г) фурацилином

703. [T001435] СМЕНА ПОВЯЗКИ ФИКСИРУЮЩЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР, ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- А) по мере загрязнения, не реже 1 раза в сутки
- Б) еженедельно
- В) 3 раза в день
- Г) ежечасно

704. [T001436] ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПОТЕРЕ КРОВИ ВОЗНИКАЕТ

- А) геморрагический шок
- Б) анафилактический шок
- В) гемотрансфузионный шок
- Г) инфекционно-токсический шок

705. [T001437] К ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ ОТНОСИТСЯ

- А) вызов скорой медицинской помощи, устранение причины вызвавшую боль, остановка кровотечения, проведение иммобилизации конечности
- Б) проведение иммобилизации и транспортировка
- В) транспортировка в травматологическое отделение
- Г) остановка кровотечения и перенос пострадавшего на ровную поверхность

706. [T001438] УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) тахикардией
- Б) аритмией
- В) брадикардией
- Г) экстрасистолией

707. [T001439] МЕШОК «АМБУ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) для проведения искусственной вентиляции легких
- Б) для сбора отходов класса А
- В) для проведения непрямого массажа сердца
- Г) для сбора отходов класса Б

708. [T001442] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ I СТЕПЕНИ:

- А) переодеть в сухую одежду
  - Б) обезболить
  - В) наложить мазевую повязку
  - Г) наложить повязку с фурациллином
709. [T001443] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ
- А) устраниТЬ причину, наложить асептическую повязку
  - Б) устраниТЬ причину, наложить мазевую повязку
  - В) обработать обожженную поверхность 70% этиловым спиртом
  - Г) обработать обожженную поверхность 96% этиловым спиртом

710. [T001444] ПРИЧИНАМИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) передозировка инсулина
- Б) несоблюдение предписаний врача
- В) самостоятельная отмена лекарств
- Г) пропуск инъекций инсулина

711. [T001445] ПРИЕМ «ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ + ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- А) проходимость дыхательных путей
- Б) адекватное кровообращение
- В) устойчивое положение тулowiща

Г) адекватный уровень артериального давления

712. [T001446] ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ:

- А) обеспечить полный покой, холод на эпигастральную область
- Б) отвести в ближайшую поликлинику
- В) провести промывание желудка
- Г) обезболить

713. [T001447] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА:

- А) вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой
- Б) проводить в поликлинику на прием к участковому врачу
- В) успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача
- Г) вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом

714. [T001450] ПРИЕМ ГЕЙМЛИХА-ЭТО

- А) метод «брюшных толчков»
- Б) запрокидывание головы и открывание рта
- В) введение воздуховода
- Г) сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца

715. [T001451] КОНТРОЛИРУЯ ПАРАМЕТРЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ, МЕДСЕСТРА РЕГУЛИРУЕТ

- А) частоту дыхательных движений
- Б) частоту сердечных сокращений
- В) артериальное давление
- Г) центральное венозное давление

716. [T001452] ОБМОРОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) кратковременной потерей сознания
- Б) снижением зрачковых реакций
- В) выпадением корнеального рефлекса
- Г) полным выключением сознания с тотальной утратой восприятия

**717. [T001453] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ:**

- А) вывести пострадавшего из зоны загазованности, вызвать врача, расстегнуть стесняющую одежду
- Б) вывести пострадавшего из зоны загазованности, ввести сердечные гликозиды
- В) вызвать врача, одеть на пострадавшего противогаз
- Г) вызвать газовую службу

**718. [T001454] ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ КОЛЛАПСЕ**

- А) вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым ножным концом
- Б) вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым головным концом
- В) вызвать врача, провести искусственную вентиляцию легких
- Г) успокоить пациента

**719. [T001455] НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ**

- А) наложение окклюзионной повязки
- Б) пункция плевральной полости
- В) наложение ватно-марлевой повязки
- Г) остановка легочного кровотечения

**720. [T001456] ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ ПРИ ОБМОРОКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- А) вдыхание положения с приподнятым ножным концом

- Б) введение назогастрального зонда В) внутривенное введение раствора сульфата магния

- Г) придание вертикального положения тела

**721. [T001457] ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ РОГОВИЦЫ БОЛЬНОМУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В КОМЕ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА**

- А) периодически закапывать в глаза изотонический раствор натрия хлорида
- Б) провести инфузионную терапию по назначению врача
- В) смазать веки солкосерилом
- Г) наложить бинокулярную повязку

**722. [T001458] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ НЕОБХОДИМО**

- А) устранить тепловое воздействие, поместить пострадавшего в тень, смочить лицо прохладной водой
- Б) укрыть влажной простыней
- В) нанести крем на тело
- Г) дать теплое питьё

**723. [T001459] ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО**

- А) усадить, слегка наклонив голову вниз
- Б) усадить, запрокинув голову назад
- В) уложить на бок
- Г) уложить на ровную поверхность с возвышенным головным концом

**724. [T001460] ПРИ РАННЕЙ СТАДИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА НАБЛЮДАЕТСЯ**

- А) гиперемия кожи
- Б) гипотермия
- В) брадикардия
- Г) олигурия

725. [T001461] К ОСТРЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ

- А) анафилактический шок
- Б) гипергликемическое состояние
- В) гипертермический синдром
- Г) гипогликемическое состояние

726. [T001462] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРОВОДИТЬ

- А) ручные и ножные горячие ванны
- Б) общую горячую ванну В) лечебную ванну с морской солью
- Г) воздушную ванну

727. [T001464] ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИГОТОВИТ

- А) инсулин короткого действия, физиологический раствор
- Б) 40% раствор глюкозы
- В) 5% раствор глюкозы
- Г) раствор Рингера

728. [T001465] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УШИБЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) наложить давящую повязку и приложить пузырь со льдом или холодный компресс
- Б) обезболить место ушиба
- В) наложить асептическую повязку
- Г) наложить гипсовую повязку

729. [T001466] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА НЕОБХОДИМО

А) вызвать бригаду скорой медицинской помощи, оставив больного в том же положении, в котором он был найден

- Б) обезболить
- В) уложить на спину
- Г) уложить на левый бок

730. [T001467] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТИ А)

иммобилизация поврежденной конечности

- Б) давящая повязка на поврежденную конечность
- В) обезболивание
- Г) воротник Шанца

731. [T001468] ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) плазмозаменители
- Б) физиологический раствор
- В) гипертонический раствор
- Г) солевые растворы

732. [T001469] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

- А) предотвратить травмы больного
- Б) выпрямить конечности
- В) к голове приложить холод
- Г) усадить больного

733. [T001470] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВКЛЮЧАЕТ

- А) использование карманного ингалятора
- Б) проведение постурального дренажа
- В) введение предназалона
- Г) проведение дыхательной гимнастики

734. [T001471] ОПТИМАЛЬНЫМ ПРИ КОЛЛАПСЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА

- А) с приподнятым ножным концом
  - Б) с приподнятым головным концом
  - В) полусидя на кушетке Г) сидя на стуле
735. [T001472] ТРАНСФУЗИЯ – ЭТО
- А) переливание крови и ее компонентов
  - Б) введение синтетических препаратов
  - В) введение лекарственных средств
  - Г) введение антибиотиков

736. [T001477] ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОГО

КРОВЕОСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА

- А) прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферии конечности
- Б) чувство онемения в конечности
- В) прекращение кровотечения и онемение конечности
- Г) падение артериального давления

737. [T001478] НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ

- А) сублингвально
- Б) внутрь
- В) подкожно
- Г) ректально

738. [T001479] СЕРДЕЧНАЯ АСТМА – ЭТО ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНЫ

- А) приступы удушья
- Б) боли за грудиной, иррадиирующие в область левого плеча
- В) потеря сознания
- Г) головокружение

739. [T001480] ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ

СОСТОЯНИЙ А) кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови

- Б) хроническое заболевание желудка
- В) компенсированный сахарный диабет Г) стадия реконвалеценции вирусного гепатита В

740. [T001481] ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ХАРАКТЕРЕН

- А) для гипергликемической комы
- Б) для гипогликемической комы
- В) для уремической комы
- Г) для мозговой комы

741. [T001482] СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ РАНЕНИИ В ЗАТЫЛОК

- А) лежа на боку
- Б) лежа на спине
- В) лежа на животе
- Г) в полусидящем положении

742. [T001483] ПРИ СИЛЬНЫХ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- А) нельзя вводить анальгетик
- Б) необходимо ввести анальгетик
- В) можно дать спазмолитическое средство
- Г) приложить к животу грелку

743. [T001485] МЕТОД ГЕЙМЛИХА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- А) при попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути
- Б) при травме позвоночника
- В) при инспираторной одышке
- Г) при астматическом статусе

744. [T001487] ПРИ НАРУЖНОМ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

А) кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно

Б) кровь алого цвета, бьет струей

В) кровь темно-вишневого цвета, бьет струей

Г) кровь алого цвета, вытекает медленно

**745. [T001489] ПОТЕРПЕВШЕМУ С СИНДРОМОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ**

А) накладывают жгут выше места сдавления перед освобождением конечности

Б) накладывают жгут выше места сдавления после освобождения конечности

В) накладывают асептическую повязку

Г) проводят профилактику пролежней

**746. [T001492] ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВКЛЮЧАЕТ**

А) мониторинг жизненно важных функций

Б) выявление проблем пациента

В) выполнение мероприятий гигиенического ухода

Г) определение основных биохимических показателей крови

**747. [T001493] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ У ПАЦИЕНТА ДЫХАНИЯ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА**

А) наклонится к лицу пациента, что бы щекой ощутить движение воздуха

Б) провести подсчет дыхательных

движений В) измерить физиологические показатели кровообращения

Г) осуществить прием Геймлиха

**748. [T001494] РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ**

А) биологической смерти

Б) острой почечной недостаточности

В) отравлении организма различными ядами

Г) кровопотере

**749. [T001495] ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

А) для поддержания водно-электролитного баланса

Б) переливание крови

В) переливание плазмы

Г) обезболивания

**750. [T001502] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА РАЗВИВАЕТСЯ ШОК**

А) кардиогенный

Б) травматический

В) анафилактический

Г) гемотрансфузионный

**751. [T001503] ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ РАЗВИВАЕТСЯ ШОК**

А) травматический

Б) кардиогенный

В) анафилактический

Г) гемотрансфузионный

**752. [T001504] ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ КОМА**

А) уремическая

Б) кетоацидотическая

В) гипергликемическая

Г) гипогликемическая

**753. [T001505] ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА РАЗВИВАЕТСЯ КОМА**

А) гипогликемическая

Б) уремическая

В) кетоацидотическая

Г) гипергликемическая

754. [T001506] ПРИ КРОВОПОТЕРЕ РАЗВИВАЕТСЯ КОЛЛАПС А)  
гиповолемический

Б) кардиогенный

В) ангиогенный

Г) ортостатический

755. [T001508] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

А) отсутствие дыхания и пульса на сонной артерии

Б) отсутствие сознания

В) отсутствие пульса на лучевой артерии

Г) изменение величины зрачков

756. [T001509] ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ВЫЯВЛЕНО ОТСУТСТВИЕ СОЗНАНИЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

А) позвать на помощь и определить наличие дыхания

Б) вызвать «скорую помощь»

В) придать пострадавшему устойчивое боковое положение

Г) начать проведение сердечно-легочной реанимации

757. [T001510] ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ К МЕСТУ ПРОИШЕСТВИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ

А) после определения состояний, представляющих угрозу жизни пострадавших

Б) немедленно после прибытия на место происшествия В) в случае неэффективности мероприятий первой помощи

Г) при выявлении пострадавших в значительном количестве

758. [T001512] ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ СЛЕДУЕТ А) убедиться в отсутствии опасности для лица ее оказывающую

Б) получить разрешение у диспетчера экстренных служб

В) получить разрешение у пострадавшего

Г) получить разрешение у родственников пострадавшего

759. [T001513] ОПТИМАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

А) первые 5 минут

Б) до 15-20 минут

В) до 12-15 минут

Г) до 8-10 минут

760. [T001515] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГЕЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

А) компрессия грудной клетки, электро дефибрилляция

Б) прекардиальный удар, согревание

В) внутрисердечное введение адреналина, массаж воротниковой зоны

Г) искусственное дыхание, активизация рефлексов

761. [T001516] ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГЕЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, НЕОБХОДИМО НАДАВЛИВАТЬ НА ГРУДИНУ НА ГЛУБИНУ

А) 5-6 см.

Б) 2-3 см.

В) 3-4 см.

Г) 4-5 см

762. [T001519] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) иммобилизацию табельными и подручными средствами
- Б) сопоставление отломков кости
- В) вправление вышедшей наружу кости
- Г) наложение стерильной повязки

763. [T001520] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ А) все перечисленное

- Б) наложение стерильной повязки
- В) иммобилизацию табельными средствами
- Г) иммобилизацию подручными средствами

764. [T001523] ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВМЕСТО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А) закрутку
- Б) давящую повязку
- В) холод к ране
- Г) компресс

765. [T001524] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ДОСТУПНЫМ СРЕДСТВОМ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) давящая повязка
- Б) максимальное сгибание конечности
- В) пальцевое прижатие артерии
- Г) прямое давление на рану

766. [T001526] ТИПИЧНЫМ МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) места ниже середины паховой складки
- Б) верхняя треть задней поверхности бедра

В) выше середины паховой складки Г) средняя треть внутренней поверхности бедра

767. [T001527] ПНЕВМОТОРАКС - ЭТО А) скопление воздуха в плевральной полости

- Б) открытое ранение живота
- В) затрудненное дыхание
- Г) иммобилизация грудной клетки

768. [T001528] ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО С ТРАВМОЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

- А) полусидячее
- Б) лежа на спине
- В) лежа на боку неповрежденной стороны

Г) лежа на спине, плечеголовной конец приподнят

769. [T001529] ПРИ ОТКРЫТОЙ РАНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НЕОБХОДИМО

- А) наложить окклюзионную повязку
- Б) перевязать рану
- В) наложить шину
- Г) наложить шину с возвращением костей в исходное положение

770. [T001531] НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАВШИМ, КОТОРОМУ ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи
- Б) до прибытия бригады скорой медицинской помощи
- В) до улучшения его самочувствия Г) в течение первого часа

771. [T001532] ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ТЕЛА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) обеспечение ему комфорта, уменьшающего степень его страданий, не усугубление нарушения жизненно важных функций

Б) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь

В) обеспечение доступа для наложения повязок

Г) предупреждение самопроизвольного перемещения тела пострадавшего

**772. [T001533] ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗНАНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НЕОБХОДИМО**

А) осторожно встряхнуть его за плечи

Б) похлопать его по щекам

В) поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом

Г) надавить на болевые точки

**773. [T001534] ЕСЛИ ПРИ ПОПЫТКЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ЕГО ПОВЕДЕНИЕ УГРОЖАЕТ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ**

А) отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, позвать на помощь

Б) попытаться успокоить пострадавшего

В) постараться усмирить пострадавшего

Г) говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился

**774. [T001535] ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ СЛЕДУЕТ**

А) придать пострадавшему устойчивое боковое положение, поместив голову на бок ниже уровня туловища

Б) положить пострадавшему под голову валик из одежды

В) повернуть пострадавшего на бок

Г) подложить валик из одежды под плечи пострадавшего

**775. [T001536] ПРИЗНАКОМ НЕПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ**

А) отсутствие или затруднение дыхания, невозможность объяснить ситуацию, багровое лицо

Б) жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях

В) захват горла, кашель, просьба о помощи

Г) надрывный кашель, попытка что-то сказать

**776. [T001537] ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО С ЧАСТИЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА**

А) хватается за горло, кашляет, просит о помощи

Б) не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое)

В) жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях

Г) хватается за горло, не может говорить, только кивает

**777. [T001538] К ПЕРЕЧНЮ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ**

А) санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты

Б) комплект первой помощи санитарного дружиныника

В) индивидуальный комплект первой помощи при ЧС

Г) сумка неотложной помощи при ЧС

**778. [T001540] ПОСТРАДАВШЕМУ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА СЕРДЧНОЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ, НО ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ. ЧТО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ДАЛЕЕ**

- А) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- Б) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью
- В) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи
- Г) сообщить об этом диспетчеру по номеру экстренного вызова

**779. [T001541] ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО**

- А) запрокинуть голову, приподняв подбородок
- Б) приподнять голову, поддерживая шею
- В) дыхательные пути открывать не обязательно
- Г) запрокинуть голову, подложить под шею импровизированный валик

**780. [T001542] ПРИ НАХОЖДЕНИИ В РАНЕ ИНОРОДНОГО ПРЕДМЕТА НЕОБХОДИМО**

- А) не извлекать его из раны, наложить повязку вокруг него
- Б) извлечь его из раны
- В) извлечь его, далее контролировать кровотечение из раны
- Г) не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь

**781. [T001543] ЦЕЛЬ ПОДРОБНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ**

- А) выявление различных травм
- Б) оценка общего состояния пострадавшего

**В) выявление наружного кровотечения Г) определение оптимального положения пострадавшего**

**782. [T001545] К ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ СТРУКТУРА САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ТЕРАКТАХ, ОТНОСЯТСЯ**

- А) место, применяемое террористами оружие и цели теракта
- Б) морально-нравственные качества террористов
- В) санитарно-гигиеническое благополучие места теракта Г) неблагоприятные метеорологические условия

**783. [T001546] ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЕЖНОСТИ МОЖНО УДЕРЖАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОВЯЗКИ**

- А) Т-образной
- Б) черепашьей В) колосовидной
- Г) пращевидной

**784. [T001547] ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА КУЛЬТЕ КОНЕЧНОСТИ МОЖНО УДЕРЖАТЬ БИНТОВОЙ ПОВЯЗКОЙ**

- А) возвращающейся
- Б) колосовидной
- В) циркулярной
- Г) черепашьей

**785. [T001548] СИМПТОМЫ КРОВОТЕЧЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА**

- А) местные, общие
- Б) наружные, внутренние
- В) первичные, вторичные
- Г) единичные, множественные

**786. [T001549] ВРЕМЕННЫЙ ГЕМОСТАЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- А) давящей повязкой
- Б) наложением сосудистого шва

В) протезированием сосуда

Г) лигированием сосуда в ране

787. [T001550] НЕПРЕРЫВНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ ЗИМОЙ СОСТАВЛЯЕТ

А) 1 час

Б) 4 часа В) 3 часа

Г) 2 часа

788. [T001551] СИМПТОМОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ А) изменение относительной длины конечности

Б) изменение абсолютной длины конечности В) патологическая подвижность в поврежденном суставе

Г) крепитация костных отломков

789. [T001552] ГРАНИЦЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

А) пальцы - лопатка здоровой стороны

Б) кисть - лопатка больной стороны

В) лучезапястный сустав - лопатка больной стороны

Г) лучезапястный сустав - плечевой сустав больной стороны

790. [T001553] ЭЛЕМЕНТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ С ПЕРЕЛОМОМ ДЛИНОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ:

А) иммобилизация конечности транспортной шиной

Б) выполнение скелетного вытяжения

В) выполнение репозиции отломков

Г) использование шины Белера

791. [T001554] ПЕРИОД КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕРМИИ

(30-31 ГРАДУС °С) СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ) А) десять

Б) три

В) пять Г) двадцать

792. [T001555] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА

А) тридцать минут

Б) пятнадцать минут

В) пять минут

Г) шестьдесят минут

793. [T001557] К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ СЕРДЕЧНОЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

А) введение адреналина

Б) наружный массаж сердца

В) прием Сафара

Г) искусственное дыхание «рот в рот»

794. [T001558] АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ (ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ) ЯВЛЯЕТСЯ

А) этиловый спирт

Б) гидрокарбонат натрия

В) перманганат калия

Г) атропин

795. [T001559] ЛЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ПРЕПАРАТОВ КРОМЕ

А) пенициллина

Б) физиологического раствора

В) преднизалона

Г) супрастина

**796. [T001560] РЕГУРГИТАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) затекание жидкости или газов в направлении, противоположном нормальному
- Б) затекание содержимого рогоглотки в трахею
- В) гиперсаливация
- Г) вид носового кровотечения

**797. [T001561] РАННИМ ПРИЗНАКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ**

- А) пульса на сонной артерии
- Б) дыхательных движений
- В) артериального давления
- Г) реакции на свет

**798. [T001563] ИНСТРУКТАЖИ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫВАЮТ**

- А) вводными, первичными, повторными
- Б) вводными, начальными
- В) первичными, профессиональными
- Г) повторными, профилактическими

**799. [T001564] ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ С ЛИЦАМИ**

- А) принимаемыми на временную и постоянную работу
- Б) с высшим профессиональным образованием по специальности
- В) со стажем работы в такой же должности более 25 лет
- Г) назначенным главным врачом медицинской организации

**800. [T001565] ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ**

- А) непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своих профессиональных обязанностей
- Б) после прохождения работником испытательного срока
- В) по окончании первого трудового дня
- Г) по распоряжению руководителя медицинской организации

**801. [T001566] ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ**

- А) не реже одного раза в полгода
- Б) не реже одного раза в год
- В) не реже одного раза в два года
- Г) ежемесячно

**802. [T001568] МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ,**

- А) не допускают к работе
- Б) штрафуют
- В) увольняют с работы
- Г) направляют на принудительное обследование

**803. [T001586] ИЗГИБОМ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА КПЕРЕДИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) шейный лордоз
- Б) грудной сколиоз
- В) крестцово-копчиковый кифоз
- Г) грудной кифоз

804. [T001588] РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНО В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ РАСПОЛОЖЕНА

- А) двенадцатиперстная кишка
  - Б) тощая кишки
  - В) подвздошная кишка
  - Г) слепая кишка
805. [T001589] ЭПИФИЗАРНЫМ ХРЯЩОМ В СУСТАВЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) хрящевая пластина роста между эпифизом и диафизом
  - Б) суставной хрящ эпифиза
  - В) эпифиз на хрящевой стадии развития
  - Г) патологическое включение хрящевой ткани в костный эпифиз

806. [T001591] К ТРУБЧАТЫМ КОСТЯМ ОТНОСИТСЯ

- А) лучевая
- Б) пятчная
- В) грудиня
- Г) ребро

807. [T001593] НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОВЯЗКА ДЕЗО НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ

- А) переломе ключицы
- Б) переломе ребер
- В) ранении легкого
- Г) ранении сердца

808. [T001594] ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ (АСЕПТИЧЕСКОЙ) ПОВЯЗКИ

- А) профилактика вторичного инфицирования
  - Б) остановка кровотечения
  - В) постоянный доступ лекарственного вещества
  - Г) герметизация раны
809. [T001595] ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ПРИ ОСТРОЙ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ А) возвышенное, полусидячее

- Б) с приподнятым ножным концом кровати
- В) горизонтальное
- Г) горизонтальное, с приподнятой головой

810. [T001599] НЕОТЛОЖНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ:

- А) перенести пациента в прохладное место, положить холод на проекции крупных сосудов
  - Б) непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких
  - В) введение кардиамина
  - Г) уложить пациента в боковое положение, дать прохладное питье
811. [T001600] ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕН
- А) расширением коронарных артерий
  - Б) расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий
  - В) расширением периферических сосудов большого круга кровообращения
  - Г) урежением сердечного ритма

812. [T001601] РЕАНИМАЦИЮ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИ

- А) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 30 минут
  - Б) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 10 минут
  - В) попадании желудочного содержимого в дыхательные пути
  - Г) появлении пенистой мокроты из верхних дыхательных путей
813. [T001603] МЕСТОМ ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ

**СЕРДЦА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) граница между средней и нижней третями грудины
- Б) верхняя треть грудины
- В) средняя треть грудины
- Г) нижняя треть грудины

**814. [T001604] НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ОБМОРОКЕ:**

- А) уложить, приподняв ножной конец
- Б) уложить в горизонтальное положение, холод к голове
- В) уложить, голову приподнять, горчичник на затылок
- Г) уложить, дать горячее питье

**815. [T001605] НАЖАТИЕ НА ГРУДИНУ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ПРОВОДИТСЯ**

- А) запястьями, не сгибая рук в локтях
- Б) всей ладонной поверхностью, не сгибая рук в локтях
- В) запястьями, умеренно согнув руки в локтях
- Г) ладонью, сжатой в кулак

**816. [T001606] ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ ИЗМЕРЯЕТСЯ**

- А) спирометром
- Б) тонометром
- В) барометром
- Г) анемометром

**817. [T001607] РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОТСУСТВИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА**

- А) не разрешается
- Б) разрешается по согласованию с главврачом

**В) разрешается по согласованию с инженером по технике безопасности**

**Г) разрешается по усмотрению медсестры**

**818. [T001609] НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ (ЛЕТ) А) 20-25**

- Б) 18-30
- В) 25-35

**Г) 25-45**

**819. [T001610] БАКТЕРИЦИДНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) ЛАМПЫ ИЗЛУЧАЮТ**

- А) ультрафиолетовые лучи
- Б) инфракрасные лучи
- В) видимые лучи
- Г) ионизирующие лучи

**820. [T001611] ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ДОЛЖНО ИМЕТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РН**

- А) 5,5
- Б) 3,0
- В) 8,5
- Г) 10,0

**821. [T001612] ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖЕН РАЗМОРАЖИВАТЬСЯ И ПОДВЕРГАТЬСЯ ОБРАБОТКЕ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В**

- А) неделю
- Б) месяц
- В) 3 месяца
- Г) полгода

**822. [T001613] СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В СТАЦИОНАРЕ ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОВО ОДИН РАЗ В**

- А) 7 дней
- Б) день
- В) 2 недели

Г) месяц

823. [T001614] МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

А) через 2 часа

Б) после каждой манипуляции

В) через 6 часов

Г) 1 раз в смену

824. [T001615] МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ А) после каждой манипуляции

Б) в конце рабочего дня

В) не меняет, двукратно протирая спиртом

Г) не меняет, однократно протирая спиртом

825. [T001616] БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

А) для обеззараживания воздуха в помещениях.

Б) для освещения помещения

В) для отопления помещения

Г) для вентиляции помещения

826. [T001617] ПЕРЧАТКИ, КОТОРЫЕ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩАЮТ РУКИ ОТ ПОРЕЗОВ РЕЖУЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НАЗЫВАЮТСЯ

А) кольчужные

Б) латексные

В) нитриловые

Г) виниловые

827. [T001620] ЦВЕТ ПАКЕТОВ И КОНТЕЙНЕРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

А) красный

Б) желтый

В) белый Г) чёрный

828. [T001621] МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЖАЮТ В А) дезинфицирующий раствор

Б) моющий раствор В) раствор гипохлорида кальция

Г) растворе перекиси водорода

829. [T001625] ПОДКЛАДНОЕ СУДНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ПОГРУЖЕНИЕМ В А) дезинфицирующий раствор

Б) моющий раствор

В) раствор 3% перекиси водорода

Г) раствор 70% этилового спирта

830. [T001627] УВЛАЖНЕНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА

А) Боброва

Б) Илизарова

В) Кузнецова

Г) Дитерикса

831. [T001628] МАММОГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ А) состояния молочных желез

Б) центральной нервной системы

В) внутренних органов брюшной полости

Г) внутренних органов грудной клетки

832. [T001629] БРОНХОФИБРОСКОП ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СЛИЗЕСТЫХ ОБОЛОЧЕК А) трахеобронхиального дерева

Б) пищевода и желудка

В) тонкого кишечника

Г) толстого кишечника

833. [T001630] РЕКТОМАНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

- А) прямой кишки
- Б) тонкой кишки
- В) двенадцатиперстной кишки
- Г) желудка

834. [T001631] ГЛЮКОМЕТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

- А) глюкозы в крови
- Б) глюкозы в моче
- В) кетоновых тел в моче
- Г) глюкозы в пищевых продуктах

835. [T001632] ШПРИЦ – РУЧКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ

- А) инсулина
- Б) вакцины
- В) гепарина
- Г) глюкозы

836. [T001633] ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И УРЕТРЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ

- А) цистоскопа

- Б) ректоманоскопа
- В) колоноскопа
- Г) бронхоФИброСКОПА

837. [T001634] ТОНОМЕТР МАКЛАКОВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ А) внутрглазного давления

- Б) артериального давления
- В) венозного давления
- Г) капиллярного давления

838. [T001635] КОЛОНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ А) толстой кишки

- Б) тонкой кишки
- В) желудка
- Г) желчного пузыря

839. [T001636] УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АЭРОЗОЛЬНЫМ СПОСОБОМ

- А) небулайзер, ингалятор
- Б) мешок Амбу

В) кислородная лицевая маска

- Г) носовая канюля

840. [T001638] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) метеоризм
- Б) запор
- В) непроходимость кишечника
- Г) операция

841. [T001639] КРУЖКА ЭСМАРХА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ

- А) постановки очистительной клизмы
- Б) постановки сифонной клизмы
- В) введения жидкости тяжелобольным
- Г) постановки гипертонической клизмы

842. [T001640] ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

- А) пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
- Б) толстой кишки
- В) прямой кишки
- Г) мочевого пузыря

843. [T001642] МЕДИЦИНСКИЙ ТОНОМЕТР ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

- А) артериального давления

Б) внутриглазного давления

В) венозного давления

Г) капиллярного давления

844. [T001643] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

А) весы

Б) секундомер

В) пульсометр

Г) шагомер

845. [T001644] КАРМАНЫЙ ИНГАЛЯТОР ПРИМЕНЯЮТ ПАЦИЕНТЫ С

А) бронхиальной астмой

Б) пневмонией

В) ринитом

Г) отитом

846. [T001646] МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД ТРАНСПОРТИРУЮТ В БАЛЛОНАХ (ЦВЕТА)

А) голубого

Б) красного

В) серого

Г) чёрного

847. [T001649] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРМАННАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА НА 1/4 ЧАСТЬ РАСТВОРОМ

А) дезинфицирующим

Б) изотоническим

В) гипертоническим

Г) физиологическим

848. [T001650] ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ОСМОТР СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) ректороманоскопия

Б) дуоденоскопия

В) эзофагоскопия

Г) гастроскопия

849. [T001651] ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕДМЕТЫ УХОДА

А) мочеприемник, абсорбирующее белье

Б) резиновый катетер

В) грушевидный баллон

Г) резиновое судно

850. [T001653] ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА ДЛИНОЙ 10 – 16 ММ ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИИ

А) внутрикожной

Б) подкожной

В) внутримышечной

Г) внутривенной

851. [T001654] ВТОРОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА НАЗЫВАЕТСЯ

А) изолирующий – компрессная бумага

Б) лечебный - салфетка

В) согревающий – вата

Г) фиксирующий - бинт

852. [T001655] ЯЧЕЙКИ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА ЗАПОЛНЕНЫ

А) воздухом

Б) ватой

В) водой

Г) песком

853. [T001656] ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ

А) 20 – 30 см на 1 час

Б) 7 – 8 см на 2 часа

В) 10 – 15 см на 1 час

Г) 25 – 30 см на всю ночь

854. [T001657] ГРЕЛКУ ЗАПОЛНЯЮТ ВОДОЙ НА (\_\_\_\_ ОБЪЕМА)

А) 2/3

Б) 3/4 В) 1/2

Г) 1/3

855. [T001660] ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД ИСПОЛЬЗУЮТ ШПРИЦ

А) Жане

Б) тюбик

В) инъекционный

Г) ручку

856. [T001662] ЛЕЧЕНИЕ КИСЛОРОДОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

А) в барокамере

Б) в кислородной палате

В) через носовой катетер из кислородного баллона

Г) через маску при централизованной подаче кислорода

857. [T001671] ЗОНА ПОКРАСНЕНИЯ И ОТЕКА В ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ШВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

А) воспаления

Б) апоптоза

В) репарации

Г) склероза

858. [T001672] ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ КАТЕТЕРА В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБЛАСТЬ УРЕТРЫ

А) антисептическим раствором

Б) 5% раствором перманганата калия

В) 0,5% раствором хлорамина

Г) раствором йода

859. [T001673] КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО СМОЧИТЬ А) стерильным глицерином

Б) 70% раствором спирта

В) раствором фурацилина

Г) раствором хлоргексидина

860. [T001675] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПАЦИЕНТА ПЕРЕМЕЩАЮТ В ПОСТЕЛИ КАЖДЫЕ (\_\_\_\_ ЧАС.)

А) 2

Б) 1

В) 3

Г) 10

861. [T001677] ПРИ КОРМЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ЗОНД ПИЩУ ПОДОГРЕВАЮТ ДО (\_\_\_\_ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ)

А) 38 – 40

Б) 15 – 20

В) 25 – 30

Г) 45 – 50

862. [T001679] В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ОТЕКАМИ ВРАЧ НАЗНАЧАЕТ

А) определение суточного диуреза

Б) измерение температуры тела

В) подсчет частоты дыхательных движений каждые 30 минут

Г) измерение артериального давления

863. [T001680] НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

А) крестец

Б) висок

В) грудная клетка

Г) предплечье

864. [T001681] ОСНОВНОЙ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ПУТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЯДОВ В ОРГАНИЗМ

- А) ингаляционный
- Б) трансдермальный
- В) пероральный
- Г) резорбтивный

865. [T001684] СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ПОДПИСЫВАЕТ

- А) опекун
- Б) попечитель
- В) главный врач
- Г) прокурор

866. [T001685] ПРАВО ПАЦИЕНТА НА ДОПУСК К НЕМУ АДВОКАТА ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНО

- А) по желанию пациента
- Б) с разрешения главного врача
- В) с разрешения врачебной комиссии
- Г) по решению суда

867. [T001687] ИГЛА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЬЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- А) 90
- Б) 60
- В) 45
- Г) 30

868. [T001688] ИГЛА ПРИ ПОДКОЖНОЙ ИНЬЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- А) 45

Б) 60

В) 90

Г) 30

869. [T001689] ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ ОСТАВЛЯЮТ В КИШЕЧНИКЕ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ЧАСА, ТАК КАК А) могут образоваться пролежни в стенке кишечника

- Б) утомительно для пациента
- В) прекращается лечебный эффект
- Г) заканчивается её стерильность

870. [T001690] МЕШОК АМБУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) при искусственной вентиляции лёгких
- Б) при оксигенотерапии
- В) для предупреждения западения языка
- Г) при обеспечении проходимости дыхательных путей

871. [T001691] ЖГУТ ЭСМАРХА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) для остановки артериального кровотечения
- Б) для остановки венозного кровотечения
- В) для остановки капиллярного кровотечения
- Г) при внутривенных инъекциях

872. [T001692] ШИНА ДИТЕРИХСА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

А) бедренной кости

Б) плечевой кости

В) локтевой кости

Г) ключицы

873. [T001693] ШИНА КРАМЕРА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ

А) переломах плечевой кости

Б) переломах ключицы

В) повреждении тазобедренного сустава

Г) повреждении коленного сустава

874. [T001695] ТЕСТ ПОЛОСКИ НА НАЛИЧИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ В МОЧЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА  
А) сахарный диабет

Б) мочекаменную болезнь

В) цистит и уретрит

Г) гломерулонефрит

875. [T001696] ДЕФИБРИЛЛЯТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

А) электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма

Б) исследования работы головного мозга

В) ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата

Г) регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца

876. [T001699] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЦИАНОЗА, КАШЛЯ ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА НЕОБХОДИМО

А) немедленно извлечь зонд

Б) вызвать врача

В) временно прекратить введение зонда

Г) начать искусственную вентиляцию легких

877. [T001701] ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

А) беротек

Б) морфин В) папаверин

Г) клонидин (клофелин)

878. [T001703] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ТРЕБУЕТСЯ ДИЕТА, БОГАТАЯ

А) калием

Б) углеводами

В) железом

Г) йодом

879. [T001708] ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗА ПРИМЕНЯЮТ

А) линекс

Б) де-нол

В) гевискон

Г) флутиказон

880. [T001712] ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

А) ацетилсалициловая кислота

Б) ацетаминофен

В) ибупрофен

Г) фенацетин

881. [T001713] К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ

А) раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта

Б) дисбактериоз

В) гипотензия

Г) тромбоз

882. [T001714] ПРИЕМ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

А) сонливость, ухудшение внимания

Б) брадикардию

В) остеопороз

Г) гипертензию

883. [T001716] ПРИЗНАК ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА

А) гематурия

Б) дизурия

В) никтурия

Г) полиурия

884. [T001717] ПРЕПАРАТАМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) нитроглицерин

Б) нифедипин

В) верапамил

Г) каптоприл

885. [T001719] ПРИ ПРИЕМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ В ВИДЕ

А) снижение артериального давления

Б) остеопороза

В) затруднение дыхания

Г) олигурии

886. [T001720] СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ВВОДЯТ ВНУТРИВЕННО ПОД КОНТРОЛЕМ

А) пульса

Б) частоты дыхания

В) артериального давления

Г) диуреза

887. [T001721] СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА

А) подкожно, внутривенно

Б) внутрикожно, внутривенно

В) внутривенно, в полости

Г) подкожно, эндolumбально

888. [T001723] ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА АНТАЦИДОВ

А) спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи и на ночь

Б) за час до еды

В) спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи

Г) во время еды

889. [T001724] ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА КАЛ ОКРАШИВАЕТСЯ А) в черный цвет

Б) в зеленый цвет

В) в желтый цвет

Г) в белый цвет

890. [T001730] В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПАЦИЕНТАМ ЧАСТО РЕКОМЕНДУЮТ НАСТОЙ ИЗ

А) толокнянки, медвежьих ушек, листьев брусники

Б) плодов шиповника, цветков пижмы, травы чистотела

В) корня одуванчика, травы полыни горькой, травы тысячелистника

Г) коры калины, листьев крапивы, травы пастушьей сумки

891. [T001732] ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

А) запор

Б) повышение аппетита

В) понос

Г) гипертензию

892. [T001733] ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ ЧАЩЕ ВСЕГО РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРИНИМАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ

А) за час до еды

Б) во время еды

В) сразу после еды

Г) не связано с приемом пищи

893. [T001737] ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА НАСТУПАЕТ

А) через 1-2 минуты

Б) через 10-15 минут

В) через 15-20 минут

Г) через 20-25 минут

894. [T001738] ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

А) хлоргексидин

Б) перекись водорода

В) фурацилин

Г) протаргол

895. [T001739] ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПО ВИШНЕВСКОМУ ИСПОЛЬЗУЮТ

А) 0,25% раствор новокаина

Б) 2% раствор новокаина

В) 1% раствор тримекаина

Г) 10% раствор лидокаина

896. [T001740] ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТОМ РИФАМПИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧА ОКРАШИВАЕТСЯ В ЦВЕТ

А) оранжевый

Б) синий

В) фиолетовый

Г) зеленый

897. [T001741] ПРИ ВВЕДЕНИИ ИНСУЛИНА НЕОБХОДИМО

А) постоянно менять места инъекций

Б) не дожидаться полного испарения спирта

В) ввести иглу параллельно поверхности кожи

Г) поесть через час после инъекции

898. [T001742] ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ ИНСУЛИН

А) короткого действия

Б) среднего действия В) длительного действия

Г) сверхдлительного действия

899. [T001743] ОСНОВНОЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БРОНХАЛЬНОЙ АСТМЕ А) ингаляционный

Б) внутримышечный

В) через рот

Г) сублингвальный

900. [T001744] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ

А) после еды

Б) запивать небольшим количеством воды

В) не размельчать перед употреблением

Г) запивать апельсиновым соком

901. [T001748] ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРОТИВОПОКАЗАН С ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ

А) аспирин

Б) парацетамол

В) ибупрофен

Г) панадол

902. [T001749] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА СОСТАВЛЯЕТ

А) 4-6 часов

Б) 1-2 часа

В) 8-10 часов

Г) 10-12 часов

903. [T001751] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ

А) преноксдиазин (либексин)

Б) лазолван (амброксол)

В) АЦЦ (ацетилцистеин)

Г) флуифорт (карбоцистеин)

904. [T001752] ПРИЕМ ПРЕДНИЗОЛОНА  
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗВИТИЕ

А) стероидной язвы

Б) гипотензии

В) гиперкалиемии

Г) дистрофии

905. [T001753] АНТИБИОТИКИ  
НАЗНАЧАЮТ ПРИ

А) бактериальной инфекции

Б) лихорадке

В) кашле Г) вирусной инфекции

906. [T001754] ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ  
АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

А) 0,9% раствор натрия хлорида

Б) 5% раствор глюкозы

В) 2% раствор новокаина

Г) 10% раствор хлористого кальция

907. [T001755] АНТИСЕПТИЧЕСКИМ  
ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЭТИЛОВЫЙ  
СПИРТ

А) 70%

Б) 30% В) 40%

Г) 95%

908. [T001756] ВОССТАНАВЛИВАЕТ  
КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ

А) хилак форте

Б) лоперамид

В) холензим

Г) панкреатин

909. [T001759] ГИПОТЕНЗИВНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТА  
ОКАЗЫВАЕТ ПРИ ВВЕДЕНИИ

А) внутривенно

Б) перорально

В) энтерально

Г) ректально

910. [T001761] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКЕ РАН ЧАСТО  
ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР

А) хлоргексидина

Б) Люголя

В) фенола

Г) бриллиантовой зелени

911. [T001763] ПРИ ПРИЕМЕ  
ПРЕПАРАТОВ НИТРОФУРАНОВОГО  
РЯДА РЕКОМЕНДУЮТ

А) обильное питье

Б) прием витамина С

В) прием препарата до еды

Г) ограничение молочных продуктов

912. [T001764] ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ  
БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА  
ПРИМЕНЯЮТ

А) морфин

Б) диклофенак

В) анальгин

Г) парацетамол

913. [T001766] ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИЕМ  
НЕКОТОРЫХ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ  
АНТАЦИДОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К  
РАЗВИТИЮ

А) профузного поноса

Б) задержки жидкости в организме

В) нарушения вкуса

Г) спазма гладких мышц кишечника

914. [T001768] ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА С НАРУШЕНИЕМ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, РЕЧИ ПРИМЕНЯЮТ

- A) циннаризин
- B) амитриптилин
- C) феназепам
- D) гипотиазид

915. [T001769] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ НЕЙТРАЛИЗУЮТ

- A) антацидные препараты
- B) ферменты
- C) антибиотики
- D) слабительные средства

916. [T001771] ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ПРИЕМА

- A) эналаприла
- B) мезатона (фенилэфрина)
- C) строфантина
- D) добутамина

917. [T001774] АНЕСТЕТИК ДЛЯ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

- A) лидокаин (ксикаин)
- B) анальгин (метамизол-натрий)
- C) диклофенак
- D) трамадол

918. [T001775] ПРИ ВВЕДЕНИИ НОРАДРЕНАЛИНА ПОДКОЖНО ВОЗНИКАЕТ

- A) некроз
- B) аллергия
- C) бронхоспазм
- D) коллапс

919. [T001776] ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ЖЕЛЧЕГОННОЕ ДЕЙСТВИЕ A) холензим B) лоперамид

- A) бисакодил
- B) панкреатин

920. [T001781] КОДЕИН

- A) противокашлевое средство
- B) ноотроп
- C) местный анестетик
- D) ненаркотический анальгетик

921. [T001782] ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ)

- A) наркотический анальгетик
- B) психостимулятор
- C) аналептик
- D) ненаркотический анальгетик

922. [T001783] ФЕНТАНИЛ

- A) наркотический анальгетик
- B) психостимулятор
- C) аналептик
- D) ненаркотический анальгетик

923. [T001786] АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К

- A) противовоспалительным препаратам
- B) гормональным препаратам
- C) гипотензивным средствам
- D) противоглистным средствам

924. [T001787] МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН)

- A) ненаркотический анальгетик
- B) гипотензивное средство
- C) противоглистное средство
- D) гормональный препарат

925. [T001790] СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ПОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нефрон
- Б) ацинус
- В) долька
- Г) фолликул

926. [T001796] В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДМЕТА ТРУДА ВСЕ ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТНОСЯТСЯ К ТИПУ

- А) «человек – человек»
- Б) «человек – живая природа»
- В) «человек – техника» (неживая природа)
- Г) «человек – знаковая система»

927. [T001798] ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИЦИНСКИХ, ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕНЫ

- А) Федеральным законом РФ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
- Б) Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- В) Федеральным законом РФ «О безопасности»
- Г) Федеральным законом «Уголовный кодекс РФ»

928. [T001800] ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- А) воздействию факторов физической, химической, биологической и психофизиологической природы
- Б) давлению и притеснениям со стороны руководства медицинских организаций
- В) коррупционному воздействию
- Г) уголовному преследованию

929. [T001801] К ФАКТОРАМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ

- А) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук
  - Б) психологические переживания за результаты лечения пациентов
  - В) пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций
  - Г) контроль за профессиональной деятельностью
930. [T001802] К ФАКТОРАМ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ
- А) пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций
  - Б) вирусы и микроорганизмы, способствующие возникновению и распространению внутрибольничных инфекций
  - В) психологические переживания за результаты лечения пациентов
  - Г) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук
931. [T001803] К ФАКТОРАМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ
- А) вирусы и микроорганизмы, способствующие возникновению и распространению внутрибольничных инфекций
  - Б) пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной

среде функциональных подразделений медицинских организаций

В) контроль за профессиональной деятельностью

Г) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

932. [T001806] ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ТРУДА ЧАСТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ

А) постоянного напряжения и стресса

Б) желания сменить профессию

В) уйти в отпуск

Г) посещения ближайшего учреждения культуры (театр, музей и т.п.)

933. [T001809] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

А) этиотропным

Б) патогенетическим

В) симптоматическим

Г) паллиативным

934. [T001810] УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

А) радикальным

Б) паллиативным

В) симптоматическим

Г) патогенетическим

935. [T001811] НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРОСТОМЫ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

А) паллиативным

Б) радикальным

В) симптоматическим

Г) патогенетическим

936. [T001815] ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ А) сальбутамол

Б) кодеин

В) либексин

Г) тусупрекс

937. [T001816] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ ПРИМЕНЯЮТ

А) антибиотики, отхаркивающие

Б) антибиотики, диуретики

В) бронхолитики, глюкокортикоиды

Г) бронхолитики, диуретики

938. [T001818] ПРИМЕНЕНИЕ МОРФИНА В НАЧАЛЕ ТЕРАПИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

А) рвоты и поноса

Б) запора

В) гипотонии

Г) бессонницы

939. [T001819] ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЛИПИДНЫХ БЛЯШЕК ВНУТРИ АРТЕРИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) атеросклероз

Б) сахарный диабет

В) ревматизм

Г) подагра

940. [T001821] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

А) фентанила, дроперидола, морфина

Б) максигана, лазикса

В) пентамина, диазола

Г) галоперидола, но-шпы

941. [T001822] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТВАР ИЗ

А) ольховых соплодий, коры дуба

Б) мяты

В) цветов бессмертника

Г) толокнянки

942. [T001825] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА БОЛЬ КУПИРУЕТСЯ

А) наркотическими анальгетиками

Б) бета-блокаторами

В) диуретиками

Г) статинами

943. [T001826] ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ II СТАДИИ ПРОВОДЯТ

А) постоянно

Б) коротким курсом

В) при ухудшении эпизодически

Г) сезонно

944. [T001827] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ

А) эналаприл, атенолол

Б) дигоксин, димедрол

В) целанид, корвалол

Г) атропин, аспаркам

945. [T001828] ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИМЕНЯЮТ

А) нитроглицерин

Б) панангин

В) морфин

Г) гепарин

946. [T001829] АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ МЕДСЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНИМАТЬ

А) через 10 мин после еды

Б) за 10 мин. до еды

В) за 20 мин. до еды

Г) за 30 мин. до еды

947. [T001835] РАСТВОР ПРИ ЗАКАПЫВАНИИ В УХО ПОДОГРЕВАЮТ ДО

А) 37 град. С

Б) 40 град. С

В) 49 град. С

Г) 24 град. С

948. [T001836] ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПОДКОЖНО ВВОДЯТ В ОБЪЕМЕ НЕ БОЛЕЕ

А) 2 мл

Б) 3 мл

В) 4 мл

Г) 5 мл

949. [T001837] СТЕРИЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ПЕРЕД ИНЬЕКЦИЕЙ ПОДОГРЕВАЮТ ДО

А) 38 град. С

Б) 40 град. С

В) 34 град. С

Г) 28 град. С

950. [T001838] ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ ИМЕЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

А) 0,9%

Б) 10% В) 1%

Г) 0,1%

951. [T001839] СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЗАПИВАЮТ

А) молоком

Б) киселем

В) водой

Г) кефиром

952. [T001841] ПРИ ПРИЕМЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ ВБЛОКАТОРОВ МЕДСЕСТРА КОНТРОЛИРУЕТ

- А) артериальное давление, пульс
  - Б) массу тела
  - В) состояние полости рта
  - Г) суточный диурез
953. [T001844] ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИАТОВ У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ БОЛИ
- А) вызывает психологическую зависимость
  - Б) не вызывает психологической зависимости
  - В) не вызывает физической зависимости
  - Г) вызывает изменение типа личности человека

954. [T001847] НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫЗЫВАЮТ

- А) желудочно-кишечные кровотечения
- Б) анемию
- В) одышку
- Г) снижение артериального давления

955. [T001848] ПРИ МИКСЕДЕМЕ НАЗНАЧАЕТСЯ А) тиреоидин

- Б) радиоактивный йод
- В) мерказолил
- Г) адреналин

956. [T001854] ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПОКАЗАНО ПРИ

- А) ревматизме
- Б) бронхите
- В) гепатите
- Г) холецистите

957. [T001855] ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К А) бронхоскопии

- Б) рентгеноскопии
- В) томографии
- Г) флюорографии

958. [T001856] ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

- А) кандидоз полости рта
- Б) лунообразное лицо
- В) стероидный диабет
- Г) стероидная язва

959. [T001857] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) тщательное полоскание рта
- Б) применение до еды
- В) применение сразу после еды
- Г) запивать соком

960. [T001858] ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ

- А) ацетилсалициловую кислоту
- Б) конкор
- В) нитроцглицерин
- Г) анаприлин

961. [T001859] СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- А) галидор
- Б) анальгин
- В) пепсин
- Г) фестал

962. [T001861] К ОТСРОЧЕННЫМ ЭФФЕКТАМ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

- А) канцерогенные
- Б) токсические
- В) фармакогенетические
- Г) синдром отмены

963. [T001865] КЛИРЕНС - ЭТО

- А) мера способности организма эlimинировать лекарственный препарат
- Б) мера длительности нахождения лекарственного препарата в организме
- В) скорость кровотока через почки
- Г) скорость метаболизма лекарства в печени

964. [T001866] «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ

- А) подозрении на инфекционное заболевание
- Б) подтверждении диагноза инфекционного заболевания
- В) установлении границ эпидемического очага
- Г) установлении числа контактных

965. [T001867] «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ СЛЕДУЕТ НАПРАВИТЬ

А) в территориальный орган Роспотребнадзора

- Б) в управление здравоохранения
- В) в районную бактериологическую лабораторию
- Г) в дезинфекционную станцию

966. [T001868] В СЛУЧАЕ ПЕДИКУЛЕЗА НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАВЯТ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- А) «Р»
- Б) «А» В) «В»

Г) «В-20»

967. [T001869] СЕРТИФИКАТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ ХРАНИТСЯ А) у пациента

- Б) у участкового врача
- В) в регистратуре медицинской организации
- Г) в прививочном кабинете поликлиники

968. [T001870] УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ БОЛЬНЫХ, ВЗЯТЫХ НА ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) контрольная карта диспансерного наблюдения

- Б) медицинская карта амбулаторного больного
- В) статистический талон
- Г) выписка из медицинской карты стационарного больного

969. [T001871] ТЕМПЕРАТУРУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ГДЕ ХРАНЯТ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РЕГИСТРИРУЮТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

- А) каждые 12 часов
  - Б) каждый час
  - В) ежедневно
  - Г) 1 раз в 7 дней
970. [T001872] ДОКУМЕНТОМ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) паспорт здоровья
  - Б) справка о здоровье
  - В) выписка из медицинской карты
  - Г) заключение о результатах обследования

971. [T001873] ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- А) выявления инфекционного заболевания
- Б) вызова скорой медицинской помощи
- В) оказания доврачебной помощи
- Г) производственной травмы

972. [T001874] МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЕЕ ВЛИЯНИЕМ НА ЗДОРОВЬЕ

- А) паспорт здоровья
- Б) медицинская карта стационарного больного
- В) карта диспансерного наблюдения
- Г) обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы

973. [T001877] ПРИ ПОБОЧНОМ ДЕЙСТВИИ ВАКЦИНЫ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

А) экстренное извещение

- Б) карта здоровья
- В) медицинская карта стационарного больного
- Г) единый талон амбулаторного пациента

974. [T001878] К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ ОТНОСИТСЯ

- А) кларитромицин
- Б) феноболил
- В) натрия фторид
- Г) лоратадин (кларитин)

975. [T001879] К ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) арбидол
- Б) дроперидол
- В) парацетамол
- Г) протамина сульфат

976. [T001881] САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ

РЕЖИМОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи
- Б) комплекс мероприятий направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде
- В) меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях
- Г) регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики

977. [T001882] ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) на 3-5 день жизни
- Б) в 1-й день жизни
- В) в 1-й месяц
- Г) в 3 месяца

978. [T001883] ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- А) вакцины
- Б) витамины
- В) антибиотики
- Г) пробиотики

979. [T001884] ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ АНТРОПОНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) человек
- Б) животное
- В) насекомое
- Г) пресмыкающееся

980. [T001885] МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ НА НЕСКОЛЬКО СТРАН И КОНТИНЕНТОВ – ЭТО

А) пандемия

Б) эпидемия

В) эндемия

Г) спорадические заболевания

981. [T001886] К СПОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ ВЫЗЫВАТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАКРООРГАНИЗМЕ ОТНОСИТСЯ

А) патогенность

Б) профильность

В) комплиментарность

Г) востребованность

982. [T001887] ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ОТ МОМЕНТА ВНЕДРЕНИЯ ПАТОГЕННОГО МИКРООРГАНИЗМА ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) инкубационный период

Б) продромальный период

В) период развития основных клинических явлений

Г) исход

983. [T001888] ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, НЕ ЧАЩЕ ЧЕМ ОДИН РАЗ В

А) год

Б) три года

В) два года

Г) четыре года

984. [T001889] ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО НЕ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В

А) один год

Б) три года

В) четыре года

Г) два года

985. [T001890] В КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ВХОДЯТ

А) маршрутная карта диспансеризации, паспорт здоровья

Б) амбулаторная карта пациента, карта выбывшего из стационара

В) карта стационарного больного, амбулаторная карта

Г) маршрутная карта диспансеризации, паспорт болезни

986. [T001891] ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕШЕННОЛЕТНИХ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ВНОСЯТСЯ В

А) паспорт здоровья

Б) учетную форму № 25/у-04

В) маршрутную карту

Г) карту учета диспансеризации

987. [T001892] ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ

А) после каждой генеральной уборки

Б) 1 раз в месяц

В) ежедневно

Г) 1 раз в 10 дней

988. [T001893] ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ В ЖУРНАЛ

А) контроля стерилизации инструментов и мягкого инвентаря

Б) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб

В) кварцевания кабинета

Г) генеральной уборки

989. [T001898] ИНФЕКЦИИ,  
СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)  
РАЗВИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ  
НАЛИЧИИ

- А) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
- Б) источника инфекции, механизмов и факторов передачи
- В) источника инфекции
- Г) источника инфекции и восприимчивого человека

990. [T001901] К ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ А)  
медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях

- Б) медицинская карта стационарного больного
- В) статистическая карта выбывшего из стационара
- Г) направление на лечение в стационарных условиях

991. [T001903] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ИЛИ ПОДОЗРЕНИИ НА НЕГО  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного образования
- Б) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- В) листок нетрудоспособности
- Г) направление на госпитализацию

992. [T001905] В ПРИЕМНОМ  
ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА  
ЗАПОЛНЯЮТ А) паспортную часть  
истории болезни

- Б) карту стационарного больного
- В) карту выбывшего из стационара

Г) бланки направлений на лабораторные исследования

993. [T001906] К МЕДИЦИНСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕ  
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПОСТОВОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПО СМЕНЕ,  
ОТНОСИТСЯ

- А) порционное требование в 2-х экземплярах
- Б) журнал регистрации температурящих пациентов
- В) журнал учета ядовитых и сильнодействующих препаратов
- Г) журнал приема и передачи дежурств

994. [T001907] ЖУРНАЛ ПРИЕМА И  
ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВ СОДЕРЖИТ

- А) перечень срочных назначений
- Б) температурный лист
- В) паспортные данные пациента
- Г) отказ от госпитализации

995. [T001908] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ЗАПОЛНЯЕТ А) медицинскую карту  
стационарного больного

- Б) порционное требование
- В) журнал учета инъекций

Г) температурный лист

996. [T001909] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  
ПЕДИКУЛЕЗА МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

- А) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- Б) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- В) журнал учета амбулаторных больных
- Г) статистическую карту выбывшего из стационара

997. [T001910] ПОРЦИОННОЕ  
ТРЕБОВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ  
СОСТАВЛЯЕТСЯ

А) ежедневно

Б) 2 раза в неделю

В) при поступлении пациента

Г) 1 раз в неделю

998. [T001911] НАЗНАЧЕННАЯ ВРАЧОМ  
ДИЕТА ФИКСИРУЕТСЯ В

А) листе назначений

Б) требованиях на лекарственные препараты

В) истории болезни

Г) температурном листе

999. [T001913] В ЖУРНАРЕ  
РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НА  
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОТДЕЛЬНО  
ОТВОДИТСЯ

А) лист

Б) графа

В) строка

Г) тетрадь

1000. [T001914] ЖУРНАЛ УЧЕТА  
ВЗЯТИЯ КРОВИ НА ВИЧ ЗАПОЛНЯЕТ  
А) процедурная медицинская сестра

Б) палатная медицинская сестра

В) старшая медицинская сестра

Г) операционная медицинская сестра

1001. [T001915] В ЖУРНАЛЕ  
РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И  
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ  
ПРЕПАРАТОВ МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕТ  
СВЕДЕНИЯ О РАСХОДЕ

А) каждого их применения

Б) ежедневно

В) еженедельно Г) 1 раз в месяц

1002. [T001916] ЖУРНАЛ НАЗНАЧЕНИЙ  
ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ЗАПОЛНЯЕТ

А) ежедневно

Б) всегда после каждой выполненной  
манипуляции

В) 2 раза в день

Г) 1 раз в неделю

1003. [T001917] ТРЕБОВАНИЕ В  
АПТЕКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИЛОВОГО  
СПИРТА ЗАВЕРЯЕТСЯ

А) главным врачом

Б) старшей медсестрой

В) главной медсестрой

Г) заведующим отделением

1004. [T001918] ПОРЦИОННОЕ  
ТРЕБОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЕТ А) постовая  
медсестра

Б) медсестра процедурного кабинета

В) участковая медсестра

Г) старшая медсестра

1005. [T001919] ПОЛУЧЕННЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОМЕТРИИ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАНОСИТ В  
А) температурный лист

Б) историю болезни

В) лист назначений

Г) дневник наблюдений

1006. [T001922] ЖУРНАЛ  
РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,  
ПОСТУПАЮЩИХ В ЛЕЧЕБНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВЕДЕТ

А) постовая медицинская сестра

Б) старшая медицинская сестра

В) медсестра приемного отделения

Г) медсестра процедурного кабинета

1007. [T001923] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ЗАПОЛНЯЕТ

- А) журнал учета работы бактерицидной лампы
- Б) журнал отказа от госпитализации
- В) журнал учета санпросвет работы
- Г) журнал перевязок

1008. [T001924] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ЗАПОЛНЯЕТ

- А) приемную квитанцию
- Б) медицинскую карту стационарного больного
- В) журнал учета приема больных
- Г) статистическую карту выбывшего из стационара

1009. [T001925] КНИГИ УЧЕТА И ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНОКОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- А) заверены печатью и подписью главного врача медицинской организации
- Б) подписаны постовой медицинской сестрой
- В) подписаны заведующим отделением
- Г) заполнены в произвольной форме

1010. [T001928] ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ УДОСТОВЕРЯЕТ ОБОСНОВАННОСТЬ ВРЕМЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ А) листок временной нетрудоспособности

- Б) медицинская карта
- В) полис ОМС
- Г) СНИЛС

1011. [T001929] ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ

- А) паспорт
- Б) полис ОМС
- В) медицинская карта амбулаторного больного
- Г) СНИЛС

1012. [T001931] ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ А) не допускается ни одной

- Б) возможна одна
- В) возможны две
- Г) допускается не более трех

1013. [T001933] ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ (УСТАНОВКИ) ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) при каждом включении
- Б) ежедневно
- В) 1 раз в неделю
- Г) 1 раз в месяц

1014. [T001934] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ НЕОБХОДИМО А) подать экстренное извещение в Роспотребнадзор

- Б) ввести противодифтерийную сыворотку
- В) наблюдение и лечение на дому
- Г) сообщить врачу

1015. [T001935] ЗАПИСЬ О ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАРКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В

- А) журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же в истории болезни
- Б) листе назначений
- В) журнале учета лекарственных препаратов

Г) процедурном журнале

1016. [T001936] ПРИ ПЛАНОВОМ  
ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В  
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ  
НЕОБХОДИМО

А) направление от врача поликлиники

Б) заключение КЭК

В) листок временной нетрудоспособности

Г) результат термометрии

1017. [T001938] В СЛУЧАЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСТИНЪЕКЦИОННОГО  
ИНФИЛЬТРАТА МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА ДОЛЖНА

А) довести до сведения врача и сделать  
запись в журнал регистрации  
постинъекционных осложнений

Б) обработать инфильтрат 5% раствором  
йода

В) проконсультироваться с хирургом и  
направить пациента на УВЧ-терапию

Г) отменить последующие инъекции

1018. [T001940] ПОЛИС  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖЕН  
НАХОДИТЬСЯ

А) на руках у застрахованного гражданина

Б) на посту медицинской сестры

В) у врача в ординаторской

Г) в страховой организации

1019. [T001941] В ЖУРНАЛЕ  
РЕГИСТРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С  
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ  
ПРЕПАРАТОВ НЕОБХОДИМО  
УКАЗАТЬ

А) фамилию, имя, отчество пациента и  
номер истории болезни

Б) диагноз болезни пациента

В) путь введения препарата

Г) количество препарата

1020. [T001943] ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПАЦИЕНТУ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО И  
НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА А) делает запись о результатах  
выполнения в медицинской документации

Б) в устной форме сообщает о выполнении  
манипуляции сестре хозяйке

В) в устной форме сообщает о выполнении  
манипуляции лечащему врачу

Г) не делает соответствующей записи в  
медицинскую документацию

1021. [T001945] ДОБРОВОЛЬНОЕ  
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ  
ЧЕЛОВЕКА НА ЛЮБОЕ  
МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

А) обязательно в письменном виде

Б) желательно

В) не обязательно

Г) зависит от конкретного случая

1022. [T001946] ЖУРНАЛ УЧЕТА  
ПРИЕМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ В  
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕДЕТСЯ

А) в приемном отделении

Б) в каждом отделении

В) в каждом кабинете

Г) в поликлинике

1023. [T001947] ГРАФИЧЕСКИЕ  
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМ  
ЛИСТЕ ПАЦИЕНТА ВЫПОЛНЯЕТ

А) медицинская сестра палатная  
(постовая)

Б) заведующий отделением

В) процедурная медицинская сестра

Г) старшая медицинская сестра отделения

1024. [T001948] В ПОЛИКЛИНИКЕ  
ОФОРМЛЯЮТ "МЕДИЦИНСКУЮ  
КАРТУ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО  
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В

- А) амбулаторных условиях  
Б) стационарных условиях  
В) санаторно-курортном учреждении  
Г) женской консультации
1025. [Т001949] ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
- А) азопирамовой пробы  
Б) ортотолуидиновой пробы  
В) бензидиновой пробы  
Г) озоновой пробы
1026. [Т001950] ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ А) ежедневно  
Б) 1 раз в неделю  
В) 1 раз в месяц Г) ежемесячно
1027. [Т001952] ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЛАЕТСЯ
- А) после каждого кварцевания  
Б) в конце рабочей смены  
В) перед началом рабочей смены  
Г) 1 раз в неделю
1028. [Т001955] ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ "ПОРЦИОННИК НА ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ (№ 1-84)"
- А) ежедневно  
Б) перед каждым приемом пищи  
В) 2 раза в день  
Г) 1 раз в неделю
1029. [Т001957] ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ

- НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОЛЖЕН БЫТЬ А) пронумерован, прошнурован, иметь печать и подпись руководителя медицинской организации
- Б) пронумерован, иметь печать подразделения
- В) прошнурован, иметь печать и подпись руководителя подразделения
- Г) пронумерован
1030. [Т001958] СПИСОК ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ОТДЕЛЕНИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИИ) МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СПРАВОЧНОГО СТОЛА СОСТАВЛЯЕТСЯ
- А) ежедневно медицинской сестрой ночной смены  
Б) старшей медицинской сестрой  
В) заведующим отделением  
Г) процедурной медицинской сестрой
1031. [Т001966] ДНЕВНИК В "МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО" (ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ) Ф N 003/У-80 ЗАПОЛНЯЕТ
- А) лечащий врач  
Б) постовая медицинская сестра  
В) старшая медицинская сестра  
Г) заведующий отделением
1032. [Т001970] ЛИСТ УЧЕТА ВОДНОГО БАЛАНСА ЗАПОЛНЯЕТ
- А) медицинская сестра  
Б) пациент  
В) лечащий врач  
Г) старшая медсестра

1033. [T001976] УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ

- А) специальной комиссией, с составлением акта
- Б) старшей медицинской сестрой
- В) лечащим врачом
- Г) дежурной медицинской сестрой

1034. [T001977] ЗАПИСИ В "ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ" ВЕДЕТ

- А) медицинская сестра
- Б) лечащий врач
- В) старшая медицинская сестра
- Г) процедурная медицинская сестра

1035. [T001978] "ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ" ПАЦИЕНТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) ежедневно утром и вечером
- Б) ежедневно утром
- В) ежедневно вечером
- Г) через день

1036. [T001984] ЗА ПОДДЕЛКУ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

- А) уголовная ответственность
- Б) выговор
- В) строгий выговор
- Г) наказание не предусматривается

1037. [T001998] К ГРУППЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ

- А) ацикловир
- Б) дроперидол
- В) парацетамол
- Г) протамина сульфат

1038. [T002000] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРЕПАРАТОВ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИНСУЛИН А)

- гипогликемические средства
- Б) антисептики

- В) кардиопротекторы
- Г) ферментные препараты

1039. [T002017] ПЛАНИРОВАНИЕМ СЕМЬИ ЗАНИМАЮТСЯ

- А) центры планирования семьи
- Б) смотровые кабинеты поликлиник
- В) родильные дома
- Г) врач-гинеколог участковый

1040. [T002027] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) использование компьютерной информации
- Б) использование пишущих машинок
- В) учет в прошнурованных журналах
- Г) ведение картотеки

1041. [T002029] ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР, ВЕДЕТСЯ

- А) журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации (ф001/у)
- Б) медицинская карта стационарного больного ф003/у
- В) листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у
- Г) статистическая карта выбывшего из стационара ф066/у

1042. [T002035] АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК (ОТЕК КВИНКЕ) ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

- А) в области губ, щек, гортани

Б) на передней поверхности груди и живота

В) на спине

Г) в области кистей и стоп

1043. [T002036] ПРОЯВЛЕНИЕМ КОЛЛАПСА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) потеря сознания

Б) заторможенность

В) гиперемия кожных покровов

Г) проливной пот

1044. [T016325] ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

А) вакцины

Б) витамины

В) антибиотики

Г) пробиотики

1045. [T016326] АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ

А) перенесенного инфекционного заболевания

Б) приёма препаратов интерферона

В) вакцинации Г) введения иммуноглобулина

1046. [T016327] К МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГЕ ОСТРОГО КИШЕЧНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

А) установление карантина 7 дней и обследование контактных лиц

Б) установление карантина 35 дней в очаге инфекции

В) проведение вакцинации в очаге инфекции

Г) соблюдение безмолочной диеты

1047. [T016328] ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ А) стрептококковая инфекция

Б) пищевая аллергия В) врожденный порок сердца

Г) поллиноз

1048. [T016329] СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ

А) вакцинации и ревакцинации

Б) пробы Манту

В) Диаскин-теста

Г) рентгенографии

1049. [T016334] ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ГРИППА

А) влажная уборка и проветривание помещения

Б) бывшие в контакте с больными, не привитые и не болевшие подлежат срочной иммунизации

В) разобщение контактных на 7 дней после последнего случая заболевания

Г) очаговая дезинфекция

1050. [T016335] ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ КОРИ

А) влажная уборка, проветривание помещения

Б) двукратное бактериологическое обследование контактных

В) очаговая дезинфекция

Г) заключительная дезинфекция

1051. [T016336] ЕДИНИЦЕЙ УЧЕТА ВАКЦИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) доза

Б) упаковка

В) миллилитр

Г) ампула

1052. [T016337] ОСНОВНЫМ НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ

**РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- A) возраст
- B) гиподинамия
- C) ожирение
- D) дислипидемия

**1053. [T016339] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА**

- A) предупреждение отклонений в здоровье и заболеваний
- B) выявление вируса
- C) общение с пациентом
- D) организацию занятий

**1054. [T016342] РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ**

- A) пациентом или его законным представителем (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- B) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
- C) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента
- D) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

**1055. [T016345] УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- A) дезинфекция

Б) дератизация

В) дезинсекция

Г) стерилизация

**1056. [T016346] НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРВЫЕ 12 ЧАСОВ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ**

- A) первая вакцинация против гепатита В
- B) вакцинация против туберкулеза
- C) первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
- D) вакцинация против полиомиелита

**1057. [T016347] СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- A) хоспис
- B) поликлиника
- C) пансионат
- D) станция скорой медицинской помощи

**1058. [T016348] ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГЛАВНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ РФ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЭТО**  
A) Федеральный Закон от 29.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

- B) Конституция Российской Федерации
- C) Приказ МЗ СССР от 23.09.1981 г. №1000 «О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»

**Г) Приказ Минздрава России от 03.02.2015 г. № 36ан «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»**

**1059. [T016349] ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- A) снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям

- Б) разрыва путей передачи возбудителей
- В) обезвреживания источника инфекции

Г) уничтожения возбудителей заболеваний

1060. [T016350] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) стресс и психическое напряжение
- Б) низкое атмосферное давление
- В) длительное переохлаждение
- Г) прием снотворных

1061. [T016351] ДИЕТА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) ограничение жиров и углеводов
- Б) увеличение потребления жидкости и белков
- В) ограничение жидкости и соли
- Г) увеличение потребления жиров и минералов

1062. [T016352] ПРИЧИНАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ А) поступления внутрь свинца и ртути

- Б) хронического панкреатита
- В) алкоголя и табака
- Г) избыточной массы тела

1063. [T016353] К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ А) пола и возраста

- Б) повышенного кровяного давления
- В) излишнего веса и ожирения
- Г) пониженной физической активности

1064. [T016354] НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ А) половозрастная принадлежность

- Б) употребление табака и алкоголизм

- В) несбалансированное питание

Г) недостаточная физическая актив

1065. [T016355] САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

- А) усиливает и ускоряет негативные обменные процессы в обмене веществ
- Б) облегчает течение всех болезней
- В) не оказывает влияния
- Г) способствует повышению устойчивости к болезням

1066. [T016356] В РОССИИ ПРИ АКТИВНОЙ ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ К 2030 ГОДУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

- А) значительное снижение смертности от хронических неинфекционных заболеваний
- Б) исчезновение всех болезней
- В) рост «новых» инфекционных болезней
- Г) социальное благополучие населения

1067. [T016361] СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ «0 – 1 – 6» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ

- А) вирусного гепатита В
- Б) гриппа
- В) дифтерии, коклюша, столбняка
- Г) кори, ветряной оспы, краснухи

1068. [T016362] К ВАКЦИНАЦИИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ОТНОСИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ А) гриппа и бешенства

- Б) полиомиелита
- В) вирусного гепатита В
- Г) кори

1069. [T016363] К МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОщи ОТНОСИТСЯ

А) поликлиника

Б) хоспис

В) пансионат

Г) санаторий-профилакторий

1070. [T016364] ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) Федеральный Закон от 29.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Б) Конституция Российской Федерации

В) приказ МЗ СССР от 23.09.1981 г. №1000 «О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»

Г) приказ Минздрава России от 30.09.2015 г. №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»

1071. [T016365]  
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
НАПРАВЛЕНА НА

А) здоровое население, имеющее риск инфицирования

Б) пути передачи возбудителей

В) источник инфекции

Г) возбудителей заболевания

1072. [T016366] В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ ПРИЕМ

А) поваренной соли

Б) углеводов

В) перца и помидоров

Г) растительного масла

1073. [T016367] В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

А) нарушение липидного обмена

Б) очаг хронической инфекции

В) длительное переохлаждение

Г) прием снотворных

1074. [T016368] "СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ" ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ЭТО

А) здоровье

Б) диспансеризация

В) профилактика

Г) политика

1075. [T016369] ДИЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

А) ограничение острых и мясных блюд из свинины и баранины

Б) увеличение потребления жидкости и сладостей

В) ограничение жидкости и соли

Г) увеличение потребления жиров и пряностей

1076. [T016370] ПРИЧИНОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

А) нарушение углеводного и липидного обмена

Б) недосыпание

В) алкоголизм

Г) пребывание на солнце

1077. [T016371] К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ

АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ,  
КРОМЕ

- А) наследственности
- Б) повышенного кровяного давления
- В) излишнего веса и ожирения
- Г) пониженной физической активности

1078. [T016372] НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) половозрастная принадлежность
- Б) употребление табака и алкоголя
- В) несбалансированное питание
- Г) недостаточная физическая активность

1079. [T016373] АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПERTЕНЗИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

- А) усиливает и ускоряет негативные обменные процессы
- Б) облегчает течение всех болезней
- В) не оказывает влияния
- Г) способствует повышению устойчивости к болезням

1080. [T016374] ПРОГНОЗОМ В РОССИИ К 2030 ГОДУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

- А) значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
- Б) исчезновение всех инфекционных болезней В) появление «новых» инфекционных болезней
- Г) рост социального обеспечения населения

1081. [T016375] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВРАЧАМИ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ – ЭТО А) диспансеризация

Б) профилактика В) здоровье

Г) политика

1082. [T016377] КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ С 01.04.2015 Г. СЧИТАЕТСЯ

- А) 2
- Б) 10
- В) 5
- Г) 3

1083. [T016378] ЛИЦА, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) 1
- Б) 2
- В) 3а
- Г) 3б

1084. [T016381] ВАКЦИНАЦИЯ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ ПРОТИВ

- А) туберкулеза
- Б) гриппа
- В) дифтерии, коклюша, столбняка
- Г) кори, ветряной оспы, краснухи

1085. [T016382] ЛАБОРАНТАМ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ

- А) сибирской язвы
- Б) ветряной оспы
- В) коклюша
- Г) полиомиелита

1086. [T016383] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ А) определение состояния здоровья пациента

- Б) проведение реабилитационных мероприятий
- В) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
- Г) своевременное выявление инфекционных заболеваний

1087. [T016384] МОДИФИЦИРОВАННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) активное и пассивное курение
- Б) проживание в местности с хвойным лесом
- В) гиподинамия
- Г) повышенные физические нагрузки

1088. [T016385] МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ожирение
- Б) психорогические стрессы
- В) наследственность
- Г) артериальная гипертензия

1089. [T016387] МАММОГРАФИЯ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ЖЕНЩИНАМ

- А) 1 раз в два года
- Б) по показаниям
- В) 2 раза в год
- Г) ежегодно

1090. [T016388] ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) соблюдении режима физической активности, диеты, здорового образа жизни

- Б) физиотерапевтических методах лечения
- В) механических методах лечения, в занятиях лечебной физкультурой
- Г) медикаментозной терапии

1091. [T016389] СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОЙ ПРИВИВКЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТСЯ В СЕРТИФИКАТЕ

- А) вид препарата, серия, контрольный номер
- Б) вид препарата, серия
- В) вид препарата, цвет вакцинного препарата
- Г) вид препарата, срок годности

1092. [T016390] ЦЕЛЬЮ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) формирование знаний и умений самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся сохранения и укрепления здоровья
- Б) обучение правилам ведения домашнего хозяйства с учетом гигиенических и социально культурных традиций
- В) расширение знаний в медико-гигиенических вопросах, подготовка к действиям в экстремальных условиях
- Г) обучение правилам оказания первой помощи при заболеваниях и травмах

1093. [T016392] К ДВИГАТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ, ПРИ КОТОРОМ РАЗРЕШЕНЫ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ (БЛИЖНИЙ ТУРИЗМ) ОТНОСИТСЯ РЕЖИМ

- А) тренирующий
- Б) свободный
- В) щадящий
- Г) щадяще-тренирующий

1094. [T016394] НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ И ЧАСТЫМ ВИДОМ ИНВАЛИДНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППА ИНВАЛИДОВ

- А) по общему заболеванию
- Б) труда

В) войны

Г) с детства

1095. [T016395] ПРИНЦИПОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса
- Б) выявление заболеваний на ранних стадиях и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
- В) накопление контингентов в легких группах за счет уменьшения их в тяжелых
- Г) выявление ранних стадий заболеваний по степени активности

1096. [T016396] ПОКАЗАТЕЛЬ «ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ» ОТРАЖАЕТ

- А) отношение количества лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации
- Б) отношение числа зарегистрированных заболеваний к численности проживающего населения
- В) отношение численности населения, которому проведены необходимые исследования и осмотры врачей к числу зарегистрированных случаев заболеваний
- Г) отношение числа зарегистрированных заболеваний к общему числу лиц с временной и стойкой нетрудоспособностью

1097. [T016397] ОДНОЙ ИЗ ГРУПП УЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) здоровые Б) женщины
- В) подростки
- Г) дети

1098. [T016398] К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ

МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАЛЕННЫМ НА ПЕРВОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

- А) выявление бактерионосителей
  - Б) соблюдение личной гигиены
  - В) употребление доброкачественной воды
  - Г) санитарно-просветительская работа
1099. [T016399] К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ВТОРОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ
- А) заключительная дезинфекция
  - Б) иммунопрофилактика
  - В) госпитализация больных
  - Г) санитарно-просветительская работа

1100. [T016400] К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ТРЕТЬЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ

- А) иммунопрофилактика контактных
- Б) дератизация
- В) дезинфекция
- Г) изоляция больных

1101. [T016401] ПОД ФАКТОРАМИ РИСКА ПОНИМАЮТ

- А) факторы, способствующие развитию заболеваний
- Б) мешающие факторы (конфаундеры), исказжающие результаты исследований
- В) случайные ошибки в исследованиях
- Г) факторы, способствующие возникновению ошибок при анализе полученных результатов

1102. [T016402] ПОНЯТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

А) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в которых он способен в данной конкретной обстановке, при данной инфекции передавать заразное начало окружающим

Б) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и популяции хозяина

В) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания

Г) территория, на которой длительное время сохраняются заболевания среди диких животных

**1103. [T016403] ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

А) контагиозность

Б) тяжесть течения

В) острое течение

Г) переход в хроническую форму

**1104. [T016404] НОСИТЕЛЬСТВО - ЭТО ТАКАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРО- И МАКРООРГАНИЗМА, ПРИ КОТОРОЙ**

А) микроб не вызывает патологических изменений в тканях

Б) возникают патологические изменения в органах и тканях

В) характерна крайне тяжелая степень поражения тканей

Г) происходит гибель микроорганизма

**1105. [T016406] ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОКАЗЫВАЕТ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ А)**  
увеличивает жизненную ёмкость лёгких

Б) нормализует процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга

В) улучшает периферическое кровообращение

Г) понижает артериальное давление

**1106. [T016407] ПРЕВЕНТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ НАПРАВЛЕНА НА**

А) сохранение здоровья населения за счет предупреждения заболеваний

Б) устранение стойкой нетрудоспособности

В) лечебный процесс

Г) сокращение временной нетрудоспособности

**1107. [T016408] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ГЛЮКОЗУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО**

А) определить уровень глюкозы в крови натощак

Б) провести глюкозотolerантный тест

В) ограничить употребление углеводов

Г) определить уровень базального инсулина

**1108. [T016409] БОЛЬНЫМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ**

А) врача-аллерголога

Б) врача-инфекциониста

В) врача-онколога

Г) врача-хирурга

**1109. [T016410] К МЕТОДАМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

А) обращаемость за медицинской помощью

Б) перепись населения

В) перепись больных

Г) антропометрическое измерение

**1110. [T016411] К ЗАБОЛЕВАНИЯМ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ**

- ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ  
А) бронхиальная астма  
Б) туберкулез В) легочный протеиноз  
Г) пневмония

1111. [T016412] ОСНОВНЫМ  
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ УРОВЕНЬ  
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ожидаемая продолжительность жизни  
населения  
Б) средняя продолжительность жизни  
В) уровень детской смертности  
Г) трудовой потенциал населения

1112. [T016413] ИСТОЧНИКОМ  
ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО  
ОБРАЩАЕМОСТИ В МЕДИЦИНСКУЮ  
ОРГАНИЗАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) статистический талон уточненных  
диагнозов  
Б) медицинская карта стационарного  
больного  
В) контрольная карта диспансерного  
наблюдения  
Г) листок временной нетрудоспособности

1113. [T016414] УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) экстренное извещение об  
инфекционном заболевании, пищевом,  
остром профессиональном отравлении  
Б) медицинская карта амбулаторного  
больного  
В) медицинская карта стационарного  
больного  
Г) статистический талон уточненных  
диагнозов

1114. [T016415] В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН  
УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ  
ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ

- А) сердечно-сосудистые заболевания

- Б) заболевания органов дыхания  
В) травмы, несчастные случаи, отравления  
Г) злокачественные образования

1115. [T016416] ГРУППА  
ИНВАЛИДНОСТИ ЛИЦУ СО СТОЙКОЙ  
УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ  
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- А) медико-социальной экспертизой  
комиссией  
Б) клинико-экспертной комиссией  
В) заместителем главного врача по  
экспертизе трудоспособности  
Г) заведующим отделением

1116. [T016417] НАИБОЛЕЕ  
ЭФФЕКТИВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ  
В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  
ТАБАКОЗАВИСИМОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) психотерапия, заместительная терапия  
Б) физиотерапия, фармакотерапия  
В) дыхательная гимнастика, фитотерапия  
Г) гелиотерапия, аэротерапия

1117. [T016420] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО  
ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ В СУТКИ ДО

- А) 5 г  
Б) 6 г  
В) 10 г  
Г) 15 г

1118. [T016421]  
ФИБРОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНТОС  
КОПИЮ ПРОВОДЯТ НА \_\_\_\_ ЭТАПЕ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- А) втором  
Б) первом  
В) четвертом  
Г) третьем

1119. [T016423] К ОСМОТРУ ПАЦИЕНТА  
С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА С

ЧАСТЫМИ РЕЦИДИВАМИ  
ПРИВЛЕКАЕТСЯ

- А) врач-онколог
- Б) врач-невролог
- В) врач-эндокринолог
- Г) врач-оториноларинголог

1120. [T016425] ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВАКЦИНАЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬ ЗА  
РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 30 минут
- Б) 1-го часа
- В) 2-х часов
- Г) 3-х часов

1121. [T016426] ПРИ ЛЮБОМ  
ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ  
НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО  
ПРОВЕСТИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

- А) выделений больного
- Б) одежды больного
- В) посуды больного
- Г) постельного белья

1122. [T016427] ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ  
ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- А) воздух, пыль в помещении
- Б) вода
- В) насекомые
- Г) инъекционные инструменты

1123. [T016428] ДЛИТЕЛЬНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ –  
ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- А) злокачественные опухоли кожи
- Б) болезней сердечно-сосудистой системы
- В) болезни выделительной системы
- Г) болезней пищеварения

1124. [T016429] СУХОЙ ВОЗДУХ, ПЫЛЬ  
– ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ А) органов дыхания

- Б) мочевыделительной системы В)  
эндокринной системы
- Г) нервной системы

1125. [T016431] В СООТВЕТСТВИИ С  
САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ВЗРОСЛОГО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ  
КОМПЬЮТЕРОМ НЕ ДОЛЖНА  
ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ,  
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ \_\_\_\_\_  
МИНУТ

- А) 2 часа; 15 минут
- Б) 3 часа; 15 минут
- В) 4 часа; 30 минут
- Г) 5 часов; 45 минут

1126. [T016432] ЗАКАЛИВАЮЩАЯ  
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОРГАНИЗМА  
ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ

- А) согреванием
- Б) охлаждением
- В) обливанием холодной водой
- Г) охлаждением стоп

1127. [T016433] СТРЕССОВЫЕ  
СИТУАЦИИ, СМЕНА ЧАСОВЫХ  
ПОЯСОВ, НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА  
ТРУДА И ОТДЫХА ЯВЛЯЮТСЯ  
ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ

- А) биоритмов
- Б) качества жизни
- В) стиля жизни
- Г) принципов рационального питания

1128. [T016434] С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО  
ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И  
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ  
ПРОВОДИТСЯ

- А) флюорографическое обследование  
прикрепленного контингента населения

- Б) работа в эпидемическом очаге  
В) организация и проведение школ здоровья  
Г) организация и проведение вакцинации на участке
1129. [T016435] ОБЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ  
А) повышение температуры  
Б) появление гиперемии кожи  
В) отечность мягких тканей  
Г) небольшой инфильтрат
1130. [T016436] ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ УПРАЖНЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ  
А) наклоны туловища  
Б) бег  
В) приседания  
Г) быструю ходьбу
1131. [T016437] ПРОФИЛАКТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УМЕНЬШЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ  
А) третичная  
Б) вторичная  
В) первичная  
Г) социальная
1132. [T016438] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  
А) целевое санитарно-гигиеническое воспитание  
Б) предупреждение развития профессиональных заболеваний  
В) снижение влияния факторов риска  
Г) формирование здорового образа жизни
1133. [T016439] СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ А) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска

- Б) ранней диагностикой заболеваний  
В) снижением инвалидности  
Г) воздействием через средства массовой информации
1134. [T016440] ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ БОГАТЫХ  
А) белками  
Б) калием  
В) углеводами  
Г) клетчаткой
1135. [T016441] ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
А) механически и химически щадящее питание  
Б) разгрузочные дни  
В) ограничение животных жиров  
Г) повышенное количество белка
1136. [T016442] В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОГРАНИЧИВАЮТ  
А) поваренную соль  
Б) белки  
В) растительные жиры  
Г) витамины
1137. [T016443] К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ  
А) возраст  
Б) курение  
В) гиподинамия  
Г) нерациональное питание

1138. [T016444] ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ожирение
- Б) возраст
- В) пол
- Г) наследственность

1139. [T016445] НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наследственность
- Б) табакокурение
- В) респираторные заболевания
- Г) гиподинамия

1140. [T016446] ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) курение
- Б) возраст
- В) гиподинамия
- Г) пол

1141. [T016447] К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ

- А) ожирение
- Б) наследственность
- В) возраст
- Г) пол

1142. [T016448] К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ

- А) наследственность
- Б) ожирение

В) гиподинамия

Г) нерациональное питание

1143. [T016449] ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) переохлаждение
- Б) перегревание
- В) переедание
- Г) недостаточное питание

1144. [T016450] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) санации очагов инфекции
- Б) санаторно-курортном лечении
- В) диспансерном наблюдении
- Г) противорецидивной терапии

1145. [T016451] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиподинамия и избыточный вес
- Б) ревматизм
- В) хронический очаг инфекции
- Г) психическое перенапряжение

1146. [T016452] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПИТАНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ

- А) ограничение жиров
- Б) ограничение белков
- В) увеличение углеводов
- Г) увеличение содержания соли

1147. [T016453] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) дыхательной системы
- Б) нервной системы
- В) сердечно-сосудистой системы

Г) эндокринной системы

1148. [T016454] ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ведение здорового образа жизни
- Б) восстановление после заболеваний
- В) лечение обострений заболеваний Г)  
профилактика осложнений

1149. [T016455] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГИПERTОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) формирование здорового образа жизни
- Б) предотвращение осложнений  
заболевания
- В) предотвращение рецидивов заболевания
- Г) назначение белковой диеты

1150. [T016456] ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ А) ограниченное количество углеводов

- Б) большое количество углеводов
- В) большое количество белка
- Г) ограниченное количество белков

1151. [T016457] КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- А) бронхита
- Б) гастрита
- В) гепатита
- Г) ожирения

1152. [T016458] ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наследственная предрасположенность
- Б) гиподинамия
- В) интенсивные физические нагрузки Г)  
нерациональное питание

1153. [T016459] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- А) заболеваний органов дыхания
- Б) сердечно-сосудистых заболеваний
- В) заболеваний почек
- Г) заболеваний пищеварительной системы

1154. [T016460] НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- А) сердечно-сосудистых заболеваний
- Б) обструктивного бронхита
- В) заболеваний почек
- Г) психических заболеваний

1155. [T016461] РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) проведении бесед по формированию здорового образа жизни
- Б) создании профилактических программ
- В) лечении заболеваний на ранних стадиях
- Г) предупреждении рецидива заболевания

1156. [T016462] ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА

- А) быть адекватной
- Б) уменьшаться
- В) увеличиваться
- Г) отсутствовать

1157. [T016463] ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАНЦЕРОГЕНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) онкологических
- Б) сердечно-сосудистых
- В) эндокринных

Г) нервных

1158. [T016464] ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предупреждение абортов
- Б) высококалорийное питание
- В) лечение соматических заболеваний
- Г) низкокалорийное питание

1159. [T016465] ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- А) ожирения
- Б) бронхита
- В) гепатита
- Г) гастрита

1160. [T016466] РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕРОПРИЯТИЕМ

- А) первичной профилактики
- Б) вторичной профилактики
- В) третичной профилактики
- Г) популяционной профилактики

1161. [T016467] ПРИ ОЖИРЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) увеличить
- Б) уменьшить
- В) не изменять
- Г) исключить

1162. [T016468] ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) индекс курящего человека
- Б) тест Фогестрема
- В) тест Хорна
- Г) тип курильского поведения

1163. [T016469] ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ЛИЦ С

- А) индексом курящего человека больше 160
- Б) высокой степенью никотиновой зависимости
- В) низкой степенью готовности к отказу от курения
- Г) высоким индексом курящего человека

1164. [T016472] ФАКТОРОМ, ПРОВОЦИРУЮЩИМ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) чрезмерное физическое и психическое перенапряжение

- Б) переохлаждение
- В) недостаточное питание

1165. [T016473] К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) неблагоприятные условия труда
- Б) качество медицинской помощи
- В) возраст родителей

Г) загрязнение окружающей среды

1166. [T016474] К СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) отягощенная наследственность

- Б) качество медицинской помощи

В) условия труда

Г) качество питания

1167. [T016475] К МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) низкий уровень доступности и качества медицинской помощи

Б) отягощенная наследственность

В) низкий материальный уровень жизни

Г) несбалансированное питание

1168. [T016476] К ИЗМЕНЯЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

А) табакокурение

Б) отягощенная наследственность

В) ослабление иммунитета

Г) возраст

1169. [T016477] ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) наследственные иммунологические дефекты

Б) действие радиации

В) действие химических канцерогенов

Г) действие инфекционных агентов

1170. [T016478] ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) действие химических канцерогенов

Б) наследственная предрасположенность

В) иммунологические дефекты

Г) предрасполагающие заболевания

1171. [T016479] МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ

А) целевыми

Б) предварительными

В) предупредительными

Г) текущими

1172. [T016480] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОВОДЯТ

А) постоянно действующие комиссии по организации диспансеризации

Б) Министерство здравоохранения

В) медицинские университеты

Г) ведущие специалисты, главные врачи, руководители предприятий

1173. [T016481] В ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ

А) 2 этапа

Б) 4 этапа

В) 3 этапа

Г) 6 этапов

1174. [T016483] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ

А) выявления ранних форм заболеваний и факторов риска

Б) коррекции лечения

В) выявления заболеваний на поздних стадиях

Г) формирования отчетности

1175. [T016484] ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПERTОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРОВОДИТСЯ

А) 1-2 раза в год

Б) 1 раз в год

В) 3-6 раз в год

Г) 3-5 раз в год

1176. [T016487] ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ ИМЕЕТ ПРАВО ПРОВОДИТЬ

А) медперсонал, прошедший подготовку в области вакцинопрофилактики

Б) участковая медсестра

В) фельдшер

Г) процедурная медсестра

1177. [T016488] ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

- А) вакцинация в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет
- Б) вакцинация на 3 – 7 день жизни, первая ревакцинация в 7 лет, вторая ревакцинация в 14 лет
- В) первая вакцинация в 3 месяца, вторая вакцинация в 4,5 месяца, третья вакцинация в 6 месяцев
- Г) только по эпидемическим показаниям

1178. [T016489] АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВАКЦИН

- А) сильная реакция или постvakцинальное осложнение на предыдущее введение
- Б) острое респираторное вирусное заболевание
- В) переливание крови или иммуноглобулинов в анамнезе
- Г) наличие насморка без температуры

1179. [T016490] СЕРТИФИКАТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ (Ф.156/У93) ХРАНИТСЯ

- А) у пациента
  - Б) в регистратуре медицинской организации
  - В) у участкового врача Г) в прививочном кабинете поликлиники
1180. [T016491] ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ
- А) в 3 месяца
  - Б) на 3-7 сутки после рождения
  - В) в первые 12 ч после рождения
  - Г) в 12 месяцев

1181. [T016492] НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВАКЦИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ А) анафилактический шок

Б) гиперемия на месте инъекции

В) повышение температуры тела до 38°C

Г) местное повышение температуры

1182. [T016493] В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕНЕ

- А) не проводятся другие прививки
- Б) может проводится вакцинация против гриппа
- В) может проводится вакцинация против кори
- Г) может проводится вакцинация против полиомиелита

1183. [T016495] ВАКЦИНА АКДС ДЕТЬЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВВОДИТСЯ

- А) внутримышечно
- Б) перорально
- В) подкожно
- Г) внутрикожно

1184. [T016496] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ ТРЁХКРАТНО С ИНТЕРВАЛОМ

- А) 45 дней
- Б) 15 дней
- В) 30 дней Г) 60 дней

1185. [T016497] РУБЧИК НА МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ БЦЖ-ВАКЦИНЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ

- А) 3-6 месяцев
- Б) 1-6 недель В) 2-3 недели
- Г) 10-12 месяцев

1186. [T016499] СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ

А) закапывают стерильной пипеткой за 1 час до еды

Б) внутривенно

В) подкожно

Г) внутрикожно

1187. [T016500] ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРИ

А) напряженный стойкий

Б) не вырабатывается

В) кратковременный, в течении 1 года

Г) кратковременный, в течении 2 лет

1188. [T016501] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИСПОЛЬЗУЮТ

А) туберкулинодиагностику

Б) введение БЦЖ вакцины

В) флюорографическое обследование

Г) введение АКДС вакцины

1189. [T016502] ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ СХЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ

А) национальный календарь профилактических прививок

Б) прививочный сертификат В) приказ Минздрава России от 03.12.2012 №1006н

Г) экстренное извещение об инфекционном заболевании

1190. [T016503] О ПРАВИЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА СУДЯТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ РУБЧИКА РАЗМЕРОМ

А) 5-8 мм

Б) 0-12 мм В) 2-3 мм

Г) 15-20 мм

1191. [T016504] ВАКЦИНУ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ХРАНЯТ В А) холодильнике Б) шкафу

В) сейфе

Г) контейнере

1192. [T016506] ВАКЦИНА БЦЖ ВВОДИТСЯ А) внутрикожно

Б) внутримышечно

В) подкожно

Г) внутривенно

1193. [T016507] ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ВВОДЯТ

А) анатоксин столбнячный

Б) АДСК

В) противостолбнячную вакцину

Г) пирогенал

1194. [T016508] ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН

А) холодильником

Б) сейфом

В) сухожаровым шкафом

Г) шкафом для дезинфицирующих растворов

1195. [T016509] ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ

А) 45 дней

Б) 15 дней

В) 30 дней

Г) 60 дней

1196. [T016510] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ

А) 1 месяца

Б) 2 месяцев

В) 6 месяцев

Г) 2 недель

1197. [T016511] К  
КОМБИНИРОВАННЫМ ВАКЦИНАМ  
ОТНОСИТСЯ

- А) «Бубо-М»
- Б) БЦЖ
- В) паротитная вакцина
- Г) коревая вакцина

1198. [T016512] ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ  
ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ  
А) БЦЖ

- Б) АКДС
- В) АДС – М Г) туберкулин

1199. [T016513] ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ  
АКДС, СОГЛАСНО КАЛЕНДАРЮ  
ПРИВИВОК, ПРОВОДИТСЯ В

- А) 3 месяца
- Б) 6 месяцев В) 7 месяцев
- Г) 5 месяцев

1200. [T016514] КЛИНИЧЕСКИМ  
ПРИЗНАКОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО  
ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение артериального давления
- Б) боль в суставах
- В) повышение артериального давления
- Г) эйфория

1201. [T016515]  
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) проведении прививок
- Б) проведении медицинских осмотров
- В) улучшении условий труда и отдыха
- Г) повышении материального  
благосостояния

1202. [T016516] ОТДЕЛЕНИЕ  
ПРОФИЛАКТИКИ ВХОДИТ В СОСТАВ  
А) поликлиники

- Б) стационара

В) диспансера

Г) родильного дома

1203. [T016518] МЕДИЦИНСКИЙ  
СКРИНИНГ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  
ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА И  
РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ  
А) профилактических медицинских  
осмотров

Б) привлечения населения к занятию  
физической культурой и спортом

В) проведения иммунопрофилактики

Г) проведения экологического и  
санитарно-гигиенического скрининга

1204. [T016521] НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ  
МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПРОВОДЯТ

- А) анкетирование
- Б) физикальные исследования
- В) лабораторные исследования
- Г) инструментальные исследования

1205. [T016523] ПОПУЛЯЦИОННАЯ  
СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) воздействием через средства массовой  
информации
- Б) ранней диагностикой заболеваний
- В) снижением факторов риска
- Г) выявлением лиц с высоким уровнем  
факторов риска

1206. [T016524] СТРАТЕГИЯ  
ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) ранней диагностикой заболеваний
- Б) выявлением лиц с высоким уровнем  
факторов риска
- В) снижением смертности
- Г) воздействием через средства массовой  
информации

1207. [Т016528] НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ  
ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ПРОВОДИТСЯ

- А) анкетирование
- Б) консультация врача хирурга
- В) сканирование брахицефальных артерий
- Г) консультация врача уролога

1208. [Т016529] НА ПЕРВОМ ГОДУ  
ЖИЗНИ ПЕДИАТР ПРОВОДИТ ОСМОТР  
РЕБЕНКА

- А) 1 раз в месяц
- Б) 2 раза в месяц
- В) 1 раз в полгода
- Г) 1 раз в 3 месяца

1209. [Т016530] ДЛЯ ОЦЕНКИ  
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  
ПРИМЕНЯЮТ

- А) 5 групп здоровья
- Б) 3 группы здоровья
- В) 4 группы здоровья
- Г) 7 групп здоровья

1210. [Т016531] ПЕРВЫЙ ОСМОТР  
РЕБЕНКА ВРАЧОМ НЕВРОЛОГОМ  
ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ

- А) 1 месяца
- Б) 3 месяцев
- В) 6 месяцев
- Г) 1 года

1211. [Т016532] НА ВТОРОМ ЭТАПЕ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- А) консультация врача хирурга
- Б) УЗИ органов брюшной полости
- В) маммография
- Г) флюорография легких

1212. [Т016533] ЛИЦА, У КОТОРЫХ НЕ  
УСТАНОВЛЕНЫ ХРОНИЧЕСКИЕ  
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И  
ИМЕЮТСЯ ФАКТОРЫ РИСКА ЭТИХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К А)  
второй группе здоровья

- Б) третьей группе здоровья
- В) первой группе здоровья
- Г) четвертой группе здоровья

1213. [Т016534] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  
ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в 3 года
- Б) 1 раз в 2 года
- В) 1 раз в 5 лет
- Г) 2 раза в год

1214. [Т016536] НА ВТОРОЙ ЭТАП  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
НАПРАВЛЯЮТСЯ НУЖДАЮЩИЕСЯ В  
А) дополнительном обследовании

- Б) уточнении диагноза
- В) углубленном профилактическом  
консультировании
- Г) лечении

1215. [Т016537] ВЫЯВЛЕНИЕ  
ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ  
ПОСРЕДСТВОМ

- А) анкетирования пациентов
- Б) проведением физикальных методов  
исследования
- В) проведением ряда лабораторных и  
инструментальных исследований
- Г) проведением ряда инструментальных  
исследований

1216. [Т016538] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  
ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- А) информированного добровольного  
согласия пациента или его законного  
представителя
- Б) направления врача

В) заключения врача

Г) только информированного добровольного согласия пациента

1217. [T016539] ПРИ ПОВЫШЕННОМ ВНУТРИГЛАЗНОМ ДАВЛЕНИИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К

А) врачу-офтальмологу

Б) врачу-оториноларингологу

В) врачу-неврологу

Г) врачу-акушер-гинекологу

1218. [T016540] ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К А) врачу-проктологу

Б) врачу-офтальмологу

В) врачу-неврологу

Г) врачу-оториноларингологу

1219. [T016541] ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЬЯМ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ

А) 15 лет

Б) 7 лет

В) 13 лет

Г) 10 лет

1220. [T016542] ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДЯТ

А) при поступлении на работу или учебу

Б) школьникам, студентам

В) для раннего выявления ряда заболеваний

Г) ежегодно

1221. [T016543] ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТ

А) школьникам, студентам

Б) при поступлении на работу или учебу В) всем лицам, обращающимся за медицинской помощью

Г) только работающей части населения

1222. [T016544] ВАКЦИНЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В

А) холодильнике при температуре от +2 до +8 Б) специально отведенном шкафу

В) сейфе

Г) кабинете участковой медицинской сестры

1223. [T016546] ПРИВИВКИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ

А) проживающим на территориях с высоким риском заражения

Б) согласно Национального календаря профилактических прививок

В) реконвалесцентам инфекционных заболеваний

Г) больным инфекционными заболеваниями

1224. [T016547] РЕАКЦИЮ МАНТУ У ДЕТЕЙ ПРОВОДЯТ НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА

А) 12 месяцев

Б) 15 лет

В) 1 месяца

Г) 3 месяцев

1225. [T016548] ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА ПРОВОДЯТ

А) при угрозе эпидемии гриппа

Б) больным гриппом

В) переболевшим гриппом

Г) выезжающим за границу страны

1226. [T016549] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСЕЛЕНИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

А) индивидуальная, групповая, популяционная

Б) индивидуальная и популяционная

В) индивидуальная и групповая

Г) только групповая

1227. [T016550] ОДНОЙ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) снижение потребления насыщенных жиров

Б) потребление 300 г фруктов в день

В) потребление более 5 г соли

Г) потребление рыбы, не менее 2 раз в месяц

1228. [T016551] МЕДИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

А) запрет въезда на неблагополучную территорию

Б) изоляцию больного

В) осмотр прибывших из неблагополучных регионов

Г) дезинфекцию помещений

1229. [T016552] МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

А) изоляцию больного

Б) запрет въезда на неблагополучную территорию

В) закрытие государственных границ

Г) введение особых правил государственных границ пересечения

1230. [T016553] НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

А) использование индивидуальных мер защиты

Б) вакцинацию

В) введение сывороток

Г) введение вакцин и сывороток

1231. [T016554] СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

А) введение вакцин

Б) мытье рук

В) проветривание помещений

Г) повышение общей сопротивляемости организма

1232. [T016555] ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗМЕ И СНИЖЕНИЕ РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) предболезнь

Б) болезнь

В) реабилитация

Г) заболеваемость

1233. [T016556] ПРОЦЕСС, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ВИДЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, НАЗЫВАЕТСЯ

А) болезнь

Б) адаптация

В) заболеваемость

Г) предболезнь

1234. [T016557] ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТСУТСТВУЮТ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К

А) I группе состояния здоровья

Б) II группе состояния здоровья

В) III группе состояния здоровья

Г) IV группе состояния здоровья

1235. [T016561] ОСНОВНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  
А) борьба с табакокурением

Б) соблюдение принципов рационального  
питания

В) адекватная физическая нагрузка

Г) борьба со стрессом

**1236. [T016562] ПЕРВИЧНАЯ  
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ  
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
ВКЛЮЧАЕТ**

А) соблюдение принципов здорового  
образа жизни

Б) консультирование по бесплодию

В) выявление заболеваний репродуктивной  
системы

Г) лечение бесплодия

**1237. [T016563] МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

А) употребление продуктов, богатых  
йодом

Б) употребление продуктов, богатых  
железом

В) ограничение в пищевом рационе белков

Г) ограничение употребления соли

**1238. [T016564] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И  
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИМ  
ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ  
НАЗЫВАЕТСЯ**

А) первичной профилактикой

Б) вторичной профилактикой

В) третичной профилактикой

Г) медицинской профилактикой

**1239. [T016565] УМЕНЬШЕНИЕ  
СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ ОТ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ**

А) вторичной профилактики

Б) первичной профилактики

В) третичной профилактики

Г) социальной профилактики

**1240. [T016566] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
РЕЦИДИВОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ  
НАБЛЮДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ**

А) вторичной профилактики

Б) организации специализированной  
медицинской помощи

В) первичной профилактики

Г) социальной профилактики

**1241. [T016567]  
ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ  
БЕШЕНСТВА ПРОВОДЯТ**

А) ветеринарам

Б) геологам

В) всему населения начиная с 10-летнего  
возраста

Г) всему населению начиная с 16-летнего  
возраста

**1242. [T016569] СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКОЙ ГРИППА  
ЯВЛЯЕТСЯ А) вакцинация**

Б) ношение лицевых масок

В) кварцевание помещений

Г) влажная уборка помещений

**1243. [T016570] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ИНФЕКЦИИ С АЭРОГЕННЫМ  
МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ  
НЕОБХОДИМО**

А) проветривать помещение

Б) строго соблюдать правила антисептики  
В) тщательно мыть овощи перед  
употреблением

Г) осуществлять борьбу с насекомыми

**1244. [T016571] ПРИ ВВЕДЕНИИ  
ВАКЦИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ А)  
активный искусственный иммунитет**

Б) пассивный искусственный иммунитет

В) активный естественный иммунитет

Г) стойкий иммунитет

1245. [T016572] ПРИ ВВЕДЕНИИ СЫВОРОТОК ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

А) пассивный приобретенный иммунитет

Б) активный искусственный иммунитет

В) активный естественный иммунитет

Г) стойкий иммунитет

1246. [T016573] ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ А) текущая

Б) заключительная

В) физическая

Г) профилактическая

1247. [T016574] ГРАЖДАНИН ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В УЧРЕЖДЕНИИ

А) первичной медико-санитарной помощи

Б) медицинском специализированном

В) социального обслуживания

Г) диспансерного обслуживания

1248. [T016576] ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ ПРОВЕДЕНИЯ

А) вторичной профилактики

Б) первичной профилактики

В) социальной профилактики

Г) популяционной профилактики

1249. [T016577] МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О А) рациональном питании населения

Б) приеме таблетированных витаминов В) ограничении двигательной активности

Г) наблюдении у эндокринолога

1250. [T016578] В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

А) ежемесячно

Б) еженедельно

В) 1 раз в два месяца

Г) 1 раз в полгода

1251. [T016579] НАУЧНОЙ ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ

А) факторов риска

Б) здорового образа жизни

В) борьбы с вредными привычками

Г) индивидуальной профилактики

1252. [T016580] К МЕТОДАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

А) режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела

Б) трехразовое обильное питание, гиподиномия

В) занятие с анаэробной физической нагрузкой

Г) ограничение физической нагрузки, прием биодобавок

1253. [T016581] ОСНОВНОЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) - ОТКАЗ ОТ А) курения и профилактика инфекционных болезней легких

Б) легкоусвояемой и высококалорийной пищи

В) применения медикаментозной терапии Г) вакцинации

1254. [T016582] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

А) отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, гиподинамии

Б) выявление и лечение рецидивов заболеваний

В) раннее выявление и устранение онкологических заболеваний

Г) профилактика повторного возникновения опухолей после лечения

1255. [T016583] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

А) выявление и устранение предраковых заболеваний

Б) нормализация массы тела

В) соблюдение диеты

Г) регулярная физическая активность

1256. [T016584] В ОЧАГЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДОИТЬ

А) ежедневный осмотр видимых слизистых оболочек и кожных покровов, термометрию у контактных

Б) замачивание посуды в дезинфицирующем растворе

В) бактериологическое обследование контактных

Г) введение контактным иммуноглобулина

1257. [T016585] В ОЧАГЕ СКАРЛАТИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ А) разобщение контактных и наблюдение за ними

Б) активную иммунизацию контактных

В) введение контактным иммуноглобулина

Г) бактериологическое обследование контактных

1258. [T016586] РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

А) пациентом на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры

Б) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок

В) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента

Г) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1259. [T016587] РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

А) законным представителем пациента (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры

Б) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок

В) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента

Г) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1260. [T016588] АСЕПТИКА – ЭТО

А) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану

Б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране

В) уничтожение болезнетворных микробов

Г) уничтожение всего живого

1261. [T016589] АНТИСЕПТИКА – ЭТО

А) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме

Б) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану

В) уничтожение болезнетворных микробов

Г) мероприятия по обеззараживанию помещений

1262. [T016590] К ФИЗИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ ОТНОСИТСЯ

А) дренирование раны

Б) промывание раны антисептиком

В) первичная хирургическая обработка раны

Г) удаление некротических тканей из раны

1263. [T016591] СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ЭТО

А) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих

Б) уничтожение патогенных микробов

В) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов

Г) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения

1264. [T016592] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗаторе СОСТАВЛЯЕТ

А) 180° С - 1 час

Б) 200° С - 40 мин

В) 180° С - 3 часа

Г) 120°C - 40 мин

1265. [T016593] К ЭНДОГЕННОМУ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ ОТНОСИТСЯ

А) лимфогенный

Б) воздушно-капельный

В) воздушно-пылевой

Г) контактный

1266. [T016594] ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ

А) парентеральным

Б) воздушно-капельным

В) алиментарным

Г) воздушно-пылевым

1267. [T016598] ПРИЧИНА ИММУНОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ВИЧИНФЕКЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

А) поражении Т-лимфоцитов

Б) поражении В-клеток

В) поражении эритроцитов

Г) поражение моноцитов

1268. [T016599] ДЕЗИНСЕКЦИЯ - ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ

А) клещей

Б) грызунов

В) вирусов

Г) патогенных микроорганизмов

1269. [T016600] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) химический

Б) термический

В) механический

Г) комбинированный

1270. [T016601] ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОДИТСЯ

А) дезинфекция + предстерилизационная очистка + стерилизация

Б) дезинфекция

В) дезинфекция + предстерилизационная очистка

Г) стерилизация

1271. [Т016602] К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ОТНОСЯТ

А) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание или осложнение, у пациентов или медицинских работников, связанное с оказанием любых видов медицинской помощи

Б) любое инфекционное заболевание, возникшее в стационаре

В) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, с которым пациент поступил в стационар

Г) инфекцию, передающуюся половым путем

1272. [Т016603] СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

А) половой

Б) алиментарный

В) воздушно-капельный

Г) трансмиссивный

1273. [Т016604] ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

А) СанПиН 2.1.3 2630-2010

Б) Трудовой кодекс Российской Федерации

В) Конституция Российской Федерации

Г) Этический Кодекс медицинской сестры России

1274. [Т016605] К УНИВЕРСАЛЬНЫМ МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ ПРАВИЛО

А) считать каждого пациента потенциально инфицированным

Б) мытья рук перед выполнением инвазивных манипуляций

В) мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами

Г) использование антисептика для рук после инъекции

1275. [Т016606] ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЫТЬЕ РУК

А) под проточной водой с мылом

Б) достижения стерильности кистей рук на определенное время

В) под проточной водой с мылом с последующим одеванием перчаток

Г) антисептиком

1276. [Т016607] ЦСО - ЭТО А) центральное стерилизационное отделение

Б) центральное специализированное отделение

В) централизованное специализированное отделение

Г) центральное стерильное отделение

1277. [Т016608] ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ

А) физическому

Б) механическому

В) химическому

Г) комбинированному

1278. [Т016609] К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

А) полное погружение в дезинфицирующий раствор

Б) пароформалиновый метод

В) паровоздушный метод

Г) газовый метод

1279. [T016610] ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР ПРОВОДИТСЯ

А) очаговая заключительная дезинфекция

Б) текущая дезинфекция

В) профилактическая дезинфекция

Г) очаговая текущая дезинфекция

1280. [T016611] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

А) один раз в неделю

Б) два раза в неделю

В) один раз в две недели

Г) один раз в месяц

1281. [T016612] ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

А) после окончания работы

Б) 1 раз в месяц

В) 2 раза в неделю

Г) 1 раз в неделю

1282. [T016613] ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩАЮТ В ПАКЕТЫ

А) желтого цвета

Б) белого цвета

В) красного цвета

Г) черного цвета

1283. [T016614] ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ А) удаления дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и др. загрязнений

Б) дезинфекции

В) удаления белковых загрязнений

Г) удаления лекарственных средств

1284. [T016615] ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБА

А) амидопириновая

Б) с суданом-3

В) с суданом-4

Г) фенолфталеиновая

1285. [T016616] ЦЕЛЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА

А) профилактика профессионального заражения

Б) обеспечение кратковременной стерильности

В) создание продолжительной стерильности

Г) удаление бытового загрязнения

1286. [T016617] ПРОВЕДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ

А) средств биологического происхождения

Б) первичной хирургической обработки ран

В) дренирования ран

Г) обработки ран с 3% раствором перекиси водорода

1287. [T016618] САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛЬНОСТИ А) бактериологический

Б) биологический

В) физический Г) химический

1288. [T016619] К ИСКУССТВЕННОМУ (АРТИФИЦИАЛЬНОМУ) ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

А) медицинский: через кровь и ее компоненты, руки медперсонала, инструменты, перевязочный материал

Б) трансмиссивный

В) контактно-бытовой

Г) аэрозольный

1289. [T016620] САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

А) посева на питательные среды

Б) использования химических индикаторов

В) использования биологических индикаторов

Г) использования физических индикаторов

1290. [T016621] УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСИТ ОТ А) характера манипуляции

Б) вида используемых антисептиков

В) наличия перчаток

Г) степени загрязнения

1291. [T016622] МЕХАНИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА ЭТО

А) удаление из раны нежизнеспособных тканей

Б) дренирование раны марлевым тампоном

В) промывание раны раствором водорода пероксида

Г) наложение давящей повязки

1292. [T016623] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

А) трансмиссивный

Б) фекально-оральный

В) воздушно-капельный

Г) половой

1293. [T016624] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ГРИППА

А) воздушно-капельный

Б) фекально-оральный

В) трансмиссивный

Г) половой

1294. [T016625] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

А) фекально-оральный

Б) воздушно-капельный

В) трансмиссивный

Г) половой

1295. [T016626] ЧЕРЕЗ ГРУДНОЕ МОЛОКО МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ВОЗБУДИТЕЛЬ

А) ВИЧ-инфекции (СПИДа)

Б) холеры

В) бешенства

Г) коклюша

1296. [T016627] HELYCOBACTER PYLORI ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

А) язвенной болезни желудка

Б) бронхоэктатической болезни

В) гипертонической болезни

Г) желчекаменной болезни

1297. [T016631] ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

А) шерсть животных

Б) пищевые красители

В) лекарственные препараты

Г) моющие средства

1298. [T016632] ВДЫХАНИЕ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА В ВИДЕ

А) сенной лихорадки (поллиноза)

Б) контактного дерматита

В) гемолитической анемии

Г) гранулематозного воспаления

1299. [T016635] ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА У МУЖЧИН НАЧИНАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ С

А) периода полового созревания

Б) момента рождения

В) 7 лет

Г) 18 лет

1300. [T016636] К ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ОТНОСИТСЯ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ

А) париетальным и висцеральным листками плевры

Б) легким и перикардом

В) плеврой и перикардом

Г) листками плевры

1301. [T016637] В СЕРДЦЕ МЕЖДУ ЛЕВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ЛЕВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ РАСПОЛОЖЕН

А) двустворчатый клапан

Б) трехстворчатый клапан

В) полуулунный клапан

Г) четырехстворчатый клапан

1302. [T016638] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ПЛАНИРУЮТ ДЛЯ ГРАЖДАН

А) 39 лет и старше

Б) 30 лет и старше

В) 36 лет и старше

Г) 40 лет и старше

1303. [T016642] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

А) 1 раз в 3 года

Б) 1 раз в год

В) 1 раз в 2 года Г) 1 раз в 5 лет

1304. [T016643] ОБЯЗАННОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

А) работодателя

Б) медицинские организации

В) инженера по охране труда

Г) инженера по технике безопасности

1305. [T016644] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

А) 280 дней

Б) 320 дней

В) 250 дней

Г) 380 дней

1306. [T016645] РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД ЖЕНЩИНЫ ВКЛЮЧАЕТ ПЕРИОД

А) наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка

Б) полового созревания

В) угасания детородной функции

Г) полового покоя

1307. [T016646] В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ ДЕВОЧКИ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

А) активно развивается

Б) полностью развита

В) находится в состоянии покоя

Г) угасает

1308. [T016647] ЖЕНЩИНЕ ПОСЛЕ РОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЖИТЬ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ В ТЕЧЕНИЕ

А) 1,5-2-х месяцев

Б) 10-ти дней В) 2-х недель

Г) 3-х недель

1309. [T016648] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ А) несоблюдение правил личной гигиены

Б) аномалия развития В) переохлаждение

Г) умеренная физическая активность

1310. [T016649] К ПРОЯВЛЕНИЮ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИНЫ ОТНОСИТСЯ

А) нарушение менструального цикла

Б) увеличение веса

В) боль в животе

Г) снижение аппетита

1311. [T016650] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ МЕНСТРУАЦИИ У ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЕТ

А) 7-8 дней

Б) 6-10 дней

В) 3-5 дней

Г) 1-2 дня

1312. [T016652] ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ЯВЛЯЕТСЯ

А) множество лечебно-диагностических процедур

Б) возраст человека

В) антропометрические показатели

Г) пол человека

1313. [T016653] НАРУШЕНИЕ АСЕПТИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЬЕКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

А) абсцессу

Б) некрозу окружающей ткани

В) воздушной эмболии

Г) аллергической реакции

1314. [T016654] МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ В МЕСТАХ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ

А) профилактическую дезинфекцию

Б) заключительную дезинфекцию

В) предстерилизационную очистку

Г) очаговую дезинфекцию

1315. [T016655] ВАЖНЫМ ЭТАПОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ И ИНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) оценка факторов риска в своей работе

Б) ежегодное обследование

В) обследование всех пациентов

Г) уклонение от работы с инфицированными пациентами

1316. [T016656] К ВОЗМОЖНЫМ ПУТЬЯМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТСЯ

А) случайные уколы и порезы при инвазивных процедурах

Б) приём пищи из одной посуды, посещение мест общего пользования

В) укусы насекомых

Г) рукопожатия, поцелуй в щеку

1317. [T016657] УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НАЗЫВАЕТСЯ

А) дезинфекцией

Б) дезинсекцией

В) дератизацией

Г) стерилизацией

1318. [T016659] ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), СПОСОБСТВУЮТ

А) тщательное соблюдение личной гигиены медицинским персоналом  
Б) использование дезинфицирующих средств в возможно больших концентрациях

В) широкое применение антибиотиков  
Г) сокращение штатных единиц в медицинской организации

1319. [T016660] ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКИХ, АКУШЕРСКИХ, РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ И НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ

А) 1 раз в день  
Б) 1 раз в 2 дня  
В) 1 раз в неделю Г) 2 раза в неделю

1320. [T016661] ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЖИТ А) дезинфекции

Б) промыванию  
В) проветриванию  
Г) уничтожению

1321. [T016662] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ

А) 1 раз в неделю  
Б) 2 раза в месяц  
В) 2 раза в неделю  
Г) 1 раз в месяц

1322. [T016663] САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЭТО

А) комплекс организационных и санитарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала

Б) комплекс мероприятий, направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов

В) меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях

Г) строгое соблюдение и регулярный контроль над выполнением требований асептики и антисептики

1323. [T016664] ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

А) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека

Б) источника инфекции, механизмов передачи

В) источника инфекции

Г) источника инфекции и восприимчивого человека

1324. [T016665] ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЮТСЯ

А) условно-патогенные микроорганизмы

Б) бактерии, которые свободно живут в окружающей среде

В) вирусы

Г) платяные вши

1325. [T016666] ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

А) на 4-5 день жизни

Б) в 1-й день жизни

В) в 1-й месяц жизни

Г) в 3 месяца жизни

1326. [T018267] ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ – ЭТО

- А) состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
- Б) динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации, средство жизни
- В) состояние полного физического благополучия
- Г) отсутствие болезней

**1327. [T018268] ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ**

- А) помогают в эмоциональной разгрузке медицинской сестры
- Б) мешают профессиональной деятельности
- В) наносят вред здоровью медицинской сестры
- Г) не поощряются руководством медицинских организаций

**1328. [T018269] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ**

- А) личную ответственность индивидуума
- Б) координацию усилий всех служб отрасли
- В) ответственность семьи за здоровье каждого ее члена Г) заботу работодателя о каждом работнике

**1329. [T018270] ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- А) ограничение животных жиров с частичной заменой на растительные жиры
- Б) цельные молочные продукты
- В) субпродукты
- Г) колбасы высокой жирности

**1330. [T018271] ЗДОРОВЫМ ПИТАНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО А) 400-500 г фруктов и овощей (не считая картофеля)**

- Б) до 1 л цельных молочных продуктов

В) 500 г мясных субпродуктов

Г) 200 г жирного мяса

**1331. [T018272] ПРИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ НЕОБХОДИМО**

А) ввести в режим дня регулярные умеренные физические нагрузки

Б) исключить физические нагрузки

В) порекомендовать участвовать в спортивных соревнованиях

Г) отказаться от любых видов спорта

**1332. [T018273] НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ**

А) соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи

Б) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

В) умеренно повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки

Г) составляет более 30 тысяч шагов в сутки вне помещения

**1333. [T018274] ДОЗИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ**

А) умеренно повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки

Б) соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи

В) составляет более 30 тысяч шагов в сутки вне помещения

Г) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания»)

**1334. [T018275] ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ**

А) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает

появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания»).

Б) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

В) соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи

Г) несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки

**1335. [T018276] БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ХОЛЕСТЕРИНА СОДЕРЖАТ**

А) яйца, икра из рыб

Б) крупы, бобовые

В) овощи, фрукты

Г) рыба, ягоды

**1336. [T018277] У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СНИЖАЕТСЯ** А) слух, зрение

Б) болевая чувствительность

В) абстрактность мышления

Г) целостность восприятия

**1337. [T018278] ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО**

А) почками

Б) легкими

В) кожей

Г) желудочно-кишечным трактом

**1338. [T018279] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ**

А) убедить подростка и его окружение, что употребление алкоголя не является признаком взрослости

Б) направить подростка на цикл лекций о вреде алкоголизма

В) при встрече с подростком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сделать ему внушение о вреде алкоголя

Г) публично высмеять подростка после алкогольного эксцесса

**1339. [T018280] К ЧИСЛУ СОЦИАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ТОКСИКОМАНИЙ МОЖНО ОТНЕСТИ** А) злоупотребление чаем и кофе

Б) употребление галлюциногенов

В) злоупотребление слабоалкогольными напитками

Г) табакокурение

**1340. [T018281] САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЯИЧЕК ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

А) раннего выявления опухолей

Б) определения достижения половой зрелости

В) сравнения с нормальными размерами

Г) выявления аномалий развития

**1341. [T018282] ГИПОДИНАМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ** А) пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий

Б) уменьшением подвижности

В) уменьшением объема движений

Г) увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий

**1342. [T018283] ГИПОКИНЕЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ** А) уменьшением подвижности

Б) пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий

В) уменьшением объема движений

Г) увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий

**1343. [T018284] АДЕКАВТАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ**

А) повышение тонуса мышц, усиление мышц

Б) перестройку жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани В) уменьшение потребности в пище

Г) снижение приспособительных и компенсаторных реакций

**1344. [T018285] ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ**

А) поддержанию обмена веществ на оптимальном уровне

Б) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани

В) уменьшению потребности в пище

Г) снижению приспособительных и компенсаторных реакций

**1345. [T018286] ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СПОСОБСТВУЮТ**

А) большей устойчивости организма к стрессам

Б) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани

В) уменьшению потребности в пище

Г) снижению приспособительных и компенсаторных реакций

**1346. [T018287] ДОКОРМ ПРИ СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ДАЕТСЯ**

А) только до кормления грудью

Б) независимо от кормления грудью

В) только после кормления грудью

Г) вместо кормления грудью

**1347. [T018288] ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В**

А) развитии молочных желез

Б) задержке в организме жидкости

Г) стимуляции роста матки

**1348. [T018289] ДЕЙСТВИЕ ЭСТРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В**

А) развитии молочных желез

Б) развитии мускулатуры

В) росте волос на лобке и в подмышечных впадинах

Г) повышении уровня холестерина в крови

**1349. [T018290] ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ МУЖЧИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В**

А) формировании вторичных половых признаков

Б) снижении порога болевой чувствительности

В) увеличении грудных желез в периоде полового созревания

Г) формировании вкусовых ощущений

**1350. [T018291] НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ**

А) применение ингаляторов с бронхолитиками

Б) создание вынужденного положения в постели

В) проведение щелочно-масляных ингаляций

Г) применение горчичных обертываний

**1351. [T018292] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ УРЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ОТНОСИТСЯ**

А) запах мочевины изо рта

Б) запоры

В) румянец на щеках

Г) запах ацетона изо рта

**1352. [T018293] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПERTОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТСЯ**

- А) головная боль, головокружение, пелена перед глазами
- Б) кровохарканье, сердцебиение, одышка
- В) изжога, рвота, шум в ушах
- Г) отрыжка, слабость, метеоризм

**1353. [T018294] ПРИ ГИПERTОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПРАКТИКУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ**

- А) эналаприлата
- Б) анальгина
- В) глюкозы
- Г) дигоксина

**1354. [T018295] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) снижение артериального давления, частый нитевидный пульс, резкая слабость
- Б) приступ удушья, сердцебиение, слабость
- В) головокружение, тахикардия, головная боль
- Г) лихорадка, слабость, боль в грудной клетке

**1355. [T018296] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ НУЖНО**

- А) уложить с приподнятым ножным концом
- Б) ввести внутривенно эуфиллин
- В) дать нитроглицерин под язык
- Г) уложить с приподнятым головным концом

**1356. [T018297] ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА НЕОБХОДИМО**

А) ввести дицинон, аминокапроновую кислоту

Б) дать пузырь со льдом

В) ввести спазмолитики

Г) оказать помощь при рвоте

**1357. [T018298] РЕАНИМАЦИЯ ПАЦИЕНТУ ПОКАЗАНА**

- А) при внезапно развившихся терминальных состояниях
- Б) в каждом случае смерти пациента В) только при внезапной смерти молодых пациентов и детей
- Г) только при внезапной смерти у пожилых больных

**1358. [T018299] ПРИЗНАКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) сужение зрачков
- Б) пульсация на сонной артерии во время массажа сердца
- В) движение грудной клетки во время ИВЛ
- Г) расширение зрачков

**1359. [T018300] ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ С**

- А) прекращения воздействия электрического тока
- Б) непрямого массажа сердца
- В) искусственной вентиляции легких
- Г) прекардиального удара

**1360. [T018301] НА ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАКЛАДЫВАЕТСЯ**

- А) сухая стерильная повязка
- Б) повязка с фурацилином
- В) повязка с синтомициновой эмульсией
- Г) повязка с раствором бикарбоната натрия

1361. [T018302] ДЛЯ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ

- А) кратковременной потери сознания
- Б) отсутствия реакций на внешние раздражители
- В) длительной потери сознания
- Г) снижения рефлексов

1362. [T018303] ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ПАЦИЕНТА В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ НА

- А) боку
- Б) спине с опущенным головным концом
- В) спине с опущенным ножным концом
- Г) животе

1363. [T018304] ПАЦИЕНТЫ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ НАЛИЧИИ У НИХ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ НА

- А) спине на щите
- Б) боку на обычных носилках
- В) животе на обычных носилках
- Г) боку на щите

1364. [T018305] ШОКОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) острыя сердечно-сосудистая недостаточность
- Б) острые повышение тонуса периферических сосудов
- Г) острые недостаточность по малому кругу кровообращения

1365. [T018306] ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ПРОИЗОШЕЛ ВЫБРОС ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕГО ИСПАРЕНИЕ В АТМОСФЕРУ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) очагом химического заражения

Б) зоной химического заражения

В) территорией биологического заражения

Г) точкой радиационного заражения

1366. [T018307] ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ

А) сидя

Б) лежа на здоровом боку

В) лежа на больном боку

Г) лежа на спине

1367. [T018308] ПАЦИЕНТ С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ

- А) во всех случаях при тяжелой форме
- Б) в удовлетворительном состоянии
- В) для периодического наблюдения
- Г) для промывания желудка

1368. [T018309] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВЫВИХАХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) иммобилизацию, обезболивание, госпитализацию
- Б) вправление вывиха
- В) госпитализацию в травмпункт
- Г) обезболивание и госпитализацию

1369. [T018310] ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сдавление внутренних органов при землетрясениях и других повреждающих факторах

Б) небольшие ожоги

В) хронический гломерулонефрит

Г) хронический цистит

1370. [T018311] ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМ

- А) нитроглицерин под язык

Б) димедрол подкожно

В) астмопент ингаляционно

Г) лидокаин внутривенно

1371. [T018312] ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ОПИАТОВ В КАЧЕСТВЕ АНТАГОНИСТА ПРИМЕНЯЮТ

А) налоксон

Б) кордиамин

В) мексидол

Г) гидрокортизон

1372. [T018313] РЕАНИМАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПОКАЗАНА ПРИ

А) внезапном наступлении клинической смерти

Б) остановке сердца в течение одного часа

В) обмороке

Г) биологической смерти

1373. [T018314] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ НЕОБХОДИМО

А) напоить сладким чаем

Б) ввести дибазол

В) ввести инсулин

Г) напоить отваром шиповника

1374. [T018315] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОТНОСЯТСЯ

А) чувство голода, потливость

Б) боли в области сердца, одышка

В) одышка, сухой кашель

Г) отеки, головная боль

1375. [T018316] ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

А) пузырем со льдом на живот

Б) внутримышечным введением викасола

В) внутривенным введением хлористого кальция

Г)введением анальгетиков

1376. [T018317] ВЫИНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

А) сидя, с упором на руки

Б) горизонтальное с приподнятыми ногами

В) горизонтальное

Г) лежа на боку

1377. [T018318] ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА, ВЫИНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СУХИЕ, СВИСТАЩИЕ ХРИПЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

А) приступа бронхиальной астмы

Б) сердечной астмы

В) тромбоэмболии легочной артерии

Г) пневмоторакса

1378. [T018319] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ СТЕНОКАРДИИ ОТНОСИТСЯ А) сжимающая, давящая боль

Б) слабость

В) одышка

Г) тошнота

1379. [T018320] ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИРУЮЩАЯ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

А) инфаркте миокарда

Б) ревмокардите

В) остеохондрозе

Г) стенокардии

1380. [T018321] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ ЗАГРУДИННОЙ БОЛИ НЕОБХОДИМО

- А) дать нитроглицерин под язык
- Б) ввести морфина гидрохлорид
- В) ввести анальгин в/м
- Г) дать димедрол внутрь

1381. [T018322] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
- Б) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
- В) колющая боль в области сердца
- Г) ноющая боль в области сердца

1382. [T018323] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс
- Б) резкое повышение артериального давления, напряженный пульс
- В) лихорадка, рвота
- Г) приступ удушья, ортопноэ

1383. [T018324] ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО

- А) вызвать врача
- Б) обеспечить больному полный покой
- В) поставить банки, горчичники Г)
- проводить оксигенотерапию

1384. [T018325] ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) сидя с упором на руки
- Б) с приподнятым ножным концом
- В) на боку
- Г) горизонтальное

1385. [T018326] ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ВЫРАЖЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО А) чаще поить пациента

- Б) вводить препараты крови внутривенно
- В) вводить жаропонижающие препараты
- Г) вводить антибиотики

1386. [T018327] К РАЗВИТИЮ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИВОДИТ

- А) спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты
- Б) повышение давления в малом круге кровообращения
- В) отек гортани
- Г) воспаление плевральных листков

1387. [T018328] К ОСЛОЖНЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

- А) кардиогенный шок
- Б) одышка
- В) артрит
- Г) повышение артериального давления

1388. [T018329] ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ БОЛЬНОЙ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ

- А) облегчения самочувствия
- Б) проведения диагностических мероприятий
- В) физиологического сна
- Г) проведения гигиенических мероприятий

1389. [T018330] ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

- А) защитить пациента от психофизических страданий и болей
- Б) оградить пациента от родственников
- В) ускорить процесс умирания

Г) оградить пациента от проблем

1390. [T018331] ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ  
А) проблема борьбы с болью

Б) нарушение сна

В) невозможность трудиться

Г) недостаточность общения

1391. [T018332] ПРИНУЖДЕНИЕ К ИЗЪЯТИЮ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

А) не допускается ни при каких обстоятельствах

Б) допускается по решению суда

В) допускается в интересах реципиента

Г) допускается по решению врачебной комиссии

1392. [T018333] В ОТНОШЕНИИ ИЗЪЯТИЯ ДОНОРСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ ТРУПА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЕТ МОДЕЛЬ

А) презумпции согласия

Б) презумпции несогласия

В) презумпции отказа

Г) комбинированная

1393. [T018334] ТОРГОВЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ И ТКАНЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А) запрещена под угрозой уголовного наказания

Б) разрешена без ограничений

В) разрешена в исключительных случаях

Г) разрешена по решению суда

1394. [T018335] КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ПОСРЕДСТВОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И ВМЕШАТЕЛЬСТВА, НОСИТ НАЗВАНИЕ

А) евгеника

Б) геномика

В) молекулярная биотехнология

Г) геномная медицина

1395. [T018336] ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ДОПУСКАЕТСЯ

А) по решению суда

Б) по решению лечащего врача

В) по решению законного представителя

Г) по желанию пациента

1396. [T018337] К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

А) липопротеидов низкой плотности

Б) липопротеидов высокой плотности

В) креатинина

Г) билирубина

1397. [T018338] ТЕРРЕНКУРОМ НАЗЫВАЕТСЯ

А) лечение дозированным восхождением

Б) ходьба по трафарету

В) ходьба перед зеркалом

Г) прогулки по ровной местности

1398. [T018339] ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ ВОПРОСЫ СЛЕДУЕТ ЗАДАВАТЬ

А) тактично, давая пациенту время на ответы

Б) быстро, чтобы за короткое время принять как можно больше пациентов

В) строго по протоколу

Г) настойчиво и резко

1399. [T018340] В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ

- А) поваренную соль
- Б) сахар
- В) специи
- Г) растительные жиры

1400. [T018341] АЛАЯ КРОВЬ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЁЙ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ

- А) артериальном
- Б) паренхиматозном
- В) капиллярном
- Г) венозном

1401. [T018342] ДОСТОВЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМ

- А) появления трупных пятен
- Б) прекращения дыхания
- В) снижения температуры кожи ниже 20°C
- Г) прекращения сердечной деятельности

1402. [T018343] НЕОБРАТИМЫМ ЭТАПОМ УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) биологическая смерть
- Б) клиническая смерть
- В) агония
- Г) преагония

1403. [T018344] ПРОЦЕСС ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) консультированием
- Б) психологическим тренингом
- В) индивидуальной беседой
- Г) реабилитацией

1404. [T018345] В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ОТЕКАМИ ОПРЕДЕЛЯЮ

- А) суточный водный баланс
- Б) температуру тела
- В) частоту дыхательных движений
- Г) артериальное давление

1405. [T018346] ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕН

- А) крестец

- Б) висок
- В) грудная клетка
- Г) предплечье

1406. [T018347] ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ МОЧЕВОГО КАТЕТЕРА В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО

- А) подмыть пациента
- Б) измерить температуру тела
- В) измерить артериальное давление
- Г) обработать кожу промежности йодопироном

1407. [T018348] ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НОВООБРАЗОВАНИЕ НАЧИНАЮТ С

- А) маммографии
- Б) флюорографии
- В) самообследования
- Г) пункционной биопсии

1408. [T018349] К ВИДАМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

- А) консультативная помощь
- Б) диспансеризация
- В) скорая помощь
- Г) радикальная операция

1409. [T018350] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ НЕОБХОДИМО

- А) напоить сладким чаем
- Б) ввести дибазол
- В) ввести инсулин
- Г) напоить отваром шиповника

1410. [T018351] ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ

- А) непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своей трудовой деятельности
- Б) после прохождения работником испытательного срока
- В) по окончании первого трудового дня
- Г) по распоряжению руководителя медицинской организации

1411. [T018352] ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ

- А) не реже одного раза в полгода
- Б) не реже одного раза в год
- В) не реже одного раза в два года
- Г) ежемесячно

1412. [T018353] ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ИЛИ СТАНДАРТОВ, ПРАВИЛ, ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ А) внеплановый

- Б) первичный
- В) повторный
- Г) вводный

1413. [T018354] ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ

- А) внеплановый
- Б) первичный
- В) повторный
- Г) вводный

1414. [T018355] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ

- А) внеплановый
- Б) первичный
- В) повторный
- Г) вводный

1415. [T018356] В ОЧАГЕ КОРИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ А) проветривание и влажную уборку помещения

- Б) дезинфекцию игрушек
- В) замачивание посуды в дезинфицирующем растворе
- Г) бактериологическое обследование контактных

1416. [T018357] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ У ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО

- А) сохранить врачебную тайну
- Б) предупредить всех людей, имевших с ним контакт
- В) назначить принудительное лечение
- Г) сообщить в правоохранительные органы

1417. [T018358] МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ

- А) доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей

Б) все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность

В) весь медицинский персонал

Г) лица любой профессии перед трудоустройством

**1418. [T018359] В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ ДОНОРА, ЕСЛИ ДОНОР**

А) умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов

Б) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение

В) гражданин иностранного государства

Г) психически неполноценный человек

**1419. [T018360] ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЖИВОГО ДОНОРА ИЛИ ТРУПА ПРИМЕНЯЕТСЯ**

А) в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни

Б) по решению главного врача

В) по решению лечащего врача

Г) по желанию пациента

**1420. [T018361] НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИОМЕХАНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

А) остеохондрозу

Б) сколиозу

В) лордозу

Г) кифозу

**1421. [T018362] ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ТЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОЗВОЛЯЕТ**

А) предотвращать у себя травмы позвоночника

Б) поддерживать равновесие

В) предупреждать пролежни у пациента

Г) исключать дискомфорт

**1422. [T018363] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ**

А) убрать подушку и одеяло

Б) слегка наклониться назад

В) наклониться вперед

Г) слегка присесть

**1423. [T018364] ДЛЯ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПРОДОЛЬНЫМ СПОСОБОМ ПАЦИЕНТУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ НА СТРОГОМ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ**

А) на боку

Б) «Симса»

В) на спине

Г) на животе

**1424. [T018365] ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПОЛОЖЕНИЕ СПИНЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДОЛЖНО БЫТЬ**

А) прямым

Б) с наклоном вперед

В) с наклоном влево

Г) с наклоном вправо

**1425. [T018366] ПОДСЧЕТ АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ**

А) на лучевой артерии

Б) на аорте

В) на тыльной артерии стопы

Г) на височной артерии

**1426. [T018367] В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПУЛЬС СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

А) 60 – 80

Б) 85 – 90

В) 55 – 60

Г) 100 – 120

1427. [T018368] УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА БОЛЕЕ 85 – 90 УДАРОВ В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

А) тахикардией

Б) брадикардией

В) гипертонией

Г) асистолией

1428. [T018369] АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

А) давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца и зависит от сложной нервно-гуморальной регуляции, величины и скорости сердечного выброса, частоты и ритма сердечных сокращений и сосудистого тонуса

Б) давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца

В) величина и скорость сердечного выброса

Г) частота и ритм сердечных сокращений

1429. [T018370] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ А) разницу между систолическим и диастолическим давлением

Б) сумму систолического и диастолического давления

В) частоту сердечных сокращений

Г) давление, возникающее в артериях в момент максимального подъема пульсовой волны после систолы желудочков

1430. [T018371] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ ММ РТ. СТ.

А) 30 – 50

Б) 10 – 20

В) 60 – 70

Г) 20 – 40

1431. [T018372] СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫШЕ 140/ 90 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

А) артериальной гипертензией

Б) артериальной гипотензией

В) пульсовым давлением

Г) систолическим давлением

1432. [T018373] АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ 90/60 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

А) артериальной гипотензией или гипотонией

Б) пульсовым давлением

В) артериальной гипертензией или гипертонией

Г) систолическим давлением

1433. [T018374] ЧАСТОТОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ (ЧДД) НАЗЫВАЕТСЯ

А) количество циклов вдох-выдох за 1 минуту

Б) чередование вдоха и выдоха

В) количество выдохов за 1 минуту

Г) количество вдохов за 1 минуту

1434. [T018375] У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НОРМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ В МИНУТУ

А) 16 – 20

Б) 12 – 16 В) 40 – 45

Г) 30 – 35

1435. [T018376] КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ МЕНЬШЕ 16 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

А) брадипноэ

Б) тахипноэ В) ортопноэ

Г) апноэ

1436. [T018377] КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ БОЛЬШЕ 20 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

А) тахипноэ

Б) ортопноэ

В) брадипноэ

Г) апноэ

1437. [T018378] ОДЫШКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

А) расстройство ритма и глубины дыхания

Б) расстройство глубины дыхания

В) расстройство ритма дыхания

Г) количество вдохов в 1 минуту

1438. [T018379] ИНСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) дыхание с затрудненным вдохом

Б) дыхание с затрудненным выдохом

В) дыхание с затрудненным вдохом и выдохом

Г) удушье

1439. [T018380] ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) дыхание с затрудненным выдохом

Б) дыхание с затрудненным вдохом

В) дыхание с затрудненным вдохом и выдохом

Г) приступ удушья

1440. [T018381] СУТОЧНЫМ ДИУРЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ А) общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток Б) процесс образования и выделения мочи

В) общее количество введенной в организм жидкости за сутки

Г) соотношение между количеством введенной в организм жидкости и количеством выделенной жидкости из организма в течение суток

1441. [T018382] СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ

А) от 800 мл до 2000 мл

Б) от 200 мл до 500 мл

В) от 500 мл до 800мл

Г) от 2000 мл до 3000мл

1442. [T018383] ЗАВИСИМЫЙ ТИП СЕСТРИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

А) инъекции антибиотиков

Б) проведение утренних гигиенических процедур

В) профилактика пролежней

Г) рекомендации по рациональному питанию

1443. [T018384] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОВОДИТ

А) обучение пациента элементам самоухода

Б) инъекции анальгетиков

В) предоперационная подготовка пациента  
Г) инъекции антибиотиков

1444. [T018385] К ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

А) измерение давления

Б) выявление проблем пациента

В) представление пациента о своем здоровье

Г) беседа с родственниками

1445. [T018386] ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

А) экспираторная одышка

Б) одышка смешанного характера

В) инспираторная одышка

Г) кашель с выделением пенистой мокроты

1446. [T018387] ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ГНОЙНОЙ МОКРОТЫ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

А) индивидуальной плевательницей

Б) сухой банкой

В) стерильной банкой

Г) стерильной пробиркой

1447. [T018388] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ИСХОДОМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А) порок сердца Б) атеросклероз

В) пиелонефрит

Г) выздоровление

1448. [T018389] СИНЮШНЫМ ОКРАШИВАНИЕМ ГУБ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ

А) цианоз

Б) иктеричность

В) акроцианоз

Г) гиперемия

1449. [T018390] ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИДАЕТСЯ ПАЦИЕНТУ ДЛЯ

А) облегчения отхождения мокроты

Б) расширения бронхов

В) уменьшения одышки

Г) снижения лихорадки

1450. [T018391] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПERTОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМО А) избегать психоэмоциональных перегрузок

Б) санировать очаги хронической инфекции

В) избегать переохлаждений Г) увеличить физическую нагрузку

1451. [T018392] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) давящая боль за грудиной

Б) слабость

В) одышка

Г) сердцебиение

1452. [T018393] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

А) атеросклероз коронарных артерий

Б) порок сердца

В) ревматический эндокардит

Г) вирусный миокардит

1453. [T018394] ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) бета-гемолитический стрептококк группы А

Б) золотистый стафилококк

В) вирус краснухи

Г) риккетсия

1454. [T018395] К РАЗВИТИЮ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ

А) очаг хронической инфекции

Б) нерациональное питание

В) гиподинамия

Г) стресс

1455. [T018396] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

А) остшая ревматическая лихорадка

Б) гипертоническая болезнь

В) инфаркт миокарда

Г) стенокардия

1456. [T018397] К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСИТСЯ

- А) головная боль
- Б) асцит
- В) лихорадка
- Г) отеки

1457. [T018398] ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОКАРДИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКИЕ ПРЕПАРАТЫ, КАК

- А) нитраты, бета - адреноблокаторы, антагонисты кальция
- Б) анальгетики, наркотики, нейролептики
- В) гипотензивные, диуретики, спазмолитики
- Г) ганглиоблокаторы, диуретики, ингибиторы АПФ

1458. [T018399] ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ ПАЦИЕНТУ

- А) ограничить прием жидкости и соли
- Б) ограничить прием белков и жиров
- В) увеличить прием жидкости и соли
- Г) увеличить прием белков и жиров

1459. [T018400] ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ МЕДМЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) безопасность пациента
- Б) рациональное питание пациента
- В) сохранение социальных контактов
- Г) проведение мероприятий личной гигиены

1460. [T018401] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЮТ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ А) чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей

- Б) занятий физкультурой

В) беременности

Г) приема мясной пищи

1461. [T018402] САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕН

- А) снижением чувствительности тканей к инсулину
- Б) бактериальной инфекцией
- В) психоэмоциональными перегрузками
- Г) абсолютным дефицитом инсулина

1462. [T018403] ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- А) принимаются последовательно
- Б) назначаются в увеличенной дозе
- В) назначаются в уменьшенной дозе
- Г) принимаются сразу все

1463. [T018404] К РАННИМ ПСИХИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ

- А) снижение памяти на текущие события
- Б) утрата критики к собственному состоянию
- В) снижение круга интересов
- Г) раздражительность

1464. [T018405] СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ

- А) Апгар
- Б) Петруssa
- В) Баллард
- Г) Цельсия

1465. [T018406] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕНİТЬ НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

- А) 100/60 мм рт.ст.

Б) 90/70 мм рт.ст.

В) 80/60 мм рт.ст. Г) 70/50 мм рт.ст.

1466. [T018407] ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИЗМЕРИТЬ

А) пиковую скорость выдоха

Б) жизненную емкость легких

В) содержание кислорода в выдыхаемом воздухе Г) объем форсированного выдоха за 1 секунду

1467. [T018408] ДЛЯ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ НР (HELICOBACTER PYLORI) ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЮТ

А) омепразол, ранитидин

Б) платифиллин, атропин

В) но-шпу (дротаверин), папаверин

Г) тетрациклин, амоксициллин

1468. [T018409] РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) увеличение массы тела и снижение суточного диуреза

Б) пастозность

В) гидроторакс

Г) асцит

1469. [T018410] ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ЛЕВУЮ РУКУ НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД, ИМЕЮЩИЙ ЦВЕТ

А) желтый

Б) черный

В) красный

Г) зеленый

1470. [T018411] ПРОФИЛАКТИКА КАНДИДОЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ (ИГКС) НУЖНО А) использовать небулайзер

Б) прополоскать рот раствором фурацилина

В) использовать пикфлюметр

Г) использовать малые дозы ИГКС

1471. [T018412] ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

А) гематурия, протеинурия, цилиндрурия

Б) гематурия, глюкозурия, цилиндрурия

В) лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия

Г) лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия

1472. [T018413] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОТНОСИТСЯ

А) бета-гемолитический стрептококк группы А

Б) кандидозная инфекция

В) кишечная палочка

Г) микобактерии

1473. [T018414] ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ

А) клубочки

Б) лоханки

В) канальцы

Г) чашечки

1474. [T018415] ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

А) утром на лице

Б) утром на ногах

В) днем на руках

Г) вечером на лице

1475. [T018416] ЕСЛИ СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ СОСТАВИЛ  
400 МЛ, ТО ЭТО

А) олигурия

Б) анурия

В) полиурия

Г) протеинурия

1476. [T018417] АНУРИЕЙ  
НАЗЫВАЕТСЯ

А) отсутствие мочи

Б) много мочи

В) нормальное количество мочи

Г) преобладание ночного диуреза над  
дневным

1477. [T018418] АНАЛИЗ МОЧИ ПО  
НЕЧИПОРЕНКО ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА  
А) лейкоцитов, эритроцитов

Б) белка, глюкозы

В) солей, билирубина

Г) ацетона, глюкозы

1478. [T018419] В ЛЕЧЕНИИ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЭФФЕКТИВНО  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

А) гемодиализ

Б) диетотерапия

В) физиотерапия

Г) витаминотерапия

1479. [T018420] ДЛЯ СБОРА АНАЛИЗА  
МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГОТОВИТ  
ПАЦИЕНТУ

А) 8 сухих банок

Б) 1 сухую банку

В) 1 сухую пробирку

Г) 2 стерильных банки

1480. [T018421] ПРИ АНАЛИЗЕ МОЧИ  
ПО ЗИМНИЦКОМУ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  
А) количество, относительная плотность  
мочи

Б) ацетон, сахар

В) билирубин, белок Г) лейкоциты,  
эритроциты

1481. [T018422] ПРЕВЫШЕНИЕ  
НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАД ДНЕВНЫМ  
ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

А) никтурия

Б) анурия

В) олигурия

Г) полиурия

1482. [T018423] ПОЧЕЧНУЮ КОЛИКУ  
МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ

А) тряская езда

Б) нерегулярное питание

В) сладкая пища

Г) гиподинамия

1483. [T018424] К  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ  
ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧЕК И  
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С  
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ОТНОСИТСЯ  
А) экскреторная урография

Б) ирригоскопия

В) томография

Г) хромоцистоскопия

1484. [T018425] ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У  
ПАЦИЕНТА НАБЛЮДАЮТСЯ

А) тошнота, рвота

Б) тахикардия, экзофтальм

В) снижение температуры и артериального  
давления

Г) желтуха, «сосудистые звездочки»

1485. [T018426] КОЛЕБАНИЕ  
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЧИ

1009-1011 В ПРОБЕ ЗИМНИЦКОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- А) гипоизостенурии
- Б) анурии
- В) полиурии
- Г) протеинурии

1486. [T018427] К АЗОТИСТЫМ ШЛАКАМ, ОБРАЗУЮЩИМСЯ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ

- А) креатинин, мочевина
- Б) альбумины, глобулины
- В) билирубин, холестерин
- Г) глюкоза, липопротеиды

1487. [T018428] ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДИЕТЕ ОГРАНИЧИВАЮТ

- А) белки
- Б) витамины
- В) жиры
- Г) углеводы

1488. [T018429] ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИЛЬНОЙ НЕСТЕРПИМОЙ БОЛЬЮ, ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) морфин
- Б) героин
- В) панангин
- Г) парацетамол

1489. [T018430] КОМПЛЕКСОМ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, Ю НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛИ И ОБЛЕГЧЕНИЕ ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) паллиативной помощью
- Б) симптоматическим лечением
- В) наружной лучевой терапией

Г) реабилитационной помощью

1490. [T018431] К ВНЕШНЕМУ ПРИЗНАКУ ОЩУЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОМ БОЛИ ОТНОСИТСЯ А) напряженный лоб с появление на нем глубоких морщин

- Б) заторможенность
- В) прекращение приема пищи
- Г) отказ от общения

1491. [T018432] ЭТИЧЕСКИМ ДОЛГОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) удовлетворение его психических, социальных и духовных потребностей
- Б) обязательное выполнение всех пожеланий родных и близких больного
- В) облегчение страданий родственников
- Г) выполнение любых пожеланий пациента

1492. [T018433] В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) медицинский аспект
- Б) духовный аспект
- В) социальный аспект

Г) реабилитационный аспект

1493. [T018434] ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ УМИРАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕНЫ ОДНИМ ИЗ ПРОИСХОДЯЩИХ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ

- А) метаболических
- Б) неврологических
- В) психологических
- Г) физических

1494. [T018435] КАКАЯ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ СИТУАЦИЙ, БОЛЕЕ ВСЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

ТОМ, ЧТО У РЕБЁНКА В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ БОЛИ

- A) ребёнок спит
- Б) у ребёнка нормальное артериальное давление
- В) у ребёнка нормальная частота дыхания
- Г) ребёнок говорит, что у него ничего не болит

1495. [T018436] КРИТЕРИЕМ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- A) очевидность того факта, что последующие попытки лечения нецелесообразны
- Б) ожидаемая продолжительность жизни не более года
- В) ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 месяцев
- Г) ожидаемый эффект от применения новейших способов лечения

1496. [T018437]  
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОДЫШКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- A) применение направленной вентиляции
- Б) оптимизация физической активности и расхода энергии
- В) коррекция водного режима
- Г) иммобилизация пациента

1497. [T018438] К ИНВАЗИВНЫМ МАНИПУЛЯЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- A) промывание желудка
- Б) постановка горчичников
- В) смена постельного и нательного белья
- Г) гигиеническая обработка кожных покровов

1498. [T018439] ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

А) метастазах в кости

Б) метастазах в мозг

В) раке желудка

Г) лимфогранулематозе

1499. [T018440] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕИЗЛЕЧИМОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЧИТАЕТСЯ

- A) тревога и депрессия
- Б) эмоциональный ступор
- В) нарушение психики
- Г) нарушение личности

1500. [T018441] ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ

- A) специальной шкалы
- Б) опроса пациента
- В) визуального наблюдения
- Г) пальпации и перкуссии

1501. [T018442] ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- A) извещение о пациенте с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
- Б) талон на прием к врачу
- В) статистический талон
- Г) амбулаторную карту

1502. [T018443] К ПРИЗНАКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- A) негативное самовосприятие в профессиональной деятельности
- Б) преувеличение собственной значимости
- В) развитие гипертонической болезни

Г) эмоциональное равновесие

1503. [T018444] ОБЕЗБОЛИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ

- А) с повышением дозы
- Б) по требованию
- В) без учета индивидуальности
- Г) с понижением дозы

1504. [T018445] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

- А) при каждом контакте
- Б) строго каждый час
- В) в начале и в конце смены
- Г) в день выписки пациента

1505. [T018446] СИНОНИМОМ СЛОВА «ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» ЯВЛЯЕТСЯ...

- А) неизлечимый пациент
- Б) страдающий пациент
- В) умирающий пациент
- Г) онкологический пациент

1506. [T018447] ЕСЛИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И БЕСПОКОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА СОПРОВОЖДАЮТСЯ СТОНАМИ И ГРИМАСАМИ, ТО ЭТО ИСТОЛКОВЫВАЮТ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО

- А) физической боли
- Б) постепенного угасания сознания
- В) душевной боли
- Г) признаков депрессии

1507. [T018448] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ СТАДИЯМИ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ А) отрицание, гнев, депрессия, смирение

Б) смиление, тревога, гнев, отрицание

В) гнев, смиление, тревога

Г) тревога, смиление, гнев, отрицание  
1508. [T018449] НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁНЫМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЕМ У ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ РАК

- А) молочной железы
- Б) тела матки
- В) шейки матки
- Г) прямой кишки

1509. [T018450] ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) страх диагноза
- Б) отсутствие аппетита
- В) похудание
- Г) боль в животе

1510. [T018451] ПРОЯВЛЕНИЯМИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нарушение равновесия, походки
- Б) неразборчивость речи
- В) ухудшение восприятия звуков
- Г) нарушение зрения

1511. [T018452] ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ

- А) смена положения тела
- Б) правильное питание
- В) неподвижность пациента

Г) питьевой режим

1512. [T018453] ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ

А) сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента

Б) сдавление тканей гипсовой повязкой

В) активное положение пациента в постели

Г) пассивное положение пациента в постели

1513. [T018454] ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ДЕПРЕССИВНОМ СОСТОЯНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

А) психотерапевтической беседе

Б) гиперопеке

В) изоляции

Г) беседе о данном заболевании, его осложнениях

1514. [T018455] К СЕСТРИНСКОМУ УХОДУ ОНОСИТСЯ

А) кормление пациента

Б) запись ЭКГ

В) проведение в/м инъекции

Г) постановка капельницы

1515. [T018456] К ИНВАЗИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ОТНОСИТСЯ

А) проведение в/м, в/в, п/к инъекций

Б) подготовка пациента к исследованию

В) проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных

Г) кормление пациента

1516. [T018457] К ЯТРОГЕННЫМ ОТНОСЯТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ,

А) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников

Б) обусловленные вредными факторами производства В) с неблагоприятным прогнозом

Г) наследственного генеза

1517. [T018458] НИКТУРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

А) преобладание ночного диуреза над дневным

Б) болезненное мочеиспускание

В) увеличение суточного количества мочи до более 2000 мл

Г) уменьшение суточного количества мочи до менее 500 мл

1518. [T018459] ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ РЕКОМЕНДУЮТ

А) ограничение приема жидкости

Б) длительное применение гепарина

В) уменьшение содержания белков в пищевом рационе

Г) увеличение содержания жиров в пищевом рационе

1519. [T018460] ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ

А) прием жирной пищи

Б) избыток фруктов

В) переохлаждение

Г) стресс

1520. [T018461] САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) желудочное кровотечение

Б) кахексия

В) обезвоживание

Г) кишечная непроходимость

1521. [T018462] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ИЗ РАЦИОНА ИСКЛЮЧАЮТ А) жирную, жареную пищу

Б) молочные продукты

В) кашу Г) отварные овощи

1522. [T018463] ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) стерильной банкой
- Б) стерильной пробиркой
- В) сухой банкой
- Г) сухой пробиркой

1523. [T018464] ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА СПОСОБСТВУЕТ

- А) отхождению мокроты
- Б) снижению лихорадки
- В) уменьшению одышки
- Г) расширению бронхов

1524. [T018465] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- А) диуретики

- Б) антибиотики
- В) муколитики
- Г) цитостатики

1525. [T018466] ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

- А) недостаточности кровообращения
- Б) инфаркта миокарда
- В) гипертонической болезни
- Г) стенокардии

1526. [T018467] К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТСЯ А)

- повышение артериального давления, гипергликемия, ожирение

- Б) одышка, лёгочное кровотечение
- В) головная боль, снижение артериального давления
- Г) лихорадка, нарушение слуха

1527. [T018468] БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИ ИЗ НОСА ПРОВОДЯТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ А)

- дифтерии

- Б) краснухи
- В) кори
- Г) ветряной оспы

1528. [T018469] ДИЕТА ПАЦИЕНТА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) исключение экстрактивных, острых и пряных блюд

- Б) ограничение соли и жидкости
- В) ограничение углеводной пищи и обильное питье
- Г) исключение кисломолочных продуктов, гипохлоридное питание

1529. [T018470] ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО СОБИРАЕТСЯ МОЧА

- А) из средней порции одного мочеиспускания в количестве 10-20 мл
- Б) первого мочеиспускания после ночи
- В) в течение 3 часов
- Г) за 24 часа

1530. [T018471] НА ВОПРОС ПАЦИЕНТА С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ: «ПОЧЕМУ ИНЪЕКЦИИ ИНСУЛИНА ПРИДЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ?» – ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ БУДЕТ ВАРИАНТ

- А) «В Вашем организме не хватает своего инсулина для усвоения сахара, постоянные инъекции инсулина помогут справиться с этой проблемой»
- Б) «Не беспокойтесь, так надо»
- В) «Я не знаю»
- Г) «Обратитесь с этим вопросом к доктору»

1531. [T018472] ЖАЛОБОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сонливость
- Б) раздражительность
- В) бессонница
- Г) чувство жара

1532. [T018473] К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТСЯ

- А) жажда, кожный зуд
- Б) отёки, боли в пояснице
- В) снижение памяти, запоры
- Г) сухой кашель, одышка

1533. [T018474] ОПТИМАЛЬНЫМ ВИДОМ ДОКОРМА ПРИ СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ А)

адаптированные молочные смеси

- Б) кисломолочные смеси
- В) соки Г) каши

1534. [T018475] МОРАЛЬ – ЭТО

- А) отношения и нравы людей, классифицированные культурой по критерию «доброзло»
- Б) совокупность научных фактов
- В) философское учение
- Г) строгое соблюдение законов и Конституции

1535. [T018476] ДОЛГ - ЭТО А)

требование совести

- Б) приказ руководителя
- В) обоюдная выгода
- Г) требования близких людей

1536. [T018477] ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ДЕОНТОЛОГИЯ»

- А) совокупность профессиональных правил поведения

Б) завоевание социального доверия личности

В) обязательства перед преподавателями, коллегами, учениками Г) исполнение законодательства

1537. [T018478] СПОСОБНОСТЬ К СОПЕРЕЖИВАНИЮ И СОЧУВСТВИЮ ДРУГИМ

- А) эмпатия
- Б) симпатия
- В) альтруизм
- Г) аффилиация

1538. [T018479] ПРАВОНАРУШЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ

- А) виновное противоправное общественно- опасное деяние
- Б) активное поведение субъектов правоотношения

В) бездействие, совершенное недееспособным лицом

Г) деяние невменяемого лица, причиняющего вред интересам государства, общества и граждан

1539. [T018480] ЭЛЕМЕНТАМИ СОСТАВА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

А) субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона

Б) мотив, стороны, обстоятельства

В) вина, факты, вред, лица

Г) основание, право, обязанность, следствие, умысел

1540. [T018481] МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) юридической ответственности
- Б) моральной ответственности
- В) религиозной ответственности
- Г) этических правил

**1541. [Т018482] ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ПРИСУТСВИИ ПАЦИЕНТОВ**

А) обсуждать поставленный диагноз, план лечения, говорить о заболеваниях соседей по палате

Б) быть приветливой

В) быть вежливой

Г) разъяснять в доступной форме значение, смысл и необходимость обследований

**1542. [Т018483] В ОТНОШЕНИЯХ «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» НЕДОПУСТИМЫ**

А) грубоść и неуважительное отношение

Б) вежливость и уважительное отношение

В) внимательность и отзывчивость

Г) тактичность и корректность

**1543. [Т018484] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА**

А) сохранять

Б) разглашать

В) передавать

Г) делить

**1544. [Т018485] ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТНОШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ К МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ ДОЛЖНО БЫТЬ**

А) терпимым

Б) агрессивным

В) негативным

Г) нетерпимым

**1545. [Т018486] В ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ**

А) эмпатию

Б) равнодушие

В) растерянность

Г) агрессивность

**1546. [Т018487] В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ, РУКОВОДСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ**

А) соблюдать субординацию

Б) держать дистанцию

В) демонстрировать свое превосходство

Г) идти на конфронтацию

**1547. [Т018488] УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ**

А) сохранение тайны о состоянии его здоровья

Б) отказ от выяснения его семейного статуса

В) соблюдение его избирательного права

Г) передачу сведений о характере заболевания пациента его работодателям

**1548. [Т018489] ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщи ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ ПРОЯВЛЕНИЯ**

А) милосердия и социальной справедливости

Б) привилегии для определенных слоев общества

В) экономической заинтересованности в профессионалах

Г) рыночно ориентированного разделения труда

**1549. [Т018490] ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СФЕРУ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ**

А) свободного, осознанного и информированного согласия пациента

Б) медицинских показаний

В) требования родственников

Г) извлечения финансовой выгоды

**1550. [T018491] СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- A) в письменной форме
- Б) в форме гражданско-правового договора
- В) в нотариальной форме
- Г) только в присутствии адвоката

**1551. [T018492] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ**

- A) соблюдение прав и обеспечение государственных гарантий
- Б) медицинское страхование граждан
- В) государственное управление здравоохранением
- Г) муниципальное управление здравоохранением

**1552. [T018493] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСИТСЯ**

- A) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
- Б) медицинское страхование граждан
- В) государственное управление здравоохранением
- Г) муниципальное управление здравоохранением

**1553. [T018494] К ВАЖНЕЙШИМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ОТНОСИТСЯ**

- A) соблюдение врачебной тайны
- Б) медицинское страхование граждан

**В) государственное управление здравоохранением**

**Г) муниципальное управление здравоохранением**

**1554. [T018495] ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ**

- A) наличием необходимого количества медицинских работников
- Б) функционированием частной системы здравоохранения
- В) государственным управлением здравоохранением
- Г) муниципальным управлением здравоохранением

**1555. [T018496] КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- A) возможностью выбора медицинской организации
- Б) функционированием частной системы здравоохранения
- В) государственным управлением здравоохранением
- Г) муниципальным управлением здравоохранением

**1556. [T018497] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ**

- A) независимо от срока беременности
- Б) на сроке до 6 недель
- В) на сроке до 12 недель
- Г) до 22 недель

**1557. [T018498] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ**

- A) до 22 недель

Б) на сроке до 6 недель

В) на сроке до 12 недель

Г) независимо от срока беременности

1558. [T018499] ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТАТЬЕ 123 УК РФ «НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА» НАСТУПАЕТ ЗА

А) производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля

Б) производство аборта без согласия женщины

В) нарушение лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, требований нормативных правовых актов при производстве аборта

Г) производство аборта при отсутствии медицинских или социальных показаний для искусственного прерывания беременности

1559. [T018500] ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ОТЦОМ РЕБЕНКА ЗАПИСЫВАЕТСЯ

А) муж женщины

Б) донор

В) донор или муж женщины

Г) никто не записывается

1560. [T018501] СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА, ОТВЕЧАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

А) наличие собственного здорового ребенка, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 – 35 лет

Б) наличие не менее двух собственных детей, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст до 40 лет

В) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 – 35 лет

Г) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 18-45 лет

1561. [T018502] ЖЕНЩИНА, СОСТОЯЩАЯ В БРАКЕ, МОЖЕТ СТАТЬ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ ПРИ УСЛОВИИ

А) письменного согласия супруга

Б) устного согласия супруга

В) оформления развода

Г) материальной выгоды

1562. [T018503] ЭВТАНАЗИЯ - ЭТО

А) искусственное прекращение жизни по желанию пациента

Б) отказ от лечения

В) естественная смерть

Г) самоубийство

1563. [T018504] ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

А) защитить пациента от психофизических страданий и болей

Б) оградить пациента от родственников

В) ускорить процесс умирания

Г) оградить пациента от проблем

1564. [T018505] ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

А) проблема борьбы с болью

Б) нарушение сна

В) невозможность трудиться

Г) недостаточность общения

1565. [T018506] ПРИНУЖДЕНИЕ К ИЗЪЯТИЮ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

А) не допускается ни при каких обстоятельствах

Б) допускается по решению суда

В) допускается в интересах реципиента

Г) допускается по решению врачебной комиссии